

# محتويات الكتاب

## 1 الوحدة

### الديناميكا

#### الدرس الأول

الحركة المستقيمة..... ١١

#### الدرس الثاني

الحركة منتظمة التغير فى خط مستقيم..... ٤١

#### الدرس الثالث

الحركة الرأسية تحت تأثير الجاذبية الأرضية

#### الدرس الرابع

(السقوط الحر)..... ٧٣

قانون الجذب العام..... ٩٦



## 2 الوحدة

### الاحتمال

#### الدرس الأول

بعض المصطلحات والمفاهيم الأساسية -

#### الدرس الثاني

الأحداث - العمليات على الأحداث..... ١٠٩

مسلمات وقوانين الاحتمال - حساب الاحتمال.

..... ١٢٩



# الديناميكا

الحركة المستقيمة.

1 الدرس

الحركة منتظمة التغير في خط مستقيم.

2 الدرس

الحركة الرأسية تحت تأثير الجاذبية الأرضية  
(السقوط الحر).

3 الدرس

قانون الجذب العام.

4 الدرس

# الوحدة

# 1



## الحركة المستقيمة

# 1

الدرس

### بعض التمارين والمفاهيم الأساسية

#### الحركة

هي تغير موضع الجسم بتغير الزمن بالنسبة إلى موضع جسم آخر.

والسكون والحركة مفهوم نسبي فراكب القطار قد يبدو ساكناً بالنسبة لراكب آخر في نفس القطار بينما كلاهما يعتبر متحركاً بالنسبة لشخص يقف على الطريق أثناء سير القطار. وهناك أنواع عديدة للحركة فمنها :

١ حركة انتقالية يتحرك فيها الجسم بين نقطتين تسمى الأولى نقطة البداية والثانية نقطة النهاية ومنها نوعان :

( أ ) حركة في خط مستقيم مثل حركة جسم يسقط من نافذة.


( ب ) حركة في خط منحنى مثل حركة المقذوفات.

٢ حركة دورانية واهتزازية مثل حركة الكواكب وحركة بندول الساعة وهي خارج نطاق دراستنا في هذا الكتاب.

#### الجسيم

هو نقطة افتراضية يتم استخدامها لدراسة حركة الجسم حيث يتم تمثيل حركة الجسم كله بحركة نقطة مع إهمال أي حركة داخلية أخرى للجسم مثل الحركة الدورانية أو الاهتزازية.


## مرحلة الموضع لجسيم



هو المتجه الذي تنطبق نقطة بدايته مع موضع المشاهد لعملية الحركة (و) ونقطة نهايته مع موضع الجسيم في الوقت الحالي ويرمز له عادة بالرمز  $\vec{r}$  حيث :

$$\vec{r} = \vec{m} + \vec{v}$$

## الازاحة والمسافة



إذا تحركت سيارة من الموضع الابتدائي (أ) إلى أن وصلت الموضع النهائي (ب) متبعة المسار المبين بالشكل المقابل ، فإن :

## متجه الإزاحة

هو المتجه الذي تمثله القطعة المستقيمة الموجهة  $\vec{AB}$  التي تنطبق نقطة بدايتها (أ) مع الموضع الابتدائي للجسيم ونقطة نهايتها (ب) مع الموضع النهائي للجسيم ويرمز لها بالرمز  $\vec{f}$

أى أن لتحديد متجه الإزاحة يلزم معرفة :

- مقدار الإزاحة : وهو البعد بين الموضع الابتدائي والموضع النهائي للحركة  $\|\vec{f}\| = \|\vec{AB}\|$
- اتجاه الإزاحة : وهو اتجاه حركة الجسيم من الموضع الابتدائي إلى الموضع النهائي.


## المسافة

هى طول المسار الفعلى الذى قطعه الجسيم وهى كمية قياسية.

## ملاحظات :

- مقدار الإزاحة الحادثه لجسيم يساوى المسافة المقطوعة فى حالة الحركة فى خط مستقيم فى اتجاه ثابت فقط.
- إذا تحرك جسيم ثم عاد إلى نفس النقطة التى تحرك منها فإن مقدار الإزاحة الحادثه له = صفر.
- مقدار الإزاحة  $\geq$  المسافة المقطوعة.

مثال ١



إذا تحرك جسم شرقاً مسافة ١٢ متراً ثم تحرك بعد ذلك مسافة ٥ أمتار شمالاً ثم توقف. احسب المسافة والإزاحة الحادثة للجسم.

الحل

• المسافة التي قطعها الجسم = ١٢ + ٥ = ١٧ متر

• الإزاحة ممثلة بالقطعة المستقيمة الموجهة  $\vec{OA}$  حيث :

$$\text{مقدار الإزاحة} = \sqrt{12^2 + 5^2} = 13 \text{ متر}$$

- اتجاه الإزاحة : حيث  $\tan \theta = \frac{5}{12}$  فإن  $\theta \approx 22^\circ 37' 12''$

أي أن مقدار الإزاحة ١٣ متر واتجاهها شمال الشرق بزاوية قياسها  $22^\circ 37' 12''$

العلاقة بين متجه الموضع ومتجه الإزاحة

نفرض أن (٩) هي موضع المشاهد لحركة جسم من موضعه الابتدائي عند النقطة (٤) إلى موضعه النهائي عند النقطة (ب) بين لحظتين زمنييتين متتاليتين.

فإذا رمزنا لمتجه الموضع عند اللحظة الابتدائية

( $r_1$ ) بالرمز  $\vec{r}_1$  ولمتجه الموضع عند اللحظة النهائية

( $r_2$ ) بالرمز  $\vec{r}_2$  فإن متجه الإزاحة :

$$\vec{f} = \vec{r}_2 - \vec{r}_1 = (\vec{r}_2 - \vec{r}_1) + (\vec{r}_1 - \vec{r}_1) = \vec{r}_2 - \vec{r}_1$$

$$\|\vec{f}\| = \sqrt{(r_2 - r_1)^2 + (s_2 - s_1)^2}$$

وإذا كان  $\vec{r}_1$  متجه وحدة في اتجاه  $\vec{a}$  فإن  $\|\vec{f}\| = \vec{f} \cdot \vec{a}$

مثال ٢

يتحرك جسم بحيث كان متجه موضعه  $\vec{r}$  يعطى كدالة في الزمن بدلالة متجهي الوحدة الأساسيين  $\vec{s}$  ،  $\vec{v}$

$$\text{بالعلاقة : } \vec{r} = (2 + r)\vec{s} + (2 - r)\vec{v} \text{ أوجد :}$$

١ متجه الإزاحة  $\vec{f}$

٢ معيار الإزاحة الحادثة حتى اللحظة  $r = 4$  ثانية.

٣ معيار الإزاحة الحادثة بين اللحظتين  $r = 2$  إلى  $r = 4$

١)  $\vec{v}_1 - \vec{v}_2 = \vec{v}_1 + (-\vec{v}_2) = \vec{v}_1 + \vec{v}_3 = \vec{v}_1 + \vec{v}_2 + \vec{v}_3 = \vec{v}_1 + \vec{v}_2 + \vec{v}_3$

٢)  $\vec{v}_1 - \vec{v}_2 = \vec{v}_1 + \vec{v}_3 = \vec{v}_1 + \vec{v}_2 + \vec{v}_3$

∴ متجه الإزاحة الحادثة حتى اللحظة  $t = 4$  هي  $\vec{r}_1 - \vec{r}_2 = \vec{r}_1 + \vec{r}_3 = \vec{r}_1 + \vec{r}_2 + \vec{r}_3$   
 ، معيارها  $|\vec{r}_1 - \vec{r}_2| = \sqrt{4^2 + 12^2} = 10$  وحدة طول.

٣)  $\vec{v}_1 + \vec{v}_2 = \vec{v}_1 + \vec{v}_2 + \vec{v}_3 = \vec{v}_1 + \vec{v}_2 + \vec{v}_3$

،  $\vec{v}_1 + \vec{v}_2 = \vec{v}_1 + \vec{v}_2 + \vec{v}_3$

∴ متجه الإزاحة الحادثة بين اللحظتين  $t = 2$

،  $t = 4$  هي  $\vec{r}_1 - \vec{r}_2 = \vec{r}_1 + \vec{r}_3 = \vec{r}_1 + \vec{r}_2 + \vec{r}_3$

، معيارها  $|\vec{r}_1 - \vec{r}_2| = \sqrt{2^2 + 6^2} = 2\sqrt{10}$  وحدة طول.

### متجه السرعة - السرعة

\* متجه السرعة (Velocity) هو كمية متجهه تعبر عن المعدل الزمني للتغير في موضع الجسم.

\* السرعة (Speed) هي كمية قياسية تعبر عن معيار متجه السرعة.


### تعريف

متجه سرعة جسيم هو المتجه الذي معياره يساوي قيمة السرعة وينطبق اتجاهه على اتجاه الحركة.

فمثلاً: « ٩٠ كم/س » تعبر عن « السرعة » أما « ٩٠ كم/س شمالاً » تعبر عن « متجه السرعة »

### وحدات قياس السرعة

هي : الكيلومتر في الساعة أي (كم/س) ، المتر في الثانية أي (م/ث) ، السننتيمتر في الثانية أي (سم/ث).



فمثلاً:  $27 \text{ كم/س} = \frac{5}{18} \times 27 = 7.5 \text{ م/ث}$

،  $4 \frac{1}{3} \text{ كم/س} = \frac{250}{9} \times 4 \frac{1}{3} = 125 \text{ سم/ث}$

،  $20 \text{ م/ث} = \frac{18}{5} \times 20 = 72 \text{ كم/س}$

## الحركة المنتظمة

هى الحالة التى يكون فيها كل من معيار واتجاه متجه السرعة ثابتاً .

\* ومن ذلك نتوصل إلى الملاحظتين الهامتين الآتيتين على الحركة المنتظمة :

١ ثبات اتجاه متجه السرعة : وهذا يعنى أن الجسم يتحرك فى اتجاه ثابت (يتحرك فى خط مستقيم ثابت).

٢ ثبات معيار متجه السرعة : وهذا يعنى أن الجسم يقطع فى اتجاه حركته مسافات متساوية خلال فترات زمنية متساوية أى (يتحرك بسرعة ثابتة).

### لاحظ أن

الحركة المستقيمة هى  
الحركة فى خط مستقيم

### ملاحظة :

فى حالة الحركة المنتظمة يكون :

١ معيار الإزاحة الحادثة = المسافة المقطوعة

٢ العلاقة بين متجهى الإزاحة والسرعة هى :  $\vec{v} = \vec{f}$

٣ يسمى متجه السرعة الثابتة فى هذه الحالة بمتجه السرعة المنتظمة وهى السرعة التى يقطع بها الجسم ازاحات متساوية فى أزمنة متساوية.

## الحركة المتغيرة

إذا لم تكن الحركة منتظمة فإننا نسميها متغيرة والحركة المتغيرة يتغير فيها متجه سرعة الجسم فى المقدار أو فى الاتجاه أو فى كليهما من لحظة إلى أخرى.

\* **لاحظ أن** : السيارة التى تقطع مسافة ثابتة ٨٠ كم كل ساعة فى مسار دائرى لها سرعة ثابتة « ٨٠ كم/س » ولكن متجه سرعتها ليس ثابتاً لأن اتجاه الحركة يتغير.

### ملاحظة :

فى حالة الحركة فى خط مستقيم ثابت نفرض متجه وحدة  $\vec{u}$  فى اتجاه يوازى اتجاه الحركة وعلى ذلك فإن :

\*  $f$  (القياس الجبرى لمتجه الإزاحة) =  $\|\vec{f}\|$  إذا كانت الإزاحة فى نفس اتجاه  $\vec{u}$

أ، -  $\|\vec{f}\|$  إذا كانت الإزاحة فى عكس اتجاه  $\vec{u}$


\*  $v$  (القياس الجبرى لمتجه السرعة) =  $\|\vec{v}\|$  إذا كان اتجاه السرعة فى نفس اتجاه  $\vec{u}$

أ، -  $\|\vec{v}\|$  إذا كان اتجاه السرعة فى عكس اتجاه  $\vec{u}$

## السرعة المتوسطة - متجه السرعة المتوسطة

\* السرعة المتوسطة (ع<sub>م</sub>) خلال فترة زمنية هي خارج قسمة المسافة الكلية في هذه الفترة على مقدار هذه الفترة الزمنية وهي (كمية قياسية)

$$\boxed{\text{أى أن } \frac{\text{المسافة الكلية}}{\text{الزمن الكلي}} = \text{السرعة المتوسطة (ع<sub>م</sub>)}$$



\* متجه السرعة المتوسطة (ع<sub>م</sub>) خلال فترة زمنية هو خارج قسمة متجه الإزاحة في هذه الفترة على مقدار هذه الفترة الزمنية وهو (كمية متجهة) وإذا كان:  $\vec{r}_1$ ،  $\vec{r}_2$  هما متجها الموضع لجسيم عند اللحظتين الزمنيةين  $t_1$ ،  $t_2$  على الترتيب

$$\boxed{\text{فإن } \text{متجه السرعة المتوسطة (ع<sub>م</sub>)} = \frac{\text{الإزاحة الحادثة}}{\text{الزمن الكلي}} = \frac{\vec{r}_2 - \vec{r}_1}{t_2 - t_1} = \frac{\vec{f}}{t_2 - t_1}}$$


\* **لاحظ أن:** السرعة المتوسطة ليس بالضرورة أن تساوى معيار متجه السرعة المتوسطة.

\* **المفهوم الفيزيائي للسرعة المتوسطة:** هي السرعة التي لو سار بها الجسم بانتظام خلال الفترة الزمنية لقطع نفس المسافة الكلية.

## متجه السرعة اللحظية

إذا كانت الفترة الزمنية ( $t_2 - t_1$ ) صغيرة جداً ومتوسطها اللحظة  $t$  فإن متجه السرعة في هذه الحالة يُعرف بمتجه السرعة اللحظية عند اللحظة  $t$  ويُرمز له بالرمز  $\vec{v}$

### مثال توضيحي



إذا بدأ قائد سيارة رحلته بين مدينتين ١، ٢، متخذاً المسار المنحني المبين بالشكل. فإذا كان طول المسار ٢٤٠ كم بينما البعد بين المدينتين في حالة اتخاذه طريقاً مستقيماً هو ٢١٠ كم وقد أتم السائق رحلته في ٣ ساعات

وبطبيعة الحال أثناء الرحلة فإن قراءة عداد السرعة تتغير من لحظة لأخرى فأحياناً تكون ١٢٠ كم/ساعة وأخرى ٦٠ كم/ساعة وربما صفر كم/ساعة في حالة التوقف في محطة وقود أو استراحة ولكن في نهاية الأمر فإن:

١) السيارة سارت مسافة ٢٤٠ كم في فترة ٣ ساعات أي بمعدل ٨٠ كم لكل ساعة وهذا ما يسمى بالسرعة المتوسطة.

$$\boxed{\text{أى أن } \frac{\text{المسافة الكلية}}{\text{الزمن الكلي}} = \text{السرعة المتوسطة} = \frac{٢٤٠}{٣} = ٨٠ \text{ كم/س}}$$



٢ متجه السرعة المتوسطة مرتبط بالإزاحة الحادثة للجسم فالبرغم من أن السيارة سارت مسافة ٢٤٠ كم إلا أن الإزاحة الحادثة هي ٢١٠ كم في الاتجاه من أ إلى ب وعلى ذلك فإن :

$$\text{متجه السرعة المتوسطة} = \frac{\text{الإزاحة الحادثة}}{\text{الزمن الكلي}} = \frac{٢١٠}{٣} = ٧٠ \text{ كم/ساعة في اتجاه أ ب}$$

٣ قراءة عداد السرعة بالسيارة يدل على السرعة اللحظية


أى أن (١٢٠ كم/س ، ٦٠ كم/س ، ... ) هي سرعات لحظية تختلف من لحظة لأخرى.

### مثال ٣

قطعت سيارة مسافة ٤٥ كم على طريق مستقيم فى زمن قدره  $\frac{٣}{٤}$  ساعة ثم عادت فقطعت ٢٥ كم فى الاتجاه المعاكس فى زمن قدره  $\frac{١}{٣}$  ساعة أوجد فى نهاية الرحلة :

- ١ الإزاحة الحادثة.
- ٢ المسافة الكلية المقطوعة.
- ٣ السرعة المتوسطة.
- ٤ متجه السرعة المتوسطة.

### الحل



بفرض  $\vec{س}$  متجه وحده فى اتجاه الحركة من أ إلى ب فإن :

$$١ \text{ الإزاحة الحادثة} = \vec{س} ٤٥ + (\vec{س} - ٢٥) = \vec{س} ٢٠$$

$$٢ \text{ المسافة الكلية المقطوعة} = ٤٥ + ٢٥ = ٧٠ \text{ كم}$$

$$٣ \text{ السرعة المتوسطة} = \frac{\text{المسافة الكلية}}{\text{الزمن الكلي}} = \frac{٧٠}{\frac{١}{٣} + \frac{٣}{٤}} = ٥٦ \text{ كم/س}$$

$$٤ \text{ متجه السرعة المتوسطة} = \frac{\text{الإزاحة الحادثة}}{\text{الزمن الكلي}} = \frac{\vec{س} ٢٠}{\frac{١}{٣} + \frac{٣}{٤}} = \vec{س} ١٦$$

أى أن متجه السرعة المتوسطة له نفس متجه الوحدة  $\vec{س}$  ومعياره  $١٦ \text{ كم/س}$

### مثال ٤

قطع راكب دراجة على طريق مستقيم مسافة ٣٧,٥ كم بسرعة ٢٥ كم/س ثم قطع ١٨ كم بسرعة ١٢ كم/س. أوجد متجه السرعة المتوسطة خلال الرحلة كلها إذا كانت :


- ١ الإزاحتان فى اتجاه واحد.
- ٢ الإزاحتان فى اتجاهين متضادين.

## المثل

∴ زمن قطع المسافة الأولى =  $\frac{37,5}{20} = 1,5$  ساعة

، زمن قطع المسافة الثانية =  $\frac{18}{12} = 1,5$  ساعة

∴ الزمن الكلي =  $1,5 + 1,5 = 3$  ساعة




١ إذا كانت الإزاحتان في اتجاه واحد

∴ متجه الإزاحة الكلية =  $\vec{C} = \vec{A} + \vec{B} = 55,0$

∴ متجه السرعة المتوسطة  $\vec{C} = \frac{55,0}{3} = 18,3$

∴ متجه السرعة المتوسطة له نفس اتجاه  $\vec{C}$  ومعياره =  $18 \frac{1}{3}$  كم/س



٢ إذا كانت الإزاحتان في اتجاهين متضادين

∴ متجه الإزاحة الكلية =  $\vec{C} = \vec{A} - \vec{B} = 19,5$

∴ متجه السرعة المتوسطة  $\vec{C} = \frac{19,5}{3} = 6,5$

∴ متجه السرعة المتوسطة له نفس اتجاه  $\vec{C}$  ومعياره =  $6,5$  كم/س

## مثال ٥

في نظام إحداثي متعامد ، إذا بدأ جسيم حركته من نقطة ثابتة وبعد مرور ٣ ثوان من بدء الحركة كان الجسيم عند الموضع ٤ (٧ ، ٣) وبعد مرور ٥ ثوان من بدء الحركة كان الجسيم عند الموضع ب (١٣ ، ١١) أوجد متجه السرعة المتوسطة للجسيم خلال تلك الفترة ثم أوجد معيارها واتجاهها.

## الحل

$$\vec{r} = 4\vec{i} + 7\vec{j} \text{ ص } 3, \quad \vec{r} = 11\vec{i} + 13\vec{j} \text{ ص } 13$$


$$\therefore \text{متجه السرعة المتوسطة } \vec{C} = \frac{\vec{r} - \vec{r}_0}{t - t_0} = \frac{11\vec{i} - 4\vec{i} + 13\vec{j} - 7\vec{j}}{3 - 0} = \frac{7\vec{i} + 6\vec{j}}{3}$$

$$\therefore \|\vec{C}\| = \sqrt{7^2 + 6^2} = \sqrt{85} = 9,22 \text{ وحدة طول/ثانية}$$

$$\therefore \theta = \tan^{-1} \left( \frac{6}{7} \right) = 40,6^\circ$$

أي أن اتجاه متجه السرعة المتوسطة يصنع زاوية قياسها  $40,6^\circ$  مع الاتجاه الموجب لمحور السينات.

مثال ٦



الشكل المقابل يمثل العلاقة بين الزمن المنقضى والمسافة المقطوعة

لحركة قطار في خط مستقيم من نقطة (0) أوجد :

١ متجه السرعة المتوسطة.

٢ السرعة المتوسطة.

الحل

بفرض  $\vec{v}$  متجه وحدة في اتجاه حركة القطار

وبأخذ النقطتين أ (١ ، ١٠٠) ، ب (٤ ، ٤٠٠)

$$\therefore \vec{v} = \frac{\text{الإزاحة الحادثة}}{\text{الزمن المنقضى}} = \frac{100 - 400}{1 - 4} = \frac{100}{3} \vec{v}$$



أي أن معيار متجه السرعة المتوسطة ١٠٠ كم/س في اتجاه الحركة.

$$\text{السرعة المتوسطة} = \frac{\text{المسافة المقطوعة}}{\text{الزمن المنقضى}} = \frac{300}{3} = 100 \text{ كم/س}$$

ونلاحظ أن معيار متجه السرعة المتوسطة = السرعة المتوسطة لأن الحركة منتظمة.

ملاحظة :

عند تمثيل العلاقة بين الإزاحة الحادثة والزمن المستغرق لحركة في خط مستقيم بيانياً نلاحظ ما يلي :



\* الشكل البياني يوضح أن الحركة متغيرة.

\* متجه السرعة اللحظية

= ميل المماس للمنحنى عند هذه اللحظة


$$= \frac{\Delta \text{ف}}{\Delta \text{ر}} \leftarrow \text{نهـا}$$

\* الشكل البياني يوضح أن الحركة منتظمة

\* متجه السرعة اللحظية = متجه السرعة المتوسطة

$$= \frac{\text{الإزاحة الحادثة}}{\text{الزمن المنقضى}} = \frac{\Delta \text{ف}}{\Delta \text{ر}} = \text{ميل الخط البياني}$$

## مثال ٧



يمثل الشكل المقابل العلاقة بين مقدار الإزاحة (ف) الحادثة لسيارة تتحرك بين مدينتين ذهاباً وإياباً والزمن (ص)

- ١ أوجد مقدار متجه السرعة المتوسطة خلال أول ساعتين.
- ٢ أوجد مقدار متجه السرعة المتوسطة خلال آخر ٣ ساعات.
- ٣ ما دلالة القطعة المستقيمة الأفقية.
- ٤ أوجد كلاً من السرعة المتوسطة ومتجه السرعة المتوسطة في نهاية الرحلة.

## الحل

$$١ \quad \therefore \text{ميل الخط البياني خلال أول ساعتين} = \frac{١٥٠ - \text{صفر}}{٢ - \text{صفر}} = ٧٥$$

$\therefore$  مقدار متجه السرعة المتوسطة خلال أول ساعتين = ٧٥ كم/س (ذهاباً)

$$٢ \quad \therefore \text{ميل الخط البياني خلال آخر ٣ ساعات} = \frac{\text{صفر} - ١٥٠}{٥ - ٨} = ٥٠$$

$\therefore$  مقدار متجه السرعة المتوسطة خلال آخر ٣ ساعات = ٥٠ كم/س (عودة)

٣ تدل على توقف حركة السيارة لمدة ٣ ساعات.

$$٤ \quad \bullet \text{ السرعة المتوسطة} = \frac{\text{المسافة الكلية المقطوعة}}{\text{الزمن الكلي}} = \frac{١٥٠ + ١٥٠}{٨} = ٣٧,٥ \text{ كم/س}$$

$\bullet$  متجه السرعة المتوسطة =  $\frac{\text{الإزاحة النهائية}}{\text{الزمن الكلي}}$  وحيث أن السيارة عادت إلى المدينة الأولى مرة أخرى

$\therefore$  الإزاحة النهائية = صفر  $\therefore$  متجه السرعة المتوسطة = صفر

## مثال ٨

قطع قطار المسافة بين القاهرة والإسكندرية على مرحلتين: المرحلة الأولى من القاهرة إلى طنطا ومسافتها ١٠٥ كم بسرعة ١٠٥ كم/س. المرحلة الثانية من طنطا إلى الإسكندرية ومسافتها ١٢٠ كم بسرعة ٩٠ كم/س. فإذا كان القطار قد توقف في طنطا لمدة ١٠ دقائق. أوجد متجه سرعته المتوسطة خلال الرحلة الكلية (اعتبر أن القطار يتحرك طوال الوقت على خط مستقيم).


## الحل

$$\therefore \text{متجه الإزاحة الكلية ف} = \overline{١٠٥} + \overline{١٢٠} = \overline{٢٢٥}$$

$$\therefore \text{ زمن قطع المسافة الأولى} = \frac{١٠٥}{١٠٥} = ١ \text{ ساعة}$$

$$\text{، زمن قطع المسافة الثانية} = \frac{١٢٠}{٩٠} = \frac{٤}{٣} \text{ ساعة}$$

٢.



، زمن الاستراحة في طنطا = ١٠ دقائق =  $\frac{1}{6}$  ساعة

∴ الزمن الكلي =  $1 + \frac{4}{3} + \frac{1}{6} = 2,5$  ساعة

∴ متجه السرعة المتوسطة  $\vec{v} = \frac{225}{2,5} = 90$  كم/س

∴ متجه السرعة المتوسطة له نفس اتجاه  $\vec{v}$  ومعياره يساوي ٩٠ كم/س.

### مثال ٩

مدينتان ٢، ٣ الطريق بينهما مستقيم. قامت سيارة من المدينة ٢ متجهة إلى ٣ بسرعة ٢٥ كم/س وفي نفس اللحظة قامت سيارة أخرى من المدينة ٣ متجهة إلى ٢ سرعتها ٦٥ كم/س أوجد متى وأين تتقابل السيارتان علماً بأن طول الطريق ١٨٠ كم

### الحل

نفرض أن السيارتين تتقابلان بعد زمن قدره  $t$  ساعة


$$180 = v_1 t + v_2 t \quad \therefore 180 = 25t + 65t$$

$$180 = 90t \quad \therefore t = 2 \text{ ساعة}$$

∴ السيارتان تتقابلان بعد ساعتين من بدء الحركة.

$$s = v_1 t = 25 \times 2 = 50 \text{ كم}$$


∴ السيارتان تتقابلان على بُعد ٥٠ كم من ٢



## السرعة النسبية

تدلنا بعض الأمثلة الحياتية أن الحركة مفهوم نسبي يتغير وصفها من مشاهد إلى آخر بل هي قد تتغير بالنسبة للمشاهد الواحد حسب حالته.

### فمثلاً:



• قد يتخيل راكب قطار أن قطاره يتحرك إلى الخلف عند النظر من النافذة إلى قطار آخر قد بدأ التحرك في نفس اتجاهه ولكنه يكتشف أن قطاره مازال ساكناً عند النظر إلى الجهة الأخرى من المحطة (الثابتة).

• عندما ينظر راكب سيارة إلى سيارة أخرى أمامه تسير بسرعة أقل مقداراً من سرعته يبدو له وكأن هذه السيارة تتحرك نحوه (للخلف).


• عندما ينظر راكب سيارة إلى سيارة أخرى تتحرك في نفس اتجاهه فإنها تبدو له وكأنها تتحرك بسرعة بطيئة بينما عندما ينظر إلى سيارة أخرى تتحرك في عكس اتجاهه فإنها تبدو له وكأنها تتحرك بسرعة كبيرة.



## مفهوم السرعة النسبية

السرعة النسبية لجسيم (ب) بالنسبة لجسيم آخر (أ) هي السرعة التي يبدو أن الجسيم (ب) يتحرك بها لو اعتبرنا الجسيم (أ) في حالة سكون ويرمز لها بالرمز  $(\vec{v}_{ب/أ})$ .

## متجه السرعة النسبية



نعتبر جسامين ١، ٢، وأن  $\vec{v}_1$ ،  $\vec{v}_2$  هما متجهتا سرعتيهما بالنسبة لمشاهد (د) على سطح الأرض فإذا فرضنا أن شخصاً موجوداً على الجسم ١ متحركاً معه رصد حركة الجسم ٢ فإن  $\vec{v}_2$  هو متجه سرعة ٢ بالنسبة إلى ١ ولمعرفة العلاقة بين  $\vec{v}_1$ ،  $\vec{v}_2$ ،  $\vec{v}$  نعطي كلاً من الجسامين ١، ٢ سرعة إضافية  $-\vec{v}_1$  ليصبح ١ ساكناً ويصبح متجه سرعة الجسم ٢ بالنسبة للجسم ١  $\vec{v}_2 - \vec{v}_1$

(١) ...

$$\vec{v}_2 - \vec{v}_1 = \vec{v} \quad \therefore$$

أي أن متجه سرعة ٢ بالنسبة إلى ١ = متجه سرعة ٢ - متجه سرعة ١

تساوى محصلة متجهي السرعتين  $\vec{v}_2$ ،  $-\vec{v}_1$

والعلاقة (١) تعطي السرعة النسبية متى عرفت سرعتا الجسامين بالنسبة للمشاهد الساكن على سطح الأرض (د) كما يمكن كتابة هذه العلاقة على الصورة :

(٢) ...

$$\vec{v}_2 - \vec{v}_1 = \vec{v}$$

والعلاقة (٢) يمكن بواسطتها حساب  $\vec{v}$  إذا عرفنا  $\vec{v}_1$ ،  $\vec{v}_2$

## ملاحظاتان :

$$\vec{v}_2 - \vec{v}_1 = \vec{v} \quad 1$$

٢ إذا كانت سرعة السيارة (١) هي  $\vec{v}_1$ ، سرعة الدراجة (ب) هي  $\vec{v}_2$  وكانت سرعة الدراجة (ب) بالنسبة

للسيارة (١) هي  $\vec{v}$

أولاً : إذا كان  $\vec{v}_1$ ،  $\vec{v}_2$  في اتجاهين متضادين فإن  $\vec{v}_2$  لها نفس اتجاه  $\vec{v}$

ثانياً : إذا كان  $\vec{v}_1$ ،  $\vec{v}_2$  في نفس الاتجاه فإن :

\*  $\vec{v}_2$  لها نفس اتجاه  $\vec{v}$  إذا كان  $\vec{v}_2 < \vec{v}_1$

\*  $\vec{v}_2$  لها عكس اتجاه  $\vec{v}$  إذا كان  $\vec{v}_2 > \vec{v}_1$

مثال ١٠


تتحرك سيارة على طريق مستقيم بسرعة ٧٥ كم/س فإذا تحركت على الطريق نفسه دراجة بخارية بسرعة ٤٥ كم/س فأوجد سرعتها بالنسبة للسيارة في كل من الحالتين الآتيتين :

١ الدراجة تسير في عكس اتجاه حركة السيارة.

٢ الدراجة تسير في نفس اتجاه حركة السيارة.

الحل

نفرض أن  $\vec{v}$  هو متجه وحدة في اتجاه حركة السيارة.



١ الدراجة (ب) تسير في عكس اتجاه حركة السيارة (١) :

$$\vec{v}_1 = 75 \vec{v} , \vec{v}_2 = -45 \vec{v}$$

$$\vec{v}_1 - \vec{v}_2 = 75 \vec{v} - (-45 \vec{v}) = 120 \vec{v}$$

$$\vec{v}_1 - \vec{v}_2 = 75 \vec{v} - (-45 \vec{v}) = 120 \vec{v}$$


أى أن الدراجة تبدو لراكب السيارة وكأنها متحركة نحوه أى في عكس اتجاه حركة السيارة بسرعة مقدارها ١٢٠ كم/س.

٢ الدراجة (ب) تسير في نفس اتجاه حركة السيارة (١) :

$$\vec{v}_1 = 75 \vec{v} , \vec{v}_2 = 45 \vec{v}$$

$$\vec{v}_1 - \vec{v}_2 = 75 \vec{v} - 45 \vec{v} = 30 \vec{v}$$

$$\vec{v}_1 - \vec{v}_2 = 75 \vec{v} - 45 \vec{v} = 30 \vec{v}$$



أى أن الدراجة تبدو لراكب السيارة وكأنها متحركة نحو السيارة بسرعة مقدارها ٣٠ كم/س وكأنها تتقهقر بهذه السرعة.

مثال ١١

تتحرك باخرة فى خط مستقيم نحو ميناء ما ولما وصلت على بعد ١٠٠ كم منه مرت فوقها طائرة تطير فى الاتجاه المضاد بسرعة ٣٠٠ كم/س ورصدت حركة البخرة فبدت لها متحركة بسرعة ٣٥٠ كم/س احسب كم من الوقت يمضى من لحظة الرصد حتى وصول البخرة إلى الميناء.

## الحل

نفرض أن  $\vec{v}$  متجه وحدة في اتجاه حركة الطائرة (أ)

$$\therefore \vec{v}_1 = 200 \vec{v}, \quad \vec{v}_2 = 350 \vec{v}$$

$$\vec{v}_1 - \vec{v}_2 = \vec{v}_3$$

$$\therefore \vec{v}_3 = 350 \vec{v} - 200 \vec{v}$$

$$\therefore \vec{v}_3 = 150 \vec{v}$$

$\therefore$  سرعة الباخرة = 150 كم/س نحو الميناء

$$\therefore \frac{f}{e} = \frac{150}{350}$$

$\therefore$  زمن وصول الباخرة إلى الميناء =  $\frac{100}{150} = \frac{2}{3}$  ساعة.

## مثال ١٢

قامت سيارة الشرطة (أ) التي تتحرك في خط مستقيم بقياس السرعة النسبية لسيارة (ب) بالنسبة لها قادمة في الاتجاه المضاد فوجدتها 120 كم/س ولما خفضت السيارة (أ) سرعتها إلى النصف وأعدت القياس وجدت أن السرعة النسبية للسيارة (ب) أصبحت 100 كم/س فما هي السرعة الفعلية لكل من السيارتين؟

## الحل

نفرض أن  $\vec{v}$  متجه وحدة في اتجاه حركة السيارة (أ)

$$\therefore \vec{v}_1 = 120 \vec{v}, \quad \vec{v}_2 = 100 \vec{v}$$

$$\therefore \vec{v}_1 - \vec{v}_2 = \vec{v}_3 \quad (1)$$

عندما خفضت السيارة (أ) سرعتها إلى النصف

$$\therefore \vec{v}_1 = 60 \vec{v}, \quad \vec{v}_2 = 100 \vec{v}$$

$$\therefore \vec{v}_1 - \vec{v}_2 = \vec{v}_3 \quad (2)$$

من (1)، (2)  $\therefore \vec{v}_1 = 60 \vec{v}, \quad \vec{v}_2 = 100 \vec{v}$

$\therefore \vec{v}_1 = 60 \vec{v}, \quad \vec{v}_2 = 100 \vec{v}$   $\therefore$  سرعة السيارة (ب) = 100 كم/س في الاتجاه المضاد.

## ملاحظة :



إذا كان (أ) طراداً سرعته  $\vec{v}_m$

أطلق منه طوربيد (ب) بسرعة  $\vec{v}_e$

$\therefore$  سرعة الطوربيد  $\vec{v}_e =$  سرعة الطراد ( $\vec{v}_m$ ) + السرعة التي أطلق بها الطوربيد.



مثال ١٣

يتحرك طراد وسفينة على مسار مستقيم واحد بحيث كان كل منهما يتحرك نحو الآخر وقد راقب الطراد حركة السفينة وعندما كانت على بُعد ٤٠ كم منه كانت سرعة السفينة ٥٠ كم/س وسرعة الطراد ٦٤ كم/س وعندئذ أطلق الطراد عليها طوربيدًا بسرعة ١٢٦ كم/س احسب الزمن الذي يمضى من لحظة إطلاق الطوربيد حتى لحظة إصابة السفينة.

الحل

نفرض أن  $\vec{v}$  متجه وحدة في اتجاه حركة الطراد (٢)

∴ سرعة الطوربيد  $\vec{v}_p$

= سرعة الطراد + السرعة التي أطلق بها الطوربيد


$$= 126 + 64 = 190 \text{ كم/س}$$

∴ متجه سرعة الطوربيد بالنسبة للسفينة  $\vec{v}_s = \vec{v}_p - \vec{v}_s = \vec{v} - \vec{v}_s = \vec{v} - 190\vec{v} = -180\vec{v}$

أي  $\vec{v}_s = 180\vec{v}$  كم/س في اتجاه حركة الطراد.

∴ الزمن الذي يستغرقه الطوربيد حتى إصابة السفينة =  $\frac{40}{180} = \frac{2}{9}$  ساعة

$$= \frac{1}{9} \times 60 = 6.67 \text{ دقائق}$$



مثال ١٤

مر قطار طوله ١٥٠ مترًا ويتحرك بسرعة ٧٢ كم/س إلى جوار قطار آخر طوله ١٠٠ متر على شريط مواز. أوجد الزمن اللازم لكي يمر القطار الأول بالكامل من القطار الثاني إذا كان القطار الثاني :

١ ساكنًا.

٢ يتحرك بسرعة ٤٥ كم/س في نفس اتجاه حركة القطار الأول.

٣ يتحرك بسرعة ٤٥ كم/س في عكس اتجاه حركة القطار الأول.

الحل

بفرض أن متجه سرعة القطار الأول =  $\vec{v}_1$  وأن متجه سرعة القطار الثاني =  $\vec{v}_2$

وأن  $\vec{v}$  متجه وحدة في اتجاه حركة القطار الأول.

$$\vec{v}_1 = 72\vec{v}, \vec{v}_2 = 0 \text{ ∴ } \vec{v}_1 - \vec{v}_2 = 72\vec{v} = \vec{v}_1 - \vec{v}_2 = 72\vec{v}$$

ولكي يمر القطار الأول بالكامل من القطار الثاني يجب أن يقطع مسافة

$$150 + 100 = 250 \text{ مترًا وبسرعة مقدارها } 72 \text{ كم/س} = \frac{250}{72} \times 3600 = 12500 \text{ متر/ث}$$

∴ الزمن الذي يستغرقه =  $\frac{250}{72} = 3.47$  ثانية





اختبر نفسك

من أسئلة الكتاب المدرس

مستويات عليا

تطبيق

فهم

تذكر

## أولاً أسئلة الاختيار من متعدد

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

١) قذفت كرة لأعلى فوصلت إلى ارتفاع ٣ متر ثم عادت إلى نقطة القذف مرة أخرى فإن مقدار الإزاحة الحادثة يساوى .....

(أ) ٣ متر (ب) ٦ متر (ج) صفر (د) ٩ متر

٢) عندما يتحرك جسيم فإن مقدار الإزاحة ..... المسافة المقطوعة.

(أ) < (ب) ≤ (ج) > (د) ≥

٣) إذا تحرك جسيم فى خط مستقيم ٩ متر شرقاً ثم عاد ٣ متر غرباً فإن : الإزاحة الحادثة = .....

(أ) ١٢ متر فى اتجاه الشرق. (ب) ١٢ متر فى اتجاه الغرب.

(ج) ٦ متر فى اتجاه الشرق. (د) ٦ متر فى اتجاه الغرب.

٤) تحرك جسيم مسافة ٤٨ متر شرقاً ثم غير اتجاهه وسار ٢٠ متر شمالاً. فإن الإزاحة التى تحركها الجسيم = .....

(أ) ٦٨ متر فى اتجاه الشمال الشرقى.

(ب) ٥٢ متر فى اتجاه الشمال الشرقى.


(ج) ٦٨ متر فى اتجاه ١٢° ٣٧ شمال الشرق.

(د) ٥٢ متر فى اتجاه ٤٨° ٢٢ شرق الشمال.

٥) تحرك راكب دراجة ٦ كم غرباً ثم تحرك بعد ذلك ٨ كم بزاوية قياسها ٦٠° جنوب الغرب فإن مقدار الإزاحة التى قطعها راكب الدراجة = .....

(أ) ١٤ (ب)  $3\sqrt{2}$  (ج)  $3\sqrt{7}$  (د) ١٢,١

٦) فى الشكل المقابل :




إذا كانت كل من  $\overline{AB}$  عمودية على  $\overline{BC}$  ،

وإذا تحرك جسيم من النقطة A إلى النقطة B ثم ح

وتوقف عند D فإن المسافة المقطوعة + مقدار الإزاحة الحادثة = ..... سم

(أ) ٣٥ (ب) ٧٠ (ج) ٢٥ (د) ٦٠

## ٧ في الشكل المقابل :



مضمار للسباق طوله بالكامل ١٤٠ متر وهو يتكون

من نصفى دائرة وقطعتين مستقيمتين فإذا تحرك

متسابق من نقطة ٢ إلى نقطة ٣ فإن

مقدار الإزاحة = ..... متر ( $\frac{22}{7} = \pi$ )


(د) ٥٨

(ج) ٥٠


(ب) ٩٢

(أ) ٧٠


## ٨ أى من منحنيات (الموضع - الزمن) الآتية تمثل إزاحة جسيم ؟




(د)



(ج)



(ب)



(أ)

٩ متجه الموضع لجسيم يتحرك يعطى بالعلاقة  $\vec{r} = (9 - 2t)\vec{s} + t\vec{v}$

فإن متجه الإزاحة  $\vec{f} = \dots\dots\dots$

(ب)  $9\vec{s} + t\vec{v}$

(أ)  $2t\vec{s} + t\vec{v}$

(د)  $2t\vec{s} - t\vec{v}$

(ج)  $(9 - 2t)\vec{s} + t\vec{v}$

١٠ يتحرك جسيم بحيث أن متجه موضعه  $\vec{r}$  يعطى كدالة فى الزمن بدلالة متجهى الوحدة الأساسيين  $\vec{s}$

$\vec{v}$  ، بالعلاقة  $\vec{r} = (6 - 2t)\vec{s} + (8 + t)\vec{v}$  فإن متجه الإزاحة حتى اللحظة  $t=2$

هو .....

(ب)  $15\vec{s} + 25\vec{v}$

(أ)  $18\vec{s} + 24\vec{v}$

(د)  $15\vec{s} + 24\vec{v}$

(ج)  $14\vec{s} + 18\vec{v}$

١١ إذا كان متجه موضع جسيم يتحرك فى خط مستقيم من نقطة (٩) يعطى كدالة فى الزمن  $t$  بالتانية

بالعلاقة  $\vec{r} = (2 + 2t)\vec{v}$  فإن معيار متجه الإزاحة  $\vec{f}$  بعد ثانيتين يساوى ..... وحدة طول.

(د) ١١

(ج) ٨

(ب) ٦

(أ) ٤

١٢ إذا كانت :  $\vec{f} = 4t\vec{s} - 3t\vec{v}$  وكان  $\vec{r}$  ، فإن :  $\vec{r} = 3\vec{s} - t\vec{v}$  ..... عندما  $t=1$

(ب)  $4\vec{s} - t\vec{v}$


(أ)  $5\vec{s} - 6\vec{v}$

(د)  $7\vec{s} - 2\vec{v}$

(ج)  $2\vec{s} - t\vec{v}$

١٣ يتحرك جسيم بحيث أن متجه موضعه  $\vec{r}$  يعطى كدالة فى الزمن بدلالة متجهى الوحدة الأساسيين  $\vec{s}$  ،  $\vec{v}$  بالعلاقة  $\vec{r} = (\text{ما } \frac{\pi}{4} \text{ ر}) \vec{s} + (\text{ما } \frac{\pi}{4} \text{ ر}) \vec{v}$  فإن معيار متجه الإزاحة  $\vec{r}$  حتى اللحظة  $t = 1$  ثانية هو .....

- (أ)  $5\sqrt{2}$  (ب) 2 (ج)  $2\sqrt{2}$  (د)  $5\sqrt{2}$



١٤ إذا تحرك جسيم ٨٠ م فى اتجاه الشمال ثم ٦٠ م فى اتجاه الشرق فإن النسبة بين المسافة التى قطعها الجسيم ومعيار الإزاحة الحادثة هى .....

- (أ) ١ : ١ (ب) ٣ : ٤ (ج) ٧ : ٥ (د) ٥ : ٧

١٥  $20 \text{ م/ث} = \dots \text{ كم/س}$

- (أ)  $\frac{5}{9}$  (ب) ٧٢ (ج) ٠,١٨ (د) ٢٠

١٦  $45 \text{ كم/دقيقة} = \dots \text{ م/ث}$

- (أ) ٧٥٠ (ب) ١٢,٥ (ج) ١٦٢ (د) ٠,٧٥

١٧  $150 \text{ سم/ث} = \dots \text{ م/س}$

- (أ) ٥٤٠٠ (ب) ٥٤٠ (ج) ٥٤ (د) ٥,٤

١٨  $6 \text{ م/س} = \dots \text{ مم/دقيقة}$

- (أ) ١٠ (ب) ١٠٠ (ج) ١٠٠٠ (د) ١٠٠٠٠

١٩ إذا تحركت سيارة بسرعة منتظمة مقدارها ٧٥ كم/س لمدة ٢٠ دقيقة فإن المسافة المقطوعة بالكيلومتر تساوى .....

- (أ) ١٥ (ب) ٢٠ (ج) ٢٥ (د) ٣٠

٢٠ الزمن بالساعة الذى تستغرقه سيارة تتحرك بسرعة منتظمة ٢٠ م/ث فى قطع مسافة ١٨٠ كم يساوى .....

- (أ)  $1\frac{1}{3}$  (ب) ٢ (ج)  $2\frac{1}{3}$  (د) ٣

٢١ إذا كان الضوء يصل من الشمس إلى الأرض فى ٨,٣ دقيقة وكان بُعد الشمس عن الأرض  $1,496 \times 10^{11}$  متر فإن سرعة الضوء تساوى ..... كم/ث.

- (أ)  $1,8 \times 10^{11}$  (ب) ٣٠٠ (ج)  $3 \times 10^8$  (د)  $3 \times 10^8$

٢٢) قطعت سيارة مسافة قدرها ١٨٠ كم خلال فترة زمنية مدتها ١٢٠ دقيقة فإن سرعتها المتوسطة تساوى ..... كم/ساعة.

(د) ٢٥

(ج) ١٨٠

(ب) ١,٥

(أ) ٩٠


٢٣) متى تكون السرعة المتوسطة هي نفسها السرعة اللحظية؟

(أ) عندما تتزايد السرعة بمعدل ثابت فقط.

(ب) عندما تكون السرعة ثابتة.

(ج) دائماً.

(د) لا يمكن أبداً.



٢٤) الشكل المقابل يمثل العلاقة بين الإزاحة والزمن لجسم يتحرك في خط مستقيم

فإن السرعة المتوسطة للجسم

خلال الرحلة كلها تساوى ..... م/ث

(ب) ٤

(أ) ٣,٥

(د) ٥

(ج) ٤,٥

٢٥) في الشكل المقابل دراجة تتحرك من النقطة (و) في خط مستقيم

فإن :

أولاً : معيار متجه السرعة المتوسطة خلال

الرحلة كلها = ..... م/ث

(ب) ٤

(أ) ٢

(د) ١٦

(ج) ١٤

ثانياً : مقدار السرعة المتوسطة خلال الرحلة

كلها = ..... م/ث

(ب) ٤

(أ) ٢

(ج) ١٤

٢٦) في الشكل المقابل :

سيارتين ٢ ، ب يتحركان في خط مستقيم واحد وكانت


سرعتاهما ع م ، ع على الترتيب فإن  $\frac{ع}{ع} = \dots\dots\dots$ 

(ب) ٢ : ١


(أ) ٣ : ١

(د) ١ : ٢


(ج) ١ : ٣

المسافة (ف)  
بالمتر

(د) ١٦

الإزاحة (ف)  
بالمتر

٢٧ في الشكل المقابل :



تحرك رجل من نقطة ٢ إلى نقطة ٤ في زمن قدره ٤ ث  
ثم عاد للخلف إلى نقطة ٢ في زمن قدره ١ ث فإن متجه  
السرعة المتوسطة يساوي .....


(ب) ١, ٢ م/ث في اتجاه ٢ ←

(أ) ٢ م/ث في اتجاه ٢ ←

(د) ١, ٢ م/ث في اتجاه ٣ ←

(ج) ٢ م/ث في اتجاه ٣ ←

٢٨ بالاستعانة بالشكل المقابل :



أى المواقف الآتية يكون فيها متجه السرعة المتوسطة سالباً ؟


(أ) جسم تحرك من ٢ إلى ٤

(ب) جسم تحرك من ٢ إلى ٣ ثم عاد إلى ٢

(ج) جسم تحرك من ٢ إلى ٤ ثم عاد إلى ٢

(د) جسم تحرك من ٣ إلى ٤ ثم عاد إلى ٢

٢٩ في الشكل المقابل :



جسيم يتحرك على أضلاع سداسى منتظم طول ضلعه ٢٤ متر من ٢  
إلى ٣ إلى ٤ إلى ٥ إلى ٦ إلى ١ إلى ٢ بسرعة ١٠ م/ث. فإن متجه سرعته  
المتوسطة هو .....


(أ) ١٢ م/ث في اتجاه ٢ ←

(ب) ١٠ م/ث في اتجاه ٢ ←

(ج) ٢, ٤ م/ث في اتجاه ٢ ←

(د) ٢ م/ث في اتجاه ٢ ←

٣٠ في الشكل المقابل :



جسيم يتحرك على أضلاع سداسى منتظم طول ضلعه ٢٤ متر من  
٢ إلى ٣ في ٢ ثانية ، من ٣ إلى ٤ في ٣ ثواني ، من ٤ إلى ٥ في  
٤ ثواني ، من ٥ إلى ٦ في ٥ ثواني ، من ٦ إلى ١ في ٦ ثواني ،  
فإن سرعته المتوسطة خلال رحلته من ٢ إلى ١ تساوى ..... م/ث

(د) ٦

(ج) ٣

(ب) ٢, ٤

(أ) ١, ٢

٣١ إذا تحرك رجل من نقطة ثابتة في اتجاه الشرق مسافة ٢٤٠ م خلال زمن دقيقتان ثم تحرك الرجل في

اتجاه الغرب بسرعة منتظمة ٨ م/ث لمدة ٣٠ ثانية فإن متجه السرعة المتوسطة للرجل هو .....

(د) ٥ م/ث

(ج) ٣, ٢ م/ث

(ب) ٢ م/ث

(أ) صفر

٣٢ إذا تحرك جسم في خط مستقيم بسرعة منتظمة ليقطع مسافة (٩٠ س ٧) كم خلال فترة زمنية (٣ س) دقيقة فإن السرعة المنتظمة للجسم هي ..... م/ث.

- (١) ٦٠ س (ب) ٢٠٠ س (ج) ٣٦٠ س (د) ٥٠٠ س

٣٣ تحرك جسم في خط مستقيم مسافة ١٠٠ م بسرعة ٥ م/ث ثم تحرك بسرعة ٨ م/ث فى نفس الاتجاه لمدة ١٠ ثوان فإن السرعة المتوسطة خلال الرحلة كلها = ..... م/ث

- (١)  $\frac{2}{3}$  (ب) ٦ (ج) ٨ (د) ٩

٣٤ قطع راكب دراجة مسافة ٦٠ كم فى اتجاه الغرب ثم مسافة ٩٠ كم فى اتجاه الشرق فإذا كانت سرعته ١٢ كم/س ، فإن متجه سرعته المتوسطة خلال الرحلة كلها = .....

- (١) ١٢,٥ كم/س شرقاً. (ب) ١٢ كم/س شرقاً.  
(ج) ١٢ كم/س غرباً. (د) ٢,٤ كم/س شرقاً.

٣٥ قطع راكب دراجة ٤٠ كم على طريق مستقيم بسرعة ٢٠ كم/س فى اتجاه متجه وحدة  $\vec{i}$  ثم عاد وقطع مسافة ١٥ كم فى الاتجاه المعاكس بسرعة ١٥ كم/س فإن متجه السرعة المتوسطة خلال الرحلة كلها هو .....

- (١)  $\frac{1}{3} \vec{i}$  (ب)  $\frac{2}{3} \vec{i}$  (ج)  $\frac{5}{3} \vec{i}$  (د)  $\frac{1}{3} \vec{i}$

٣٦ يتحرك جسيم فى خط مستقيم من نقطة ثابتة (٥) بحيث أن متجه موضعه  $\vec{r}$  يتحدد

بالعلاقة  $\vec{r} = (٥ + ٣٧ + ٢٨) \vec{i}$  حيث  $\vec{i}$  متجه وحدة مواز للخط المستقيم فإن متجه السرعة المتوسطة بعد مرور ٣ ثوان من بدء الحركة هو .....

- (١)  $20 \vec{i}$  (ب)  $\frac{2}{3} \vec{i}$  (ج)  $6 \vec{i}$  (د)  $18 \vec{i}$

٣٧ تحركت دراجة ناحية الشرق بسرعة ٤ م/ث لمدة ٦٠ ثانية ثم توقفت لمدة ١٠ ثوان ثم تحركت ناحية الغرب بسرعة ٥ م/ث لمدة ٣٠ ثانية أخرى فإن السرعة المتوسطة خلال الرحلة الكلية = ..... م/ث

- (١) ٠,٩ (ب) ٠,٧ (ج) ١ (د) ٣,٩

٣٨ يتحرك جسم بسرعة منتظمة مقدارها ٥٠ م/ث من نقطة (٢ ، ١) إلى نقطة (٩ ، ٢٥) فإن متجه سرعة الجسم = .....

- (١)  $7\vec{s} + 24\vec{v}$  (ب)  $8\vec{s} + 24\vec{v}$   
(ج)  $14\vec{s} + 48\vec{v}$  (د)  $50\vec{s}$

٣٩ إذا تحرك جسم بسرعة  $\vec{c} = 3\vec{s} - 2\vec{v}$  من النقطة (١ ، ٧) فوصل للنقطة (٢ ، ٩) بعد ثانيتين أوجد إحداثيات النقطة  $\vec{c}$

- (١) (٣ ، ٧) (ب) (٥ ، ٤) (ج) (١١ ، ٥) (د) (٩ ، ٢)



٤٠ إذا كان  $\vec{v}_1 = 120 \text{ م/س}$  ،  $\vec{v}_2 = 80 \text{ م/س}$  فإن  $\vec{v}_1 - \vec{v}_2 = \dots\dots\dots$

- (أ)  $40 \text{ م/س}$  (ب)  $40 \text{ م/س}$  (ج)  $200 \text{ م/س}$  (د)  $200 \text{ م/س}$

٤١ يتحرك راكب دراجة  $\vec{v}_1$  على طريق مستقيم بسرعة  $15 \text{ كم/س}$  ويتحرك في نفس الاتجاه راكب آخر  $\vec{v}_2$  بسرعة  $12 \text{ كم/س}$  فإن القياس الجبري لمتجه سرعة  $\vec{v}_1$  بالنسبة إلى  $\vec{v}_2$  يساوى  $\dots\dots\dots \text{ كم/س}$

- (أ) 2 (ب) 3 (ج) 27 (د) 27-

٤٢ تتحرك سيارتان  $\vec{v}_1$  ،  $\vec{v}_2$  على طريق مستقيم واحد في اتجاهين متضادين بالسرعتين  $125 \text{ كم/س}$  ،  $75 \text{ كم/س}$  على الترتيب. فإن سرعة السيارة  $\vec{v}_1$  بالنسبة إلى السيارة  $\vec{v}_2 = \dots\dots\dots \text{ كم/س}$  «حيث اتجاه السيارة  $\vec{v}_1$  هو الموجب»

- (أ) 50 (ب) 50- (ج) 200 (د) 75

٤٣ إذا كان  $\vec{v}_1 = 15 \text{ م/س}$  ،  $\vec{v}_2 = 35 \text{ م/س}$  فإن  $\vec{v}_1 - \vec{v}_2 = \dots\dots\dots$

- (أ)  $50 \text{ م/س}$  (ب)  $20 \text{ م/س}$  (ج)  $20 \text{ م/س}$  (د)  $50 \text{ م/س}$

٤٤  $\vec{v}_1$  ،  $\vec{v}_2$  جسمان يتحركان في اتجاهين متضادين ، معيار سرعة  $\vec{v}_1$  ضعف معيار سرعة  $\vec{v}_2$  فإن السرعة النسبية للجسم  $\vec{v}_1$  بالنسبة للجسم  $\vec{v}_2 = \dots\dots\dots$

- (أ)  $1.5 \text{ م/س}$  (ب)  $2 \text{ م/س}$  (ج)  $2.5 \text{ م/س}$  (د)  $3 \text{ م/س}$

٤٥ طائرتان حريبتان المسافة بينهما  $10 \text{ كم}$  ولهما نفس السرعة فإذا أطلقت الطائرتان الخلفية صاروخاً بسرعة  $150 \text{ كم/س}$  فإنه يصيب الطائرتة الأمامية بعد زمن قدره  $\dots\dots\dots$  دقيقة.

- (أ) 1 (ب) 2 (ج) 3 (د) 4

٤٦ يتحرك جسمان  $\vec{v}_1$  ،  $\vec{v}_2$  في خط مستقيم في الاتجاه  $\vec{v}_1$  بالسرعتين  $1000 \text{ م/د}$  ،  $120 \text{ كم/س}$  على الترتيب فإذا كانت المسافة بينهما  $30 \text{ كم}$  فإنهما يتقابلان على بعد  $\dots\dots\dots \text{ كم}$  من نقطة بداية حركة الجسم  $\vec{v}_1$

- (أ) 30 (ب) 60 (ج) 20 (د) 40

٤٧ مدينتان  $\vec{v}_1$  ،  $\vec{v}_2$  على الطريق الساحلى المسافة بينهما  $120 \text{ كم}$  ، تحركت سيارة من المدينة  $\vec{v}_1$  متجهه إلى المدينة  $\vec{v}_2$  بسرعة  $88 \text{ كم/س}$  وفى نفس اللحظة قامت سيارة أخرى من المدينة  $\vec{v}_2$  متجهة إلى المدينة  $\vec{v}_1$  بسرعة  $72 \text{ كم/س}$ . فإن السيارتان تتقابلان على بُعد  $\dots\dots\dots \text{ كم}$  من المدينة  $\vec{v}_1$

- (أ) 54 (ب) 90 (ج) 82 (د) 66

٤٨ دراجة بخارية تسير بسرعة  $40 \text{ كم/س}$  فى اتجاه متجه وحدة ثابت  $\vec{v}_1$  ، لاحظ راكبها أن سيارة تسير فى الاتجاه المضاد تتحرك بسرعة  $105 \text{ كم/س}$  فإن متجه سرعة السيارة هو  $\dots\dots\dots$

- (أ)  $155 \text{ م/س}$  (ب)  $65 \text{ م/س}$  (ج)  $65 \text{ م/س}$  (د)  $155 \text{ م/س}$

٤٩ قطاران ٢ ، س طول كل منهما ٥٠ متر يتحركان فى اتجاهين متضادين بسرعتين ١٠ م/ث ، ١٥ م/ث فإن زمن عبور كل منهما للأخر = ..... ثانية.

- (١) ٢ (ب) ٤ (ج) ٦ (د) ٨


٥٠ قطاران ٢ ، س طول كل منهما ٥٠ متر يتحركان فى نفس الاتجاه بسرعتين ١٠ م/ث ، ١٥ م/ث بحيث كان القطار (ب) خلف القطار (٢) فإن زمن عبور كل منهما للأخر = ..... ثانية.

- (١) ٥ (ب) ١٠ (ج) ١٥ (د) ٢٠

٥١ تسير سيارتان ٢ ، س على طريق مستقيم فى نفس الاتجاه وكانت سرعتاهما ع<sub>٢</sub> ، ع<sub>١</sub> على الترتيب وكانت ع<sub>٢</sub> هى القياس الجبرى لسرعة ٢ بالنسبة لـ س وزادت سرعة السيارة ٢ بمقدار ٣ وحدات فإن ع<sub>٢</sub> .....

- (أ) تزيد بمقدار ٣ وحدات سرعة. (ب) تنقص بمقدار ٣ وحدات سرعة. (ج) تتضاعف ثلاث مرات. (د) تظل كما هى لا تتغير.

٥٢ فى الشكل المقابل :




سيارتان ٢ ، س تتحركان فى خط مستقيم واحد ، وكان ع<sub>٢</sub> سرعة إحداهما من المدينة الأولى إلى المدينة الثانية ، ع<sub>١</sub> سرعة الأخرى من المدينة الثانية فى اتجاه المدينة الأولى فإن ع<sub>٢</sub> = ..... كم/س

- (١) ٤٠ (ب) ٨٠ (ج) ١٢٠ (د) ٢٠٠

٥٣ لدينا ٣ سيارات تتحرك فى مستوى واحد والشكل

المقابل يوضح ع<sub>٢</sub> ، ع<sub>١</sub>

أى من الأشكال الآتية يمكن أن يمثل ع<sub>٣</sub> ؟



(د)



(ج)



(ب)



(أ)

١ قطعت سيارة المسافة بين القاهرة والإسماعيلية وقدرها ١٢٠ كم على مرحلتين : الأولى ومسافتها ٤٠ كم بسرعة ٨٠ كم/س والثانية ومسافتها ٨٠ كم بسرعة ٦٠ كم/س فإذا اعتبرنا أن السيارة تتحرك طوال الوقت في خط مستقيم وأن السيارة توقفت بعد قطع المرحلة الأولى لمدة ١٠ دقائق. فأوجد متجه سرعتها المتوسطة خلال الرحلة كلها.

« ٦٠ كم/س في اتجاه الحركة من القاهرة إلى الإسماعيلية »

٢ قطع راكب دراجة على طريق مستقيم مسافة ٢٧ كم بسرعة ١٨ كم/س ثم قطع مسافة ٣٦ كم بسرعة ١٢ كم/س. أوجد السرعة المتوسطة خلال الرحلة كلها إذا كانت :

١ الإزاحتان في اتجاه واحد.


٢ الإزاحتان في اتجاهين متضادين.

٣ إذا كان الجسيم عند لحظتين زمنيتين ٢ ، ٦ ثانية من بدء حركته عند الموضعين ٣ ، ٥ ، ٧ ، ٢٥ على الترتيب أوجد متجه السرعة المتوسطة للجسيم خلال هذه الفترة الزمنية ثم أوجد معيار واتجاه هذه السرعة المتوسطة.

«  $\vec{s} + \vec{v}$  وحدة طول/ثانية ،  $\sqrt{26}$  وحدة طول/ثانية ،  $٧٨ \hat{e}_1 + ٤١ \hat{e}_2$  مع  $\vec{v}$  و  $\vec{s}$  »

٤ دخل قطار طوله ١٥٠ متراً نفقاً مستقيماً طوله ف متر فاستغرق عبوره بالكامل من النفق زمن قدره ١٥ ثانية. أوجد طول النفق إذا كانت سرعة القطار منتظمة وتساوى ٩٠ كم/س. « ٢٢٥ متر »

الإزاحة (ف) بالمتر




٥ الشكل المقابل : يمثل بيانياً منحنى

(الإزاحة - الزمن) لفأر يهرب من قط

أعد رسم هذا الشكل إذا هرب

الفأر من القط بضعف سرعته.

المسافة بالكيلومتر



« ٣٠ كم/س ، ٤٥ كم/س »

٦ الشكل المقابل : يمثل العلاقة بين

المسافة بالكيلومتر والزمن بالساعة لمسار دراجة

بخارية تتحرك بين مدينتين. أجب عما يلي :


١ ما مقدار متجه السرعة المتوسطة للدراجة في

أثناء الذهاب ؟

٢ ما مقدار متجه السرعة المتوسطة للدراجة

في أثناء العودة ؟

٣ ما دلالة القطعة المستقيمة الأفقية في الشكل.



يوضح الشكل المقابل مسار حركة كل من أحمد وعمرو في قطع المسافة بين قريتين ، أحدهما في القرية الأولى ، والآخر في القرية الثانية.

١ هل بدأ أحمد وعمرو الحركة في توقيت واحد ؟  
فسر إجابتك.

٢ بعد كم دقيقة التقى أحمد وعمرو ؟

٣ ما الزمن الذي استغرقه أحمد في قطع المسافة ؟

٤ أوجد سرعة عمرو.

٥ إذا بدأ عمرو التحرك الساعة ٣٠ : ٩ صباحاً فمتى يصل إلى القرية الأخرى.

«نعم ، ٣٠ دقيقة ، ٨٠ دقيقة ، ٠,١٨ كم/دقيقة ، ٢٠ : ١٠ صباحاً ، ق س»

٨ تحركت دراجة بخارية حركة منتظمة فوجد أنها بعد دقيقة واحدة أصبحت على بعد ٢ كم من نقطة ١ ، وبعد ٣ دقائق أصبحت على بعد ٥ كم من نفس النقطة.

ارسم شكلاً بيانياً يمثل العلاقة بين المسافة والزمن لهذه الدراجة ومن الرسم :

١ أوجد سرعة الدراجة.

٢ اكتب العلاقة الرياضية بين الزمن (t) والمسافة (f).

$$f = 1,5t \text{ ، } f = 1,5 + 0,5t$$

٩ تتحرك سيارة على طريق مستقيم بسرعة ٨٠ كم/ساعة فإذا تحركت على نفس الطريق دراجة بخارية بسرعة ٢٠ كم/ساعة. أوجد السرعة النسبية للدراجة بالنسبة للسيارة في كل من الحالتين الآتيتين :

١ الدراجة تتحرك في نفس اتجاه حركة السيارة.

٢ الدراجة تتحرك عكس اتجاه حركة السيارة.

$$50 \text{ كم/س ، } 110 \text{ كم/س}$$

١٠ تتحرك مدمرة وسفينة معادية في خط مستقيم فإذا كانت المدمرة تطارد السفينة بسرعة ثابتة ٦٠ كم/س وكانت السفينة تبدو لقائد المدمرة أنها متحركة نحوه بسرعة ٢٠ كم/س فأوجد السرعة الفعلية للسفينة.

$$40 \text{ كم/س في نفس اتجاه المدمرة}$$

١١ تتحرك سيارة رادار لمراقبة السرعة على الطريق الصحراوي بسرعة ٤٠ كم/س ، راقبت هذه

السيارة حركة سيارة نقل قادمة في الاتجاه المضاد ، فبذت وكأنها تتحرك بسرعة ١٢٠ كم/س

$$80 \text{ كم/س}$$

فما هي السرعة الفعلية لسيارة النقل ؟

١٢ قطاران يسيران على خطين متوازيين والمسافة بينهما ٣,٥ كم فإذا كانت سرعة أحدهما ٥٠ كم/س وسرعة الآخر ٢٠ كم/س. فبعد كم من الزمن يتجاوران ؟ إذا كانا :

١ يسيران في اتجاهين متضادين وجهاً لوجه.

٢ يسيران في اتجاه واحد (الأسرع في الخلف).

$$\text{«بعد ٣ دقائق ، بعد ٧ دقائق»}$$

١٣ تتحرك سيارتان ١ ، ٢ على طريق مستقيم بالسرعتين ٦٠ كم/س ، ٩٠ كم/س وفى اتجاه  $\overleftarrow{A}$

١ أوجد سرعة ٢ بالنسبة إلى ١

٢ أوجد سرعة ١ بالنسبة إلى ٢

٣ إذا كانت المسافة بينهما ١٠ كم فبعد كم دقيقة يمكن أن يلتقيا ؟

« ٣٠ كم/س فى اتجاه  $\overleftarrow{A}$  ، ٣٠ كم/س فى اتجاه  $\overleftarrow{A}$  ، ٢٠ دقيقة »

١٤ يسير طارق فى طريق مستقيم بسرعة ٦٠ م/د شاهد أيمن الذى يسير فى نفس الطريق بسرعة ٤٠ م/د فإذا

كان البعد بينهما ١٠٠ متر. فبعد كم دقيقة يلتقيان ؟ إذا كانا :

١ يسيران فى اتجاه واحد (الأسرع فى الخلف).

٢ يسيران فى اتجاهين متضادين.

« ٥ ، ١ دقيقة »

١٥ تتحرك سيارتان على نفس الطريق المستقيم فى اتجاهين متضادين فإذا كانت المسافة بينهما ٤ كم وسرعة إحدى

السيارتين ٧٠ كم/س وتقابلتا بعد دقيقتين. فما هى السرعة الفعلية للسيارة الأخرى ؟ « ٥٠ كم/س »

١٦ تتحرك طائرتان بنفس السرعة فى مسار مستقيم ، بحيث تتابع إحداهما الأخرى والمسافة بينهما ٥٠٠ متر

وفى لحظة ما أطلقت الطائرة الخلفية صاروخاً على الطائرة الأمامية فأصابها بعد مرور ثانيتين من إطلاقه.

فما هى سرعة دفع الصاروخ ؟

« ٢٥٠ م/ث »

١٧ طائرة مقاتلة تلاحق قاذفة قنابل ويسيران على نفس الخط المستقيم ولهما نفس السرعة والاتجاه. فإذا

كانت المسافة بينهما ٢٠ كم عندما أطلقت المقاتلة صاروخاً والذى كانت سرعته الكلية ١٢٠٠ كم/س فأصاب

القاذفة بعد ٤ دقائق فما هى سرعة كل من الطائرتين ؟

« ٩٠٠ كم/س »

١٨ قامت سيارة (١) تتحرك على طريق مستقيم بقياس السرعة النسبية لسيارة (ب) قادمة فى الاتجاه المضاد

فوجدتها ١٢٠ كم/س ، لما ضاعفت السيارة (١) سرعتها وأعدت القياس وجدت أن سرعة (ب) أصبحت

١٨٠ كم/س. أوجد السرعة الفعلية لكل من السيارتين. « ٦٠ كم/س ، ٦٠ كم/س »

١٩ سيارة (١) متحركة على طريق مستقيم رصدت سرعة سيارة أخرى (ب) قادمة فى الاتجاه المضاد

فوجدتها ١٣٠ كم/س ، ولما خفضت السيارة (١) سرعتها إلى النصف وأعدت رصد السيارة (ب) فوجدت

أن سرعتها ١١٠ كم/س. فما هى السرعة الفعلية لكل من السيارتين. « ٤٠ كم/س ، ٩٠ كم/س »

٢٠ قامت سيارة (١) متحركة على طريق مستقيم بقياس السرعة النسبية لسيارة (ب) قادمة فى الاتجاه المضاد

فوجدتها ١٢٠ كم/ساعة ولما خفضت السيارة (١) سرعتها حتى أصبحت  $\frac{3}{4}$  سرعتها الأولى وأعدت القياس

وجدت أن السرعة النسبية للسيارة (ب) أصبحت ١٠٠ كم/ساعة.

فما هى السرعة الفعلية لكل من السيارتين ؟ « ٨٠ كم/س ، ٤٠ كم/س »

٢٢ أثناء حركة سيارة الشرطة (٢) على طريق مستقيم راقبت السيارة (ب) المتحركة في الاتجاه المضاد فبدت وكأنها تتحرك بسرعة مقدارها ١٤٠ كم/ساعة وفي نفس اللحظة راقبت سيارة الشرطة (٢) عربة النقل (ح) المتحركة في نفس الاتجاه فبدت وكأنها تتحرك بسرعة مقدارها ٦٠ كم/ساعة.  
احسب سرعة عربة النقل (ح) بالنسبة إلى السيارة (ب) « ٢٠٠ كم/س في اتجاه سيارة الشرطة»

٢٣ قامت سيارة شرطة متحركة بسرعة منتظمة على طريق أفقى بقياس السرعة النسبية لشاحنة تتحرك أمامها وفي نفس الاتجاه فوجدتها ٦٠ كم/س ولما زادت سرعة سيارة الشرطة إلى الضعف وأعدت القياس فبدت الشاحنة وكأنها ساكنة.  
أوجد السرعة الفعلية لكل من سيارة الشرطة والشاحنة. « ٦٠ كم/س ، ١٢٠ كم/س»

٢٤ عندما كانت سيارة الشرطة (٢) تتحرك على طريق مستقيم بسرعة ٤٢ كم/س شاهدت سيارة أخرى (ب) ودراجة (ح) تسيران على نفس الطريق فبدت لها السيارة (ب) كما لو كانت قادمة في الاتجاه المضاد بسرعة ١٣٢ كم/س وبدت لها الدراجة (ح) كما لو كانت تتقهقر بسرعة ١٢ كم/س. أوجد السرعة الفعلية لكل من السيارة (ب) والدراجة (ح).  
« ٩٠ كم/س عكس اتجاه حركة سيارة الشرطة ، ٣٠ كم/س في نفس اتجاه حركة سيارة الشرطة»

٢٥ يتحرك طراد وسفينة على مسار مستقيم واحد بحيث كان كل منهما يتحرك نحو الآخر وقد راقب الطراد حركة السفينة وعندما كانت على بُعد ٢٠ كم منه كانت سرعة السفينة ٤٠ كم/ساعة وسرعة الطراد ٥٢ كم/ساعة وعندئذ أطلق الطراد عليها طوربيدًا بسرعة ١٠٨ كم/ساعة. احسب الزمن الذى يمضى من لحظة إطلاق الطوربيد حتى لحظة إصابة السفينة.  
« ٦ دقائق»

٢٦ مر قطار ٢ طولُه ٨٠ مترًا يتحرك بسرعة ١٢٠ كم/س بقطار آخر ب طولُه ١٢٠ مترًا أوجد الزمن اللازم لكي يمر القطار ٢ بالكامل من القطار ١ إذا كان القطار ١ :

- ١) ساكنًا.
- ٢) متحركًا بسرعة ٧٠ كم/س في نفس اتجاه حركة القطار ٢
- ٣) متحركًا بسرعة ٨٠ كم/س في عكس اتجاه حركة القطار ٢


« ٦ ثوان ، ١٤.٤ ثانية ، ٣.٦ ثانية»

٢٧ يتحرك قطار ٢ بسرعة ١٠٠ كم/س ، لحق بقطار آخر ب طولُه ١٩٠ مترًا يتحرك بسرعة ٦٠ كم/س على شريط موازٍ فمر عليه بالكامل فى ٢٧ ثانية.  
أوجد طول القطار ٢ والزمن الذى يستغرقه فى عبور كوبرى طولُه ٩٠ مترًا.  
« ١١٠ أمتار ، ٧.٢ ثانية»

مسائل تقيس مستويات عليا من التفكير

ثالثاً

١ اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :



١ في الشكل المقابل :

جسيم تحرك من نقطة ٢ إلى نقطة ١ على دائرة طول نصف قطرها ٢ق فإن الإزاحة الحادثة = .....

- (أ) ٢ق  $\theta$  (ب) ٢ق  $\theta$  (ج) ٢ق ما  $\theta$  (د) ٢ق ما  $\frac{\theta}{٢}$


٢ إذا تحرك جسم مسافة (ف) بسرعة (١ع) ثم تحرك في نفس الاتجاه مسافة (ف) بسرعة (٢ع) فإن السرعة المتوسطة تكون .....

- (أ)  $\frac{١}{٢} (١ع + ٢ع)$  (ب)  $\frac{١}{٢} (١ع + ٢ع)$  (ج)  $\frac{٢ع ١ع}{٢ع + ١ع}$  (د)  $\frac{٢}{٢ع + ١ع}$

٣ وُجد أنه لو تحرك جسم بسرعة ١٤ كم/س بدلاً من ١٠ كم/س لقطع مسافة أكثر بمقدار ٢٠ كم فإن المسافة التي يقطعها الجسم بالسرعة ١٤ كم/س هي .....

- (أ) ٥٠ (ب) ٥٦ (ج) ٧٠ (د) ٨٠

٤ قطاران لهما نفس الطول يسيران في نفس الاتجاه في خطين متوازيين الأول



بسرعة ٤٦ كم/س والثاني بسرعة ٢٦ كم/س فإذا لحق القطار السريع القطار البطيء وتخطاه بالكامل في ٢٦ ثانية فإن طول كل قطار = .....

- (أ) ٢٥ (ب) ٥٠ (ج) ٧٥ (د) ١٠٠

٥ متسابق يلف مضمار ثابت عبارة عن خطين متوازيين طول كل منهما ٩٦ متر وتتصل نهايتي كل طرف بنصف دائرة طول نصف قطرها ٤٩ متر



إذا أتم المتسابق دورة كاملة في ١٠٠ ثانية فإن مقدار متجه السرعة المتوسطة = ..... م/ث ( $\frac{٢٢}{٧} = \pi$ )

- (أ) ٢,٥ (ب) ٥ (ج) ١٠ (د) صفر

٦) قطار متحرك بسرعة منتظمة مقدارها ١٥ م/ث يعبر رجل ساكن في ٢٧ ثانية فإن المدة الزمنية التي يعبر بها نفس القطار بالكامل رصيف طوله ١٥٠ متر تساوى ..... ثانية.

(١) ٢٧ (ب) ٣٠ (ج) ٣٧ (د) ٤٢

٧) تحركت سيارة مسافة ٣٠ كم بسرعة منتظمة ٣٠ كم/س ثم تحركت فى نفس الاتجاه مسافة ٩٠ كم بسرعة (ع) فإذا كانت سرعتها المتوسطة خلال الرحلة كلها هى ٤٠ كم/س

فإن : ع = ..... كم/س

(١) ٣٠ (ب) ٦٠ (ج) ٤٥ (د) ١٢٠

٨) قطاران يسيران فى اتجاهين متضادين يعبران رجل ساكن على الرصيف فى زمنين ٢٧ ثانية ، ١٧ ثانية على الترتيب ويعبران بعضهما فى ٢٣ ثانية فإن النسبة بين سرعتيهما .....

(١) ٣ : ١ (ب) ١٢ : ١ (ج) ٢ : ٣ (د) ٤ : ٣

٩) إذا كان :  $\vec{v}_1$  ،  $\vec{v}_2$  متجهى سرعة جسمين يتحركان فى الاتجاهين  $\vec{u}_1$  ،  $\vec{u}_2$  على الترتيب فإن اتجاه  $\vec{v}_1$  يكون .....

(أ) فى اتجاه  $\vec{u}_1$  دائماً.

(ب) فى اتجاه  $\vec{u}_2$  فقط عندما  $\|\vec{v}_1\| < \|\vec{v}_2\|$

(ج) فى اتجاه  $\vec{u}_1$  دائماً.

(د) فى اتجاه  $\vec{u}_2$  فقط عندما  $\|\vec{v}_1\| > \|\vec{v}_2\|$

٢ طائرة هليوكوبتر تطير فى خط مستقيم بسرعة ١٢٦ كم/س فوق قطار يتحرك فى نفس الاتجاه فوصلت

الطائرة من مؤخرة القطار إلى مقدمته خلال ١٥ ثانية ولما خفض قائد الطائرة سرعتها إلى النصف

أصبحت الطائرة فوق مؤخرة القطار خلال ٢٠ ثانية. أوجد طول القطار بالمتراً. «١٥٠ متراً»

٣ يتحرك رجل على كوبرى  $\vec{A}$  ، وعندما قطع  $\frac{3}{8}$  طول الكوبرى من جهة  $\vec{A}$  سمع صوت صفير قطار يتحرك خلفه بسرعة منتظمة مقدارها ٦٠ كم/س نحو نقطة  $\vec{A}$  فإذا تحرك الرجل نحو القطار فإن القطار سيصدمه عند نقطة  $\vec{A}$  مباشرة.

أوجد السرعة المنتظمة التى يتحرك بها الرجل قبل أن يصدمه القطار مباشرة عند نقطة  $\vec{A}$  «١٥ كم/س»





## 2 الحركيات

### الحركة منتظمة التغير في خط مستقيم

إذا تحرك جسيم بحيث يتغير متجه سرعته من لحظة لأخرى في المقدار أو الاتجاه أو في كليهما فإنه يقال أن الجسيم يتحرك حركة متغيرة أو أنه يتحرك بعجلة (تسارع).

#### تعريف متجه العجلة

هو المعدل الزمني للتغير في متجه السرعة أ، هو التغير في متجه السرعة في وحدة الزمن.

فإذا كان:  $\vec{v}_1$ ،  $\vec{v}_2$  متجهي سرعة جسيم عند لحظتين متتاليتين  $t_1$ ،  $t_2$  على الترتيب

$$\vec{a} = \frac{\vec{v}_2 - \vec{v}_1}{t_2 - t_1} = \text{متجه العجلة المتوسطة ح}$$

وفي حالة أن الفترة الزمنية ( $t_2 - t_1$ ) تكون متناهية في الصغر فإن متجه العجلة في هذه الحالة يعرف بمتجه العجلة اللحظية (التسارع اللحظي) ويرمز له بالرمز ( $\vec{a}$ )

#### أنواع الحركة في خط مستقيم

**الحركة المنتظمة** هي حركة بسرعة ثابتة مقداراً واتجاهاً بمرور الزمن.

**الحركة المتغيرة** هي حركة تتغير فيها سرعة الجسيم بمرور الزمن.

**الحركة المنتظمة التغير** هي حركة تتغير فيها سرعة الجسيم بمعدل زمني ثابت.

**أي أن** في حالة الحركة المنتظمة التغير متجه عجلة الجسيم يكون ثابتاً مقداراً واتجاهاً بمرور الزمن.

\* من المعروف أن اتجاه السرعة دائماً في نفس اتجاه الحركة لجسيم أما اتجاه العجلة فإنه قد يكون :

1 في نفس اتجاه الحركة وهنا فإن سرعة الجسيم تزداد بمرور الزمن وتكون ح لها نفس إشارة ع في القياس الجبري لمتجهي العجلة والسرعة.

٢ في عكس اتجاه الحركة وهنا فإن سرعة الجسم تتناقص بمرور الزمن وتكون حلالها عكس إشارة ع في القياس الجبري لمتجهي العجلة والسرعة.

### وحدات قياس مقدار العجلة

∴ وحدة قياس مقدار متجه العجلة =  $\frac{\text{وحدة قياس مقدار متجه السرعة}}{\text{وحدة قياس الزمن}}$

∴ يمكن قياس مقدار العجلة بالوحدات الآتية :

سم/ث / ث (وتكتب سم/ث<sup>٢</sup>) ، أ، متر/ث / ث (وتكتب متر/ث<sup>٢</sup>)

أ، كم/س / س (وتكتب كم/س<sup>٢</sup>) ، أ، كم/س / ث ، أ، متر/ث / دقيقة ... إلخ.

### مثال ١

حول عجلة مقدارها ١ كم/س / ث إلى :

١ متر/ث<sup>٢</sup> . ٢ سم/ث<sup>٢</sup> . ٣ كم/س<sup>٢</sup> . ٤ متر/ث / دقيقة.

### الحل

$$١ \text{ كم/س / ث} = \frac{١ \text{ كم}}{\text{س} \times \text{ث}} = \frac{١٠٠٠ \text{ متر}}{\text{ث} \times ٦٠ \times ٦٠} = \frac{٥}{١٨} \text{ متر/ث}^٢$$

$$١ \text{ كم/س / ث} = \frac{١ \text{ كم}}{\text{س} \times \text{ث}} = \frac{١٠٠ \times ١٠٠٠ \text{ سم}}{\text{ث} \times ٦٠ \times ٦٠} = \frac{٢٥٠}{٩} \text{ سم/ث}^٢$$

$$١ \text{ كم/س / ث} = \frac{١ \text{ كم}}{\text{س} \times \text{ث}} = \frac{١ \text{ كم}}{\frac{١}{٦٠ \times ٦٠} \text{ س}} = ٣٦٠٠ \text{ كم/س}^٢$$

$$١ \text{ كم/س / ث} = \frac{١ \text{ كم}}{\text{س} \times \text{ث}} = \frac{١٠٠٠ \text{ متر}}{٦٠ \text{ دقيقة} \times \text{ث}} = \frac{٥٠}{٣} \text{ متر/ث / دقيقة}$$

### ماذا يعني قولنا بان :

١ جسيماً يتحرك في خط مستقيم بعجلة منتظمة ٦ سم/ث<sup>٢</sup> في اتجاه حركته ؟

- ذلك يعني أن مقدار سرعة هذا الجسيم يزداد أثناء حركته زيادة منتظمة بمعدل ٦ سم/ث كل ثانية.

٢ جسيماً يتحرك في خط مستقيم بعجلة منتظمة ٨ كم/س / دقيقة في عكس اتجاه حركته ؟

- ذلك يعني أن مقدار سرعة هذا الجسيم يتناقص بانتظام أثناء حركته بمعدل ٨ كم/س كل دقيقة.


\* التمثيل البياني لمنحنى السرعة - الزمن لحركة جسيم في خط مستقيم :



• الحركة منتظمة بعجلة = صفر




• الحركة منتظمة التغير بعجلة سالبة (تقصير)



• الحركة منتظمة التغير بعجلة موجبة (تسارع)

• معلومة إثرائية

في حالة كل من المنحنيات التالية مرسومة فوق محور الزمن فإن :




معادلات الحركة منتظمة التغير فى خط مستقيم

وسوف ندرس الآن معادلات الحركة المستقيمة ذات العجلة المنتظمة (الحركة منتظمة التغير). وقد سبق دراسة هذه المعادلات فى مادة الفيزياء بالصف الأول الثانوى وهناك رموز سوف نستخدمها فى هذه القوانين نلخصها فيما يلى :

الرمز	ما يدل عليه
$\vec{v}$	متجه سرعة الجسيم عند بدء قياس الزمن.
$\vec{v}$	متجه سرعة الجسيم فى نهاية الفترة الزمنية $(t)$ .
$\vec{s}$	متجه الإزاحة التى طرأت على الجسيم خلال الفترة الزمنية $t$ .
$\vec{a}$	متجه العجلة.

## المعادلة الأولى «العلاقة بين السرعة والزمن في حالة الحركة المستقيمة بعجلة منتظمة»



نفرض أن جسماً يتحرك في خط مستقيم حركة منتظمة التغير وأن متجه العجلة الثابتة له  $\vec{a} = \vec{a}$  ومتجه سرعته عند بدء قياس الزمن  $\vec{v}_0 = \vec{v}_0$  ومتجه سرعته بعد فترة زمنية مقدارها  $(t) = \vec{v}$

$$\vec{v} - \vec{v}_0 = \vec{a} \cdot t$$

$$\vec{v} = \vec{v}_0 + \vec{a} \cdot t$$

وبأخذ القياسات الجبرية للمتجهات  $\vec{a}$ ،  $\vec{v}$ ،  $\vec{v}_0$  يكون  $v = v_0 + at$

## المعادلة الثانية «العلاقة بين الإزاحة والزمن في حالة الحركة المستقيمة بعجلة منتظمة»

إذا تحرك جسيم بعجلة منتظمة فإن متجه سرعته المتوسطة  $\vec{v}_m$  خلال فترة زمنية معينة يساوي نصف مجموع متجهي سرعته عند بداية ونهاية هذه الفترة الزمنية

$$\vec{v}_m = \frac{\vec{v}_0 + \vec{v}}{2}$$

وباستخدام القياسات الجبرية يكون  $v_m = \frac{v_0 + v}{2}$  ولكن من القانون الأول :

$$v = v_0 + at$$

$$v_m = \frac{v_0 + v_0 + at}{2} = v_0 + \frac{at}{2}$$

$$v_m = \frac{v_0 + v_0 + at}{2} = v_0 + \frac{at}{2}$$

∴ الإزاحة = متجه السرعة المتوسطة × الزمن ،  $f = v_m \times t$

$$f = \left( v_0 + \frac{at}{2} \right) \cdot t = v_0 t + \frac{at^2}{2}$$

### طريقة أخرى لاستنتاج المعادلة السابقة


المساحة أسفل منحني (السرعة - الزمن) تتساوى القياس الجبري لمتجه الإزاحة العادية للجسيم وإذا كانت حركة جسيم منتظمة التغير (بعجلة منتظمة) مبدئياً الحركة بسرعة ابتدائية  $v_0$  وبعد مرور زمن قدره  $t$  أصبحت سرعته  $v$  ممثلة بالشكل المقابل فإن القياس الجبري لمتجه الإزاحة  $f =$  مساحة الجزء تحت الخط البياني

$$f = \text{مساحة المستطيل} + \text{مساحة المثلث} = v_0 t + \frac{1}{2} (v - v_0) t$$

وبالتعويض من المعادلة الأولى

$$f = v_0 t + \frac{1}{2} (v_0 + v_0 + at) t = v_0 t + \frac{at^2}{2}$$

$$f = v_0 t + \frac{at^2}{2}$$



المعادلة الثالثة

«العلاقة بين السرعة والإزاحة في حالة الحركة المستقيمة بعجلة منتظمة»

$$\therefore ع = ع \cdot ح + ح \cdot ح$$

(١)

$$، ف = ع \cdot ح + ح \cdot ح$$

(٢)

∴ بحذف ح من المعادلتين (١) ، (٢) كما يلي :

بتربيع (١) :

$$\therefore ع^2 = ع^2 + ٢ \cdot ع \cdot ح + ح^2$$

$$\therefore ع^2 = ع^2 + ٢ \cdot ح \cdot (ع + ح)$$

وبالتعويض من (٢) :

$$\therefore ع^2 = ع^2 + ٢ \cdot ح \cdot ح$$

ملاحظات :

١ المعادلات السابقة تربط بين أربعة مجاهيل يمكن إيجاد احداها بمعلومية الثلاثة الآخرين.

٢ إشارة كل من ع ، ع ، ح ، ف تتحدد متى حددنا اتجاه متجه الوحدة  $\vec{u}$

٣ عند بدء الحركة لجسيم يكون :  $ح = ٠$

٤ إذا بدأ الجسيم حركته من السكون فإن :  $ع = ٠$

٥ إذا وصل الجسيم إلى أقصى بعد (أو إذا سكن الجسيم) فإن :  $ع = ٠$

٦ إذا تحرك الجسيم بسرعة منتظمة فإن :  $ح = ٠$

٧ إذا تحرك الجسيم بأقصى سرعة له فإن :  $ح = ٠$

٨ إذا عاد الجسيم إلى موضعه الأصلي فإن :  $ف = ٠$

٩ في حالة معرفة ع ، ع ، ح فإنه ليس من الضروري إيجاد العجلة ح

$$\text{لحساب الإزاحة ف حيث يمكن استخدام المعادلة } ف = \frac{ع + ع}{٢} \cdot ح$$

أي  $ف = ع \cdot ح$  (المستخدمة في إثبات المعادلة الثانية)

١٠ اتجاه السرعة دائماً في اتجاه الحركة أما اتجاه العجلة فقد يكون في اتجاه الحركة (تسارع) أو في عكس اتجاه الحركة (تقصير).

١١ أي حركة تقصيرية لا يمكن أن تستمر إلا لفترة محدودة من الزمن ثم تنقلب بعدها إلى حركة متسارعة في الاتجاه المضاد.

## مثال ٢

تتحرك سيارة في خط مستقيم مبتدئة من السكون بعجلة منتظمة مقدارها  $\frac{1}{4}$  م/ث<sup>٢</sup> في نفس اتجاه حركة السيارة أوجد :

١ مقدار سرعة السيارة بعد دقيقة واحدة بالكم/س

٢ الزمن بالثواني الذي تستغرقه السيارة حتى تصبح سرعتها ٩٠ كم/س

## الحل

نفرض أن الاتجاه الموجب هو اتجاه حركة السيارة

∴ ع = صفر ، ح =  $\frac{1}{4}$  م/ث<sup>٢</sup> ،  $v = 60$  ثانية

١ ∴ ع = ع + ح × ت ∴  $60 = 0 + \frac{1}{4} \times 30$  م/ث

∴ ع =  $\frac{18}{0} \times 30 = 10.8$  كم/س

٢ ∴ ع = ع + ح × ت ∴  $v \times \frac{1}{4} = 20$

∴  $v \times \frac{1}{4} + \text{صفر} = \frac{0}{18} \times 90$

∴  $v = 50$  ثانية

## مثال ٣

بدأ جسيم حركته في خط مستقيم بعجلة منتظمة ٥ سم/ث<sup>٢</sup> وبسرعة ابتدائية ٢٠ سم/ث في عكس اتجاه العجلة أوجد سرعته وإزاحته بعد :

١ ٣ ثوانٍ      ٢ ٤ ثوانٍ      ٣ ٦ ثوانٍ      ٤ ٩ ثوانٍ

## الحل

نعتبر أن اتجاه السرعة الابتدائية هو الاتجاه الموجب

∴ ع = ٢٠ سم/ث ، ح = -٥ سم/ث<sup>٢</sup>

١ ع = ع + ح × ت = ٥ = ٢٠ + (-٥) × ٣

∴ السرعة بعد ٣ ثوانٍ = ٥ سم/ث في نفس اتجاه ع

ف = ع + ح × ت =  $\frac{1}{4} \times ٣ + ٢٠ = ٢٠.٧٥$  سم

٢ ع = ع + ح × ت = ٤ = ٢٠ + (-٥) × ٤

∴ الجسيم يسكن لحظياً بعد ٤ ثوانٍ

ف = ع + ح × ت =  $\frac{1}{4} \times ٤ + ٢٠ = ٢١$  سم

٣ ع = ع + ح × ت = ١٠ = ٢٠ + (-٥) × ٦

∴ السرعة بعد ٦ ثوانٍ = ١٠ سم/ث في عكس اتجاه ع

ف = ع + ح × ت =  $\frac{1}{4} \times ٦ + ٢٠ = ٢١.٥$  سم

$$ع = ع + ح = ٢٠ + ٩ \times (٥-) = ٢٥-$$

∴ السرعة بعد ٩ ثوانٍ = ٢٥ سم/ث في عكس اتجاه ع.

$$ف = ع + ح = ٢٠ + ٩ \times (٥-) \times \frac{1}{4} = ٢٢,٥-$$

أى أن الجسيم تخطى المكان الذى بدأ منه حركته بمسافة ٢٢,٥ متر في عكس اتجاه ع.

#### مثال ٤

يتحرك جسيم في خط مستقيم بعجلة منتظمة ٢ سم/ث<sup>٢</sup> في اتجاه حركته وبعد أن قطع مسافة ٢,٢٥ متر أصبحت سرعته ٥٠ سم/ث فما هي سرعته الابتدائية؟

#### الحل

نفرض أن الاتجاه الموجب هو اتجاه حركة الجسيم ، ح = ٢ سم/ث<sup>٢</sup>

$$ف = ٢٢٥ سم ، ع = ٥٠ سم/ث$$

$$ع = ٢ + ح ف$$

$$∴ (٥٠) = ٢ + ح ف$$

$$∴ ع = ١٦٠٠ = ٩٠٠ - ٢٥٠٠ = ٢ ع$$

$$∴ ع = ٤٠ ± سم/ث$$

$$∴ ع = (السرعة الابتدائية للجسيم) = ٤٠ سم/ث$$

$$∴ ع في الاتجاه الموجب$$

### السرعة المتوسطة المقطوعة خلال الثانية النونية للحركة منتظمة التغير

١ لإيجاد المسافة التى قطعها الجسيم خلال الثانية النونية نوجد المسافة التى يكون قد قطعها خلال (١-٢) ثانية الأولى والمسافة التى يكون قد قطعها خلال (١-٢) ثانية الأولى والفرق بينهما هو المسافة المقطوعة خلال الثانية النونية.

أى أن المسافة المقطوعة خلال الثانية النونية =  $ف_{٢-١} - ف_{١-٠}$

فمثلاً : المسافة المقطوعة خلال الثانية الخامسة =  $ف_٥ - ف_٤$

، المسافة المقطوعة خلال الثانية الثامنة والتاسعة =  $ف_٩ - ف_٨$

٢ السرعة المتوسطة لجسيم خلال فترة زمنية ما = سرعته اللحظية فى منتصف هذه الفترة

فمثلاً : السرعة المتوسطة خلال الثانية الخامسة =  $ع + ٤,٥ ح$

، السرعة المتوسطة خلال الثانية الثامنة والتاسعة =  $ع + ٩ ح$

٣ المسافة = السرعة المتوسطة × الزمن

فمثلاً : المسافة المقطوعة خلال الثانية الخامسة =  $١ \times (ع + ٤,٥ ح)$


، المسافة المقطوعة خلال الثانية الثامنة والتاسعة =  $٢ \times (ع + ٩ ح)$

## فمثلاً :

١ إذا قطع جسيم مسافة ٥ أمتار خلال الثانية الرابعة (١ ثانية)

فإن سرعته المتوسطة =  $\frac{٥}{١} = ٥$  متر/ث


وتكون مساوية لسرعة الجسيم بعد  $٣\frac{١}{٢}$  ثانية من بدء الحركة  
 $\therefore ٥ = ٣\frac{١}{٢} + ع$  ح



٢ إذا قطع جسيم مسافة ٨ سم خلال الثانية الخامسة والسادسة (٢ ثانية)

فإن سرعته المتوسطة =  $\frac{٨}{٢} = ٤$  سم / ث

وتكون مساوية لسرعة الجسيم بعد ٥ ثوانٍ  
 $\therefore ٤ = ٥ + ع$  ح




٣ إذا قطع جسيم مسافة ١٨ متراً

خلال الثواني الثلاث السابعة

والثامنة والتاسعة (٣ ثوانٍ)

$\therefore$  سرعته المتوسطة =  $\frac{١٨}{٣} = ٦$  م/ث وتكون مساوية لسرعة الجسيم بعد  $٧\frac{١}{٢}$  ثانية

$\therefore ٦ = ٧\frac{١}{٢} + ع$  ح



## مثال ٥

بدأ جسيم حركته من السكون في خط مستقيم بعجلة منتظمة فقطع مسافة ٣٨ سم في الثانية العاشرة من حركته. أوجد مقدار عجلته والمسافة التي قطعها في الثانية الخامسة من حركته.

## الحل

السرعة المتوسطة خلال الثانية العاشرة

$$= \frac{٣٨}{١} = ٣٨ \text{ سم/ث}$$

وهي تساوي سرعة الجسيم في منتصف

الثانية العاشرة أي بعد ٩,٥ ثانية من بدء الحركة.

$$ع = ع + ص$$

$$\therefore ٣٨ = ٩,٥ + ع$$

$$\therefore ع = \frac{٣٨}{٩,٥} = ٤ \text{ سم/ث}.$$

ولإيجاد المسافة المقطوعة في الثانية الخامسة نقول :

السرعة المتوسطة خلال الثانية الخامسة = السرعة في منتصف الثانية الخامسة

= السرعة بعد ٤,٥ ثانية من بدء الحركة







## مثال ٧

يتحرك جسيم في اتجاه ثابت بسرعة ابتدائية ٢٠ سم/ث وعجلة منتظمة ٨ سم/ث<sup>٢</sup> في اتجاه سرعته أوجد : ١ المسافة التي يكون الجسيم قد قطعها خلال الثانية الخامسة فقط. ٢ المسافة التي يكون الجسيم قد قطعها خلال الثانية السابعة والثامنة معاً.

## الحل

١ نعتبر اتجاه السرعة الابتدائية هو الاتجاه الموجب

$$ع. = ٢٠ \text{ سم/ث} ، ح. = ٨ \text{ سم/ث}^٢$$

$$، \therefore ف = ع. \cdot ح. + \frac{١}{٢} ح. \cdot ح. \cdot ح.$$

$$\therefore ف٥ (خلال ٥ ثواني الأولى) = ٢٠ \times ٥ + \frac{١}{٢} (٨) (٥)^٢ = ٢٠٠ \text{ سم}$$

$$، ف٤ (خلال ٤ ثواني الأولى) = ٢٠ \times ٤ + \frac{١}{٢} (٨) (٤)^٢ = ١٤٤ \text{ سم}$$

$$\therefore \text{المسافة التي قطعها الجسيم خلال الثانية الخامسة فقط} = ١٤٤ - ٢٠٠ = ٥٦ \text{ سم}$$

## حل آخر:

السرعة المتوسطة خلال الثانية الخامسة

= السرعة في منتصف الثانية الخامسة

= السرعة بعد ٥,٥ ثانية من بدء الحركة

$$، \therefore ع = ع. + ح. \cdot ح.$$

$$\therefore ع = ٢٠ + ٨ \times ٥,٥ = ٥٦ \text{ سم/ث}$$

$$\therefore \text{المسافة المقطوعة خلال الثانية الخامسة} = ع \times \text{الزمن} = ٥٦ \times ١ = ٥٦ \text{ سم}$$

٢ المسافة التي قطعها الجسيم خلال الثانية السابعة والثامنة معاً

$$= ف٨ - ف٦ = ٨ \times ٢٠ + \frac{١}{٢} (٨) (٨)^٢ - [٦ \times ٢٠ + \frac{١}{٢} (٨) (٦)^٢] = ١٥٢ \text{ سم}$$

## حل آخر:

السرعة المتوسطة خلال الثانية السابعة والثامنة معاً

= السرعة بعد ٧ ثوانٍ من بدء الحركة

$$، \therefore ع = ع. + ح. \cdot ح.$$


$$\therefore ع = ٢٠ + ٨ \times ٧ = ٧٦ \text{ سم/ث}$$

$$\therefore \text{المسافة المقطوعة خلال الثانية السابعة والثامنة معاً} = ع \times \text{الزمن} = ٧٦ \times ٢ = ١٥٢ \text{ سم}$$

مثال ٨

كرة صغيرة تم دفعها في عكس اتجاه الرياح بسرعة ٥ متر/ث فتحركت في خط مستقيم بتقصير منتظم ٢ متر/ث<sup>٢</sup> أوجد الزمن الذي يمضى من لحظة الدفع حتى تصبح الكرة على بُعد ٦ أمتار من مكان القذف.

الحل



نعتبر الاتجاه الموجب هو اتجاه سرعة الدفع ع.

$$\therefore ع = ٥ \text{ متر/ث}$$

ح = ٢- متر/ث<sup>٢</sup> وعندما تكون الكرة على بُعد ٦ أمتار من مكان الدفع (و) فإن :

ف = ٦ + أ ، ف = ٦- حيث ف الموجبة تعنى أن الكرة تقع عند أ في جهة الإزاحة الموجبة أى في الجانب الذى دفعت ناحيته ، ف السالبة تعنى أن الكرة تقع عند ب في جهة الإزاحة السالبة أى في الجانب الآخر بالنسبة لمكان الدفع (و).

١ إذا كانت : ف = ٦ + :

$$\begin{aligned} \therefore ف = ع \cdot ح + \frac{1}{2} ح^2 \quad \therefore ٦ = ٥ \cdot ح + \frac{1}{2} \cdot ٢ \cdot ح^2 \\ \therefore ٠ = (٢ - ح) (٢ + ح) \end{aligned}$$

∴ الكرة تكون على بُعد ٦ أمتار من مكان الدفع وفي الجهة التى دفعت ناحيتها مرتين بعد مرور ثانيتين وهى متحركة في الاتجاه الموجب وبعد مرور ٣ ثوانٍ وهى متحركة في الاتجاه السالب بعد أن تكون قد وصلت إلى حالة السكون اللحظى عند ه وغيّرت اتجاه حركتها.

٢ إذا كانت : ف = ٦- :

$$\begin{aligned} \therefore ف = ع \cdot ح + \frac{1}{2} ح^2 \quad \therefore ٦- = ٥ \cdot ح + \frac{1}{2} \cdot ٢ \cdot ح^2 \\ \therefore ٠ = (٦ + ح) (٦ - ح) \end{aligned}$$


∴ الكرة تكون على بُعد ٦ أمتار من مكان الدفع وفي الجهة الأخرى وهى جهة الإزاحة السالبة بالنسبة لنقطة الدفع بعد مرور ٦ ثوانٍ من لحظة الدفع.

مثال ٩

أطلقت رصاصة أفقيًا على كتلة خشبية بسرعة ١٠٠ متر/ث فغاصت فيها مسافة ٥٠ سم حتى سكنت. أوجد العجلة التى تحركت بها الرصاصة إذا علم أنها عجلة منتظمة ، وإذا تم إطلاقها على كتلة خشبية أخرى مماثلة للأولى سمكها ١٨ سم. فما هى السرعة التى تخرج بها الرصاصة من الكتلة الخشبية ؟

الحل

نفرض أن الاتجاه الموجب هو اتجاه حركة الرصاصة.



• بالنسبة للكتلة الخشبية الأولى :


$$ع = 100 \text{ م/ث} ، ع = 0$$

$$ف = \frac{1}{4} \text{ متر}$$

$$ع = 2 + ع = 2$$

$$\frac{1}{4} \times 2 + 2(100) = 0 \therefore$$

∴ ح (العجلة المنتظمة للرصاصة) = - 10000 م/ث² أى فى عكس اتجاه إطلاق الرصاصة



• بالنسبة للكتلة الخشبية الثانية :

$$ع = 100 \text{ م/ث} ، ح = - 10000 \text{ م/ث}^2$$

$$ف = 18 \text{ سم} = 0.18 \text{ متر}$$

$$ع = 2 + ع = 2$$

$$\therefore ع = 10000 \times 2 - 0.18 \times 10000$$

$$\therefore ع = 3600 - 10000 = - 6400 \text{ م/ث}^2$$

∴ السرعة التى تخرج بها الرصاصة فى نفس اتجاه إطلاق الرصاصة أى فى الاتجاه الموجب


∴ ع سرعة خروج الرصاصة من الكتلة الخشبية الثانية = 80 متر/ث

### مثال ١٢

تتحرك سيارة بسرعة منتظمة ١٤٤ كم/س ، مرت بسيارة شرطة ساكنة فبدأت سيارة الشرطة فى متابعتها بعد ١٠ ثوان من مرورها ، متحركة بعجلة منتظمة لمسافة ٢٠٠ متر حتى بلغت سرعتها ١٨٠ كم/س ، ثم سارت بهذه السرعة حتى لحقت بالسيارة الأولى.

أوجد الزمن الذى استغرقته سيارة الشرطة من بدء حركتها حتى لحاقها بالسيارة.

### الحل



نعتبر الاتجاه الموجب هو اتجاه حركة السيارة وأن السيارة مرت بسيارة الشرطة عند A وأن سيارة الشرطة لحقتها عند B وأن الزمن الذى استغرقته سيارة الشرطة من بدء حركتها حتى لحقت بالسيارة = ٨ ثوانية

• السيارة قطعت المسافة AB بسرعة منتظمة =  $144 \times \frac{5}{18} = 40$  متر/ث

فى زمن قدره (٨ + ١٠) ثانية

∴ AB = 40 (٨ + ١٠) متراً

(١) ...

• سيارة الشرطة تحركت مسافتين  $ح$  ،  $ح ب$  :

أولاً: تحركت المسافة  $ح$  وقدرها  $٢٠٠$  متر بعجلة منتظمة حيث  $ع =$

$$ع = ١٨٠ \times \frac{٥}{١٨} = ٥٠ \text{ متر/ث}$$

$$ع = ٥٠ \text{ متر/ث} \Rightarrow ٢٠٠ = ح \times ٥٠ \Rightarrow ح = ٤ \text{ ثوان}$$

$$ع = ٥٠ \text{ متر/ث} \Rightarrow ٤٠٠ = ح \times ٥٠ \Rightarrow ح = ٨ \text{ ثوان}$$

∴ الزمن قطع المسافة  $ح ب = ٨$  ثوان

ثانياً: المسافة  $ح ب$  تحركتها سيارة الشرطة بسرعة منتظمة  $٥٠$  متر/ث في زمن قدرة  $(٨ - ح)$  ثانية.

$$∴ \text{المسافة } ح ب = ٥٠(٨ - ح) ، ∴ ٤٠٠ = ٤٠٠ - ٥٠ ح$$

$$∴ ٤٠٠ = ٤٠٠ - ٥٠ ح \Rightarrow ٥٠ ح = ٠ \Rightarrow ح = ٠$$

$$\text{من (١) ، (٢) : } ∴ ٤٠٠ = ٤٠٠ - ٥٠ ح \Rightarrow ٥٠ ح = ٠$$

$$∴ ٤٠٠ = ٤٠٠ - ٥٠ ح \Rightarrow ٥٠ ح = ٠ \Rightarrow ح = ٠$$

∴  $ح = ٦٠$  ثانية وهو الزمن الذي استغرقته سيارة الشرطة حتى لحقت بالسيارة الأخرى.

### مثال

ترام يسير في خط مستقيم بين محطتين  $أ$  ،  $ب$  المسافة بينهما  $٧٠٠$  متر حيث يبدأ من المحطة  $أ$  من السكون بعجلة

منتظمة  $٢$  متر/ث<sup>٢</sup> لمدة  $١٠$  ثوان ثم يسير بعد ذلك بسرعة منتظمة فترة من الزمن ثم يقطع مسافة  $٦٠$  متراً الأخيرة

من حركته بتقصير منتظم حتى يقف في المحطة  $ب$

أوجد الزمن الذي يستغرقه في قطع المسافة بين المحطتين.

### الحل

نعتبر الاتجاه الموجب هو اتجاه حركة الترام

• باعتبار حركة الترام بين  $أ$  ،  $ب$  :

$$ع = ٠ ، ح = ٢ \text{ م/ث}^٢ ، ح ب = ٦٠ \text{ ثوان}$$

$$∴ ح ب = ٦٠ \text{ ثوان} \Rightarrow ٦٠ = ح \times ٢ \Rightarrow ح = ٣٠ \text{ م/ث}$$

$$∴ ح ب = ٦٠ \text{ ثوان} \Rightarrow ٦٠ = ح \times ٢ \Rightarrow ح = ٣٠ \text{ م/ث}$$

$$∴ ح ب = ٦٠ \text{ ثوان} \Rightarrow ٦٠ = ح \times ٢ \Rightarrow ح = ٣٠ \text{ م/ث}$$

∴ سرعة الترام في نهاية الثواني العشر الأولى =  $٢٠$  متر/ث في الاتجاه الموجب وهي نفسها السرعة المنتظمة

التي يسير بها الترام خلال قطع المسافة  $ب$  وهي أيضاً السرعة الابتدائية بالنسبة لحركة الترام بين  $ب$  ،  $أ$

• باعتبار حركة الترام بين  $s$  ،  $b$  :

$$ع = ٢٠ \text{ متر/ث} ، ع = ٠ ، ف = ٦٠ \text{ متراً}$$

$$\therefore ع = ٢ع + ٢ \text{ حرف}$$

$$\therefore ٠ = ٢(٢٠) + ٢ \text{ حرف} \times ٦٠$$

$$\therefore ح = - \frac{٤}{١٣} = - \frac{١}{٣} \text{ متر/ث}^٢$$

$$، \therefore ع = ع + ح \nu \quad \therefore ٠ = ٢٠ - \frac{١}{٣} \nu \quad \therefore \nu = \frac{٣}{١} \times ٢٠ = ٦ \text{ ثوانٍ}$$

∴ زمن قطع مسافة ٦٠ متراً الأخيرة = ٦ ثوانٍ

• باعتبار حركة الترام بين  $h$  ،  $s$  :

$$١ هـ + س = ٦٠ + ١٠٠ = ١٦٠ \text{ متراً} \quad \therefore هـ = ١٦٠ - ٧٠٠ = ٥٤٠ \text{ متراً}$$

$$\therefore \text{الحركة منتظمة السرعة} \quad \therefore ف = ع \times \nu \quad \therefore ٥٤٠ = ٢٠ \times \nu$$

$$\therefore \nu = \frac{٥٤٠}{٢} = ٢٧ \text{ ثانية وهو زمن قطع هـ} \quad \therefore \text{الزمن كله} = ٦ + ٢٧ + ١٠ = ٤٣ \text{ ثانية}$$



اختبر نفسك

من أسئلة الكتاب المدرس

مستويات عليا

لتطبيق

فهم

تذكر

أسئلة الاختيار من متعدد

أولاً

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

- ١) ١٨٠ مترًا/ساعة / ث = ..... سم/ث<sup>٢</sup>

(أ)  $\frac{1}{3}$  (ب) ٥ (ج) ٣٠ (د) ٣٠٠
- ٢) عند بدء الحركة لجسيم فإن ..... = صفر

(أ) ع (ب) ع (ج) ح (د) ح
- ٣) إذا تحرك جسيم بسرعة منتظمة فإن : ح = .....

(أ) عدد موجب (ب) عدد سالب (ج) صفر (د) ع
- ٤) إذا تحرك جسيم في خط مستقيم ثم عاد إلى موضعه الابتدائي ، فإن .....

(أ) ع = ع (ب) ح = ح (ج) ف = ف (د) ع = ع
- ٥) عندما يصل جسيم إلى أقصى بُعد فإن .....

(أ) ح = ح (ب) ع = ع (ج) ح = ع (د) ع = ع
- ٦) القياس الجبرى لعجلة الجسم المتحرك يمكن حسابها بيانياً بواسطة .....

(أ) ميل منحنى السرعة - الزمن (ب) المساحة تحت منحنى السرعة - الزمن  
(ج) ميل منحنى الإزاحة - الزمن (د) المساحة تحت منحنى الإزاحة - الزمن
- ٧) إذا كان منحنى السرعة يمثل بقطعة مستقيمة أفقية في العلاقة بين السرعة والزمن فإن الجسم .....

(أ) يتحرك بعجلة صفرية (ب) يتحرك بعجلة ثابتة غير صفرية  
(ج) ساكن (د) يتحرك بسرعة تزايدية.
- ٨) تتحرك سيارة في خط مستقيم مبدئياً من الساكن بعجلة منتظمة مقدارها ٢٥ سم/ث<sup>٢</sup> في نفس اتجاه حركة السيارة فإن سرعة السيارة بعد  $\frac{1}{4}$  دقيقة = .....

(أ) ٣٧٥ م/ث (ب) ٣,٧٥ م/ث (ج) ٣,٧٥ سم/ث (د) ٣,٧٥ م/ث
- ٩) طائرة تزايد سرعتها بمعدل ١٥ م/ث<sup>٢</sup> فإن الزمن اللازم لزيادة السرعة من ١٠٠ م/ث إلى ١٦٠ م/ث هو ..... ثانية.

(أ) ١٧ (ب) ٠,٠٥ (ج) ٤ (د) ١,٢٥

- ١٠ يتحرك جسيم في خط مستقيم بعجلة منتظمة مقدارها ٨ سم/ث<sup>٢</sup> في اتجاه مضاد لاتجاه سرعته الابتدائية التي مقدارها ٤ م/ث. فإن سرعة الجسيم بعد  $\frac{1}{4}$  دقيقة من بدء الحركة = .....
- (أ) ١,٦ م/ث<sup>٢</sup> (ب) ١٦ سم/ث (ج) ٥,٧٦ كم/س (د) صفر
- ١١ تتسارع طائرة من سكون على ممر الإقلاع بمقدار ٣ م/ث<sup>٢</sup> فإذا كانت سرعة الإقلاع اللازمة ٩٦ م/ث فإن الزمن المنقضى من بدء الحركة حتى الإقلاع = ..... ثانية.
- (أ) ٢٥ (ب) ٣٢ (ج) ٣٧ (د) ٤٢
- ١٢ بدأ جسم حركته بسرعة ٢٤ م/ث بتقصير منتظم ٨ م/ث<sup>٢</sup> فإن الجسم يتوقف لحظياً بعد زمن = ..... ثانية.
- (أ) ٣ (ب) ١٦ (ج)  $\frac{1}{3}$  (د) ٣٠
- ١٣ يتحرك جسم في خط مستقيم بتقصير منتظم مقداره يساوي ٣ م/ث<sup>٢</sup> فسكن بعد ١٩ ثانية فإن مقدار السرعة الابتدائية = ..... م/ث
- (أ) ١٦ (ب) ٥٤ (ج) ٦٠ (د) ٥٧
- ١٤ المسافة التي يقطعها جسيم يتحرك في اتجاه ثابت من السكون بعجلة مقدارها ٥ سم/ث<sup>٢</sup> في زمن قدره ٤ ثوان = ..... سم.
- (أ) ١٠ (ب) ٢٠ (ج) ٤٠ (د) ٨٠
- ١٥ إذا بدأ جسيم حركته بسرعة ٢٠ سم/ث وبالعجلة منتظمة ٥ سم/ث<sup>٢</sup> في اتجاه سرعته الابتدائية، فإن المسافة المقطوعة بعد ١٠ ثوان من بدء الحركة = ..... سم.
- (أ) ٥٥٠ (ب) ٣٠٠ (ج) ٧٥٠ (د) ١٥٠٠
- ١٦ تحرك جسيم في خط مستقيم بسرعة ابتدائية ٧ م/ث وبالعجلة منتظمة مقدارها ٤ م/ث<sup>٢</sup> في عكس اتجاه حركته فإن مقدار الإزاحة بعد مرور ٦ ثوان = ..... متر.
- (أ) ٣٠- (ب) ١٥ (ج) ٤٥ (د) ٣٠
- ١٧ إذا تحرك جسيم في خط مستقيم بعجلة منتظمة فإن  $ع + ع =$  .....
- (أ)  $\frac{2}{v}$  (ب)  $\frac{f}{v}$  (ج)  $\frac{f}{2v}$  (د)  $2fv$
- ١٨ إذا تحرك جسيم في خط مستقيم من السكون بحركة منتظمة التغير بعجلة (ح) فإن الإزاحة الحادثة (ف)  $\propto$  .....
- (أ)  $v$  (ب)  $ع$  (ج)  $v^2$  (د)  $ح$
- ١٩ يتحرك جسيم في خط مستقيم بعجلة ٤٠ سم/ث<sup>٢</sup> في اتجاه سرعته الابتدائية فإذا كانت إزاحة الجسيم ٣٥ متراً في نفس اتجاه بداية الحركة بعد ١٠ ثوانٍ فإن مقدار السرعة الابتدائية = ..... م/ث.
- (أ) ١,٥ (ب) ١٥٠ (ج) ٢,٥ (د) ٢



٢٠ يتحرك جسيم في خط مستقيم بعجلة منتظمة  $٤٠$  سم/ث<sup>٢</sup> وبسرعة ابتدائية  $٣٦$  كم/س في نفس اتجاه متجه عجلته. بعد كم ثانية يصبح على بُعد  $٤٣,٢$  متر من نقطة الابتداء ؟

- (١)  $٢,٧$  (ب)  $٣,٨$  (ج)  $٤$  (د)  $٣,٥$

٢١ يتحرك جسيم من السكون في خط مستقيم بعجلة منتظمة فقطع  $٢٤$  متراً في الثواني الأربع الأولى من حركته ، فإن مقدار عجلته = ..... م/ث<sup>٢</sup>

- (١)  $٣$  (ب)  $٦$  (ج)  $١٢$  (د)  $\frac{٣}{٤}$

٢٢ قذفت كرة أفقياً في عكس اتجاه الرياح بسرعة ابتدائية  $١٥$  سم/ث فتحررت بتقصير منتظم  $٥$  سم/ث<sup>٢</sup> فإن الزمن الذي تستغرقه الكرة حتى تعود إلى نقطة البداية = ..... ثوان.

- (١)  $٢$  (ب)  $٣$  (ج)  $٤$  (د)  $٦$

٢٣ بدأ جسيم حركته من السكون في خط مستقيم بعجلة منتظمة  $٣$  سم/ث<sup>٢</sup> فقطع مسافة  $٢٤$  سم فإن سرعته في نهاية تلك المسافة = ..... سم/ث.

- (١)  $١٤٤$  (ب)  $١٢$  (ج)  $٢٤$  (د)  $٧٢$

٢٤ بدأ جسم حركته بسرعة  $١٢٦$  كم/ساعة وتوقف بعد أن قطع مسافة  $١٢٢,٥$  متر فإن عجلة الحركة للجسم = ..... م/ث<sup>٢</sup>.

- (١)  $٥-$  (ب)  $٥$  (ج)  $\frac{٣٢٤}{٥}$  (د)  $\frac{٣٢٤-}{٥}$

٢٥ سيارة تتحرك في خط مستقيم وعندما كانت سرعتها  $٧٢$  كم/س استخدمت الفرامل فتحررت حركة تقصيرية منتظمة التغير وأصبحت سرعتها  $٥٤$  كم/س بعد مسافة قدرها  $١٤٠$  متراً فإن عجلة الحركة = ..... م/ث<sup>٢</sup>.

- (١)  $\frac{١}{٢}-$  (ب)  $\frac{٣}{٤}-$  (ج)  $\frac{٥-}{٨}$  (د)  $١,٤-$

٢٦ انطلقت سيارة من السكون بتسارع مقداره  $٤$  م/ث<sup>٢</sup> فإن المسافة التي تقطعها السيارة عندما تصبح سرعتها  $٢٤$  م/ث هي ..... متر.

- (١)  $٧٢$  (ب)  $٣٥$  (ج)  $٩٦$  (د)  $٨١$

٢٧ يتحرك جسيم في خط مستقيم بسرعة ابتدائية  $٥٠$  سم/ث وبعجلة منتظمة  $٥$  سم/ث<sup>٢</sup> في اتجاه سرعته فإن المسافة التي يكون قد قطعها عندما تبلغ سرعته  $١$  م/ث هي ..... متر.

- (١)  $٧,٥$  (ب)  $٧٥٠$  (ج)  $١٠٠$  (د)  $٥٠$

٢٨ يتحرك قطار في خط مستقيم بسرعة  $٤٥$  كم/س وعندما اقترب من المحطة ضغط السائق على الفرامل فتحرك القطار بتقصير منتظم مقداره  $\frac{١}{٤}$  متر/ث<sup>٢</sup> حتى وقف في المحطة فإن المسافة التي قطعها القطار من لحظة استخدام الفرامل وحتى وقف = ..... متر.

- (١)  $٧٨,٢٥$  (ب)  $٦٢,٥$  (ج)  $٩٢$  (د)  $\sqrt{١٠٧٩}$

٢٩) تسير سيارة سباق فى الحلبة بسرعة ٤٤ م/ث فى لحظة ما ثم تناقصت سرعتها بمعدل ثابت ، حتى أصبحت ٢٢ م/ث خلال ١١ ثانية فإن المسافة التى قطعها السيارة خلال هذا الزمن = ..... متر.

(أ) ٢٢٨ (ب) ٤١٥ (ج) ٣٦٣ (د) ٢٤٨

٣٠) السرعة المتوسطة لجسيم يتحرك بسرعة ابتدائية ع. وعجلة منتظمة ح خلال الثانية السادسة من حركته = .....

(أ) ع + ٥ ح

(ب) ع + ٦ ح

(ج) ع + ٥ ح

(د) ع + ٣ ح

٣١) السرعة المتوسطة لجسيم يتحرك بسرعة ابتدائية ع. وعجلة منتظمة ح خلال الثوانى السابعة والثامنة والتاسعة = .....

(أ) ع + ٧ ح

(ب) ع + ٨ ح

(ج) ع + ٨ ح

(د) ع + ٩ ح

٣٢) بدأ جسم حركته فى اتجاه ثابت بسرعة ١٥ سم/ث وعجلة منتظمة ٤ سم/ث<sup>٢</sup> فى نفس اتجاه سرعته الابتدائية فإن المسافة التى يكون الجسم قد قطعها فى الثانية السادسة فقط = ..... سم

(أ) ٣٢ (ب) ٣٥ (ج) ٣٩ (د) ٣٧

٣٣) بدأ جسم حركته فى خط مستقيم بسرعة ابتدائية ٥ م/ث وبجعة منتظمة ٢ م/ث<sup>٢</sup> فى نفس اتجاه السرعة الابتدائية فإن المسافة المقطوعة فى الثوانى السادسة والسابعة والثامنة فقط تساوى ..... متر.

(أ) ١٨ (ب) ٥٤ (ج) ٣٦ (د) ٥٧

٣٤) بدأ جسم حركته فى اتجاه ثابت بسرعة ١٠ سم/ث وعجلة منتظمة ٥ سم/ث<sup>٢</sup> فى نفس اتجاه سرعته فإن المسافة التى يكون الجسم قد قطعها فى الثانيتين السابعة والثامنة فقط = ..... متر.

(أ) ٥٤ (ب) ٤٥ (ج) ٦٠ (د) ٩٠

٣٥) استخدم قائد سيارة الفرامل فتوقف خلال ١٥ ثانية بعد أن قطع مسافة ٣٠ متر فإن سرعة السيارة عند بداية استخدام الفرامل = ..... م/ث.

(أ) ١٥ (ب) ٨ (ج) ٤ (د) ٦

٣٦) بدأ جسيم حركته فى اتجاه ثابت بسرعة ٢٠ سم/ث وبجعة منتظمة ٢ سم/ث<sup>٢</sup> تعمل فى عكس اتجاه متجه السرعة الابتدائية فإن الزمن الذى يمضى من بدء الحركة حتى تصبح سرعته ٣,٦ كم/س فى عكس الاتجاه الذى بدأ الحركة فيه = ..... دقيقة.

(أ) ٦٠ (ب) ٣٥ (ج) ١ (د) ٦

٣٧) تحرك جسيم في خط مستقيم بعجلة منتظمة قدرها  $\frac{1}{3}$  م/ث<sup>٢</sup> فبلغت سرعته  $\frac{1}{3}$  كم/س في نفس اتجاه عجلته وذلك بعد مرور ١٢ ثانية من بدء الحركة فإن سرعته الابتدائية = ..... م/ث

- (١) ٢,٧٥ (ب) ٣ (ج) ٢,٢٥ (د) ١,٦

٣٨) جسيم متحرك في خط مستقيم بلغت سرعته ١٠٠ سم/ث بعد ٥ ثوانٍ من بدء حركته ، وبلغت ٧٢ سم/ث في نفس الاتجاه بعد ١٢ ثانية من بدء الحركة فإن سرعته الابتدائية = ..... سم/ث

- (١) ٤- (ب) ٨٦ (ج) ١٢٠ (د) ١٧٢

٣٩) يتحرك جسم في خط مستقيم بعجلة منتظمة فقطع ٥٢ متراً في الثوان الأربعة الأولى ثم قطع مسافة ٩٢ متراً في الثوان الأربعة التالية لها فإن عجلة الحركة = ..... م/ث<sup>٢</sup>

- (١) ٢,٥- (ب) ٣ (ج) ٣,٥ (د) ٢,٥

٤٠) أطلقت رصاصة بسرعة ٥٠ م/ث على هدف ثابت فسكنت فيه بعد أن غاصت مسافة ٢٥ سم فإن السرعة التي تنفذ بها الرصاصة في نفس الهدف إذا كان سمكه ١٦ سم على فرض ثبوت العجلة في الحالتين تساوى ..... م/ث

- (١) ٣٠ (ب) ٣٥ (ج) ٢٥ (د) ٤٠

٤١) تتحرك سيارة من السكون بعجلة منتظمة من نقطة ٢ فمرت على رادار عند نقطة ٣ فكانت سرعتها ٦٠ كم/س ثم على رادار آخر عند نقطة ٤ فكانت سرعتها ١٢٠ كم/س فإذا كان :  $٣ = ٦$  كم فإن :  $٢ =$  ..... كم

- (١) ٦ (ب) ٨ (ج) ٣ (د) ٢

٤٢) إذا تحرك جسيم بسرعة ابتدائية (ع) وكانت سرعته النهائية هي (ع) وكان :  $٢ = \frac{ع}{ع} + \frac{ع}{ع}$  فإن : .....

- (١)  $٠ < ح$  (ب)  $٠ > ح$  (ج)  $٠ = ح$  (د)  $١ > ح \geq ٢$

٤٣) يتحرك جسم بسرعة ابتدائية (ع) (سم/ث) وبالعجلة منتظمة (ح) (سم/ث<sup>٢</sup>) وسرعة نهائية (ع) (سم/ث) وكان  $ع - ع = ١٠$  سم/ث ،  $\sqrt{٢ ح ف} = ٢٠$  سم/ث فإن :  $\frac{ع}{ع} =$  .....

- (١)  $\frac{١٧}{٩}$  (ب)  $\frac{٥}{٤}$  (ج)  $\frac{٩}{٧}$  (د)  $\frac{٩}{٥}$

٤٤) يتحرك راكب دراجة بعجلة ثابتة  $\frac{1}{3}$  متر/ث<sup>٢</sup> في طريق مستقيم طوله ١٠٠ متر فإذا كانت سرعته في نهاية الطريق أكبر من بدايته بـ ٢ م/ث فإن مقدار سرعته في نهاية الطريق = ..... م/ث

- (١) ١١,٥ (ب) ١٢,٥ (ج) ١٣ (د) ١٣,٥

٤٥) تحرك جسيم بسرعة ابتدائية ما في اتجاه ثابت وبعجلة منتظمة ، فإذا قطع في الثانية الثالثة من

حركته مسافة ٢٠ مترًا ، ثم قطع في الثانية الخامسة والسادسة معًا مسافة ٦٠ مترًا

فإن العجلة التي تحرك بها الجسيم = ..... م/ث<sup>٢</sup>

(١) ٤ (ب) ١٠ (ج) ٣ (د) ٥

٤٦) بدأ جسيم الحركة بسرعة ابتدائية ع. سم/ث وبعجلة ح. سم/ث<sup>٢</sup> في نفس اتجاه سرعته الابتدائية

حتى وصلت سرعته النهائية (١٠٠ - ع.) سم/ث بعد أن قطع مسافة ١٠ أمتار

فإن الزمن اللازم لذلك = ..... ثانية.

(١) ١٠ (ب) ٢٠ (ج) ١٥ (د) ٣٠

٤٧) جسم يتحرك في خط مستقيم بعجلة ثابتة فتتحرك ١٠ متر في الثانية الأولى و ١٥ متر في الثانية الثانية فإن

المسافة المقطوعة خلال الثانية الثالثة = ..... متر.

(١) ٢٠ (ب) ٢٥ (ج) ٣٠ (د) ٤٥

٤٨) سيارة تبدأ حركتها من السكون عند ٩ وتتحرك في خط مستقيم بعجلة ثابتة لمدة ٢٠ ثانية حتى تصل

إلى النقطة (ب) فإذا كانت سرعة السيارة عند النقطة ب هي ٣٠ م/ث فإن سرعة السيارة عند النقطة

ح = ..... م/ث حيث أن ح تقع بين ٩ ، ب وكانت ٩ ح = ٤٠ متر.

(١) ١٠ (ب) ١١ (ج) ١٣ (د) ١٥

٤٩) متسابق يتحرك بعجلة منتظمة يمر بثلاث نقط ٩ ، ب ، ح على استقامة واحدة حيث ٩ ب = ح = ٢٠ متر

فإذا كانت سرعة المتسابق عند ٩ تساوي ٨ م/ث وسرعته عند ب تساوي ١٢ م/ث

فإن سرعته عند ح هي ..... م/ث

(١) ١٦ (ب) ٢٠ (ج)  $\sqrt{14}$  (د)  $\sqrt{14}$

٥٠) جسمان يتحركان على نفس الخط الأفقي كل منهما في اتجاه الآخر إذا تحرك الجسم الأول من نقطة

٩ بسرعة ابتدائية ٨ م/ث وعجلة  $\frac{3}{4}$  م/ث<sup>٢</sup> وتحرك الجسم الثاني من نقطة ب بسرعة ابتدائية ٤ م/ث

وعجلة  $\frac{5}{4}$  م/ث<sup>٢</sup> إذا كان ٩ ب = ٦٤ متر فإن الجسمان يتصادمان بعد ..... ثانية.

(١) ٢ (ب) ٤ (ج) ٦ (د) ٨

٥١) تتحرك سيارة ٩ بسرعة منتظمة مقدارها ١٥ م/ث وفي نفس اللحظة ومن نفس النقطة تحركت سيارة

أخرى ب من السكون بعجلة مقدارها ٣ م/ث<sup>٢</sup> في نفس اتجاه حركة السيارة ٩

فإن السيارتان تتقابلان بعد ..... ثانية.

(١) ٥ (ب)  $\sqrt{3}$  (ج) ١٥ (د) ١٠

٥٢) طلب من أحد المهندسين تصميم ممر إقلاع لأحد المطارات فإذا كان أقل تسارع للطائرات التي ستستخدم هذا الممر هو ٢ م/ث<sup>٢</sup> وسرعة إقلاع الطائرات هو ٦٥ م/ث فإن أقصر طول لممر الإقلاع = ..... متر.

- (أ)  $\frac{1}{4}$  ٧٥٤ (ب)  $\frac{5}{6}$  ٨١٠ (ج)  $\frac{1}{4}$  ٤٠٦ (د)  $\frac{1}{4}$  ٧٥٤

٥٣) قذفت كرة أفقياً في عكس اتجاه الرياح بسرعة ابتدائية ع = ١٥ سم/ث فتحركت بتقصير منتظم ٥ سم/ث<sup>٢</sup> فإن المسافة الكلية التي تقطعها الكرة خلال ٥ ثواني هي .....

- (أ) ٢٢,٥ (ب) ١٠ (ج) ٣٢,٥ (د) ٤٠

٥٤) يتحرك أتوبيس لنقل الركاب في طريق مستقيم بين محطتين المسافة بينهما ١ كم فإذا بدأ الحركة من المحطة الأولى من السكون بعجلة منتظمة مقدارها ١,٥ م/ث<sup>٢</sup> إلى أن وصلت سرعته إلى ١٥ م/ث ثم سار بهذه السرعة المنتظمة التي اكتسبها مسافة ما ثم استخدم الفرامل ليتحرك بتقصير منتظم مقداره ١ م/ث<sup>٢</sup> إلى أن توقف في المحطة التالية فإن المسافة المقطوعة بالسرعة المنتظمة = ..... متر

- (أ) ٧١١,٥ (ب) ٧١٣,٥ (ج) ١٨٧,٥ (د) ٨١٢,٥

٥٥) إذا تغيرت سرعة سيارة (أ) تتحرك في خط مستقيم من ٢٤ كم/س إلى ٣٦ كم/س خلال ٥ ثوان ، وتغيرت سرعة سيارة (ب) تتحرك في نفس الخط المستقيم في نفس الاتجاه من ١٢ كم/س إلى ٣٠ كم/س خلال نفس المدة فإن .....

(أ) السيارتان أ ، ب تتحركان بنفس مقدار التسارع.

(ب) السيارتان يصبح لهما نفس السرعة بعد مرور ٥ ثوان أخرى.

(ج) السيارة أ تتحرك بتسارع أكبر من السيارة ب

(د) سرعة السيارة ب تصبح ضعف سرعة السيارة أ بعد مرور ٧ ثوان من بدء الرصد.


٥٦) تتحرك سيارة بسرعة منتظمة ٧٢ كم/س فشاهد قائدها إشارة مرور تبعد عنه ٥٠ متر وقد تحولت إلى اللون الأحمر فإذا كان الزمن اللازم لاتخاذ قرار الضغط على الفرامل ٠,٥ ثانية وعند الضغط على الفرامل تحركت السيارة بتقصير منتظم مقداره ٤ م/ث<sup>٢</sup> فإن .....

(أ) السيارة تتوقف بالكاد عند إشارة المرور.

(ب) السيارة تتوقف قبل الإشارة بمسافة ٢ متر.

(ج) السيارة تتوقف بعد الإشارة بمسافة ١٠ أمتار.

(د) السيارة تتوقف بعد الإشارة بمسافة ٥ أمتار.



٥٧ في الشكل المقابل :

العجلة (ح) = ..... م/ث<sup>٢</sup>

٢ (أ)

٢- (ب)

٣- (ج)

١- (د)

٥٨ تتساقط قطرات الزيت من إحدى السيارات

المتحركة من اليسار إلى اليمين كما بالشكل المقابل

بملاحظة قطرات الزيت فإن السيارة تتحرك .....


(أ) بسرعة منتظمة.

(ب) بعجلة.


(ج) بتقصير

(د) بتقصير ثم سرعة منتظمة.


٥٩ أي من منحنيات (السرعة . الزمن) الآتية يمثل حركة جسم بحيث يكون ع . &lt; ٠ ، ح . &gt; ٠ ؟




(د)



(ج)



(ب)



(أ)

٦٠ في التمثيل البياني لمنحنى السرعة والزمن فإن الميل السالب يشير إلى .....

(أ) الجسم يتحرك للخلف.

(ب) الجسم يتحرك بتسارع.

(ج) الجسم يتحرك بتقصير.

(د) الجسم يتحرك بسرعة منتظمة.

٦١ جسم يتحرك في الاتجاه الموجب لمحور السينات بعجلة ٢ م/ث<sup>٢</sup> فإن ذلك يعني أن .....

(أ) الجسم يتحرك ٢ متر كل ثانية.

(ب) الجسم يتحرك بسرعة ٢ م/ث

(ج) سرعة الجسم تتناقص بمقدار ٢ م/ث كل ثانية.

(د) سرعة الجسم تزايد بمقدار ٢ م/ث كل ثانية.

٦٢ تتحرك سيارة بسرعة منتظمة ٢٥ م/ث عندما لاحظ قائد السيارة شجرة انكسرت وأصبحت تعوق الطريق أمامه على مسافة ٦٥ م فضغط على الفرامل لتسير السيارة بتقصير ٥ م/ث ليتفادى الاصطدام بالشجرة فإن السيارة .....

(أ) تتوقف قبل الاصطدام بالشجرة تمام.

(ب) تتوقف على مسافة ٢,٥ م من الشجرة.

(ج) تصطدم بالشجرة بسرعة ٣ م/ث.

(د) تصطدم بالشجرة بسرعة ٥ م/ث.

٦٣ إذا تحرك جسم في فترة زمنية (١ ص) بعجلة ثابتة (ح<sub>١</sub>) في خط مستقيم ثم تحرك الفترة الزمنية التالية (٢ ص) بعجلة ثابتة (ح<sub>٢</sub>) فإنه يمكن اعتبار الجسم تحرك الرحلة كلها بعجلة ثابتة (ح) حيث ح = .....

$$(أ) \frac{ح_١ + ح_٢}{٢}$$

$$(ب) \frac{ح_١ + ح_٢}{٢}$$

٦٤ إذا كانت المسافة من أ إلى ب تساوى ٥٠ متر وتحرك جسم من أ في اتجاه ب من السكون بعجلة ٢ م/ث<sup>٢</sup> وبعد قطع نصف المسافة توقفت العجلة ، فإن زمن الرحلة من أ إلى ب يساوى ..... ثانية.

(أ) ٢,٥ (ب) ٥ (ج) ٧,٥ (د) ١٠

٦٥ بدء جسم حركته من السكون وبالعجلة ثابتة (ح) فبلغت سرعته (ع) بعد ٧ ثانية فإن المسافة التي يقطعها الجسم في الثانية الأخيرة تساوى .....

(أ)  $ع + \frac{١}{٢} ح$  (ب)  $ع - \frac{١}{٢} ح$  (ج)  $٢ع - ٢ ح$  (د)  $\frac{٢ع}{٢ ح}$

٦٦ بدء جسم حركته من السكون متحركاً بعجلة ثابتة فإن النسبة بين المسافة التي يقطعها الجسم خلال الثانية الخامسة إلى المسافة التي يقطعها الجسم خلال الخمس ثوانى الأولى = .....

(أ)  $\frac{١}{٥}$  (ب)  $\frac{٩}{٢٥}$  (ج)  $\frac{٩}{١٦}$  (د)  $\frac{١٦}{٢٥}$

٦٧ جسيم يتحرك في خط مستقيم بعجلة ثابتة وبسرعة ابتدائية ١٠ م/ث وبعد مرور بعض الوقت أصبحت سرعته ٣٠ م/ث فإن سرعته عند منتصف مساره تساوى .....

(أ) ١٠ (ب)  $\sqrt[٣]{١٠}$  (ج)  $\sqrt[٥]{١٠}$  (د)  $\sqrt[١٠]{١٠}$

٦٨ تتحرك سيارة بسرعة ٤٠ كم/س وتتوقف خلال مسافة ٤٠ متر عند الضغط على المكابح فإذا تحركت تلك السيارة بسرعة ٨٠ كم/س فإن المسافة التي تتوقف فيها السيارة عند الضغط على المكابح

هى ..... متر علماً بأن التقصير الناتج من استخدام المكابح ثابت فى الحالتين.

(أ) ٥٠ (ب) ١٠٠ (ج) ١٢٠ (د) ١٦٠

٦٩ سيارة تقف على مسافة ٢٠٠ متر خلف حافلة متوقفة فإذا تحرك كل من السيارة والحافلة في نفس الوقت وفي نفس الاتجاه وكانت عجلة الحافلة ٢ م/ث<sup>٢</sup> وعجلة السيارة ٤ م/ث<sup>٢</sup> فإن السيارة تلحق بالحافلة بعد فترة زمنية = ..... ث

(أ) ١٥ (ب)  $\sqrt{2} \cdot 10$  (ج)  $3\sqrt{2} \cdot 10$  (د) ١٥

٧٠ إذا تحرك جسم في خط مستقيم من سكون بعجلة منتظمة لمدة  $t$  ثانية فأصبحت سرعته  $v$  م/ث فإن الإزاحة الحادثة في آخر ثانيتين هي .....

(أ)  $\frac{v(1-t)}{2}$  (ب)  $\frac{v(1+t)}{2}$

(ج)  $\frac{v^2(1-t)}{2}$  (د)  $\frac{v^2(1+t)}{2}$

٧١ الشكل المقابل يمثل العلاقة بين السرعة (م/ث) والزمن ( $t$  ثانية)

لجسم يتحرك في خط مستقيم لمدة ٥ ثوان فإن الإزاحة التي يقطعها الجسم خلال تلك الفترة الزمنية هي ..... متر.

(أ) ٢٥ (ب) ٥٠



(ج) ٧٥ (د) ١٠٠

٧٢ الشكل المقابل يمثل منحنى السرعة - الزمن لسيارة تتحرك

في خط مستقيم فإن المسافة المقطوعة خلال أول ١٥ ثانية تساوى ..... متر.

(أ) ١٠٠ (ب) ١٥٠

(ج) ١٧٥ (د) ٢٢٥



## ثانياً الأسئلة المقالية

١ بدأ جسم حركته في اتجاه ثابت بسرعة ٥٤ كم/س وتوقف بعد ٥ ثوان. أوجد :

١) عجلة حركة الجسم. ٢) المسافة المقطوعة خلال هذه الفترة.

« -٣ م/ث<sup>٢</sup> ، ٢٧,٥ متر »

٢ يتحرك راكب دراجة بعجلة منتظمة حتى صارت سرعته ٧,٥ م/ث خلال ٤,٥ ثانية فإذا كانت إزاحة الدراجة خلال فترة التسارع تساوى ١٩ متراً.

أوجد السرعة الابتدائية للدراجة.

«  $\frac{17}{18}$  م/ث »

٣ بدأ جسم حركته من السكون في خط مستقيم أفقى بعجلة منتظمة مقدارها ٤ سم/ث<sup>٢</sup> لمدة ٣٠ ثانية ، ثم تحرك بالسرعة التي اكتسبها لمدة ٤٠ ثانية أخرى في نفس الاتجاه. أوجد سرعته المتوسطة.

«  $94\frac{2}{3}$  سم/ث »



٤ نقصت سرعة سيارة بانتظام من ١٣٢ كم/س إلى ٢٤ كم/س بعد أن قطعت مسافة ١١٧٠ مترًا. أوجد الزمن الذي قطعت فيه السيارة هذه المسافة وما المسافة التي تقطعها بعد ذلك حتى تسكن. «٥٤ ثانية ، ٤٠ مترًا»

٥ هبط من السكون راكب دراجة من قمة تل منحدرًا بعجلة ثابتة مقدارها ٢ م/ث<sup>٢</sup> ، وعندما وصل إلى قاعدة التل بلغت سرعته ١٨ م/ث ثم سار بهذه السرعة لمدة دقيقة واحدة. أوجد المسافة الكلية التي قطعها راكب الدراجة. «١١٦١ متر»

٦ بدأ جسم حركته من السكون بعجلة منتظمة ٢٠ سم/ث<sup>٢</sup> وعندما أصبحت سرعته ٨ م/ث تحرك بتقصير منتظم ٢٥ سم/ث<sup>٢</sup> حتى سكن. أوجد الزمن الكلي والمسافة المقطوعة. «٧٢ ثانية ، ٢٨٨ مترًا»

٧ يتدرب كريم على ركوب الدراجة ، يدفعه والده فيكتسب تسارعًا ثابتًا مقداره  $\frac{1}{4}$  م/ث<sup>٢</sup> لمدة ٦ ثوان ، وبعد ذلك يقود كريم الدراجة بمفرده بالسرعة التي اكتسبها لمدة ٦ ثوان أخرى قبل أن يسقط أرضًا. أوجد مقدار المسافة التي يقطعها كريم. «٢٧ متر»

٨ قائد سيارة يتحرك بسرعة ثابتة مقدارها ٢٤ م/ث ، شاهد فجأة طفلًا يمر في الشارع ، فإذا كان الزمن اللازم لاستجابة الفرامل هو  $\frac{1}{4}$  ثانية ثم تحركت السيارة بتقصير منتظم مقداره ٩,٦ م/ث<sup>٢</sup> حتى وقفت. أوجد المسافة الكلية التي تحركتها السيارة قبل أن تقف مباشرة. «٤٢ متر»


٩ بدأ جسيم حركته بسرعة ٦٠ سم/ث في خط مستقيم من نقطة ثابتة (٩) وبتقصير منتظم ٧,٥ سم/ث<sup>٢</sup>. أوجد متى يكون الجسيم على بُعد ١٠٥ سم من النقطة (٩) في نفس الجهة التي بدأ الجسيم حركته ناحيتها ومتى يكون الجسيم على بُعد ٣٠٠ سم من النقطة (٩) في الجهة الأخرى منها. «٢ ، ١٤ ثانية ، ٢٠ ثانية»

١٠ تحركت كرة صغيرة بسرعة ١٥٠ سم/ث على مستوى أفقى في خط مستقيم بتقصير منتظم مقداره ١٥ سم/ث<sup>٢</sup>. أوجد الزمن الذي يمضى من لحظة تحرك الكرة حتى تصبح على بعد ٧٢٠ سم من نقطة بداية الحركة. «٨ ، ١٢ ، ٢٤ ثانية»

١١ قذفت كرة صغيرة أفقيًا في عكس اتجاه الرياح بسرعة ابتدائية ٧٢ سم/ث وتحركت في خط مستقيم بعجلة ٧ سم/ث<sup>٢</sup> وفي اتجاه مضاد لاتجاه السرعة الابتدائية. أوجد متى تقف هذه الكرة لحظيًا ثم أوجد مقدار إزاحة الكرة بعد ٨ ، ١٨ ، ٢٤ ثانية من بدء الحركة. ماذا تلاحظ ؟ « $١٠\frac{2}{7}$  ثانية ، ٢٥٢ سم ، ١٦٢ سم ، -٢٨٨ سم»

١٢ قذفت كرة أفقيًا في عكس اتجاه الرياح بسرعة ٤٥ سم/ث فتحركت في خط مستقيم حركة تقصيرية بعجلة ثابتة = ٦ سم/ث<sup>٢</sup>. أوجد :

- ١ متى تعود الكرة إلى النقطة التي قذفت منها.
  - ٢ متى تكون الكرة على بُعد ١٦٢ سم من نقطة القذف.
- «١٥ ثانية ، ٦ ، ٩ ، ١٨ ثانية»

١٣  قذف جسيم في عكس اتجاه الرياح بسرعة ٤٠ سم/ث ، فتحرك في خط مستقيم حركة تقصيرية بعجلة منتظمة مقدارها ٨ سم/ث<sup>٢</sup>. أوجد سرعة الجسيم عندما يكون على بعد :

١) ٨٤ سم من نقطة القذف في اتجاه القذف.

٢) ٩٦ سم من نقطة القذف وفي الجهة الأخرى بالنسبة لجهة القذف ، وفسر معنى الأجوبة التي تحصل عليها.  
« ١٦ سم/ث في اتجاه القذف ، ١٦ سم/ث في عكس اتجاه القذف ، ٥٦ سم/ث في عكس اتجاه القذف.»

١٤ يتحرك جسم في خط مستقيم بعجلة منتظمة على مستوى أفقى أملس فقطع ٢٦ متراً خلال الثانية الرابعة من بدء الحركة ، ٥٦ متراً خلال الثانية التاسعة. أوجد سرعته الابتدائية ومقدار عجلته. « ٥ م/ث ، ٦ م/ث<sup>٢</sup>»


١٥ يتحرك جسيم بعجلة منتظمة في اتجاه ثابت. فإذا قطع ٢٠ متراً خلال الثانية الثالثة من بدء حركته ، ١٥٠ متراً في الثواني الثامنة والتاسعة والعاشر. احسب العجلة التي يتحرك بها الجسيم والسرعة عند بدء حركته.  
« ٥ م/ث<sup>٢</sup> ، ٧٠ م/ث»

١٦ تحركت نقطة مادية في خط مستقيم ابتداء من السكون بعجلة منتظمة فقطعت خلال الثواني الخامسة والسادسة والسابعة مسافة قدرها ١٣٢ سم. أوجد كلاً من العجلة والمسافة التي تقطعها من بدء الحركة حتى تبلغ سرعتها ٦٦ سم/ث.  
« ٨ سم/ث<sup>٢</sup> ، ٢٧٢ م»

١٧ يتحرك جسيم بعجلة منتظمة فقطع في الثواني الأربعة الأولى من حركته مسافة ٢٠٠ متر ثم قطع ٥٠ متراً في الثانية السابعة والثامنة. أوجد سرعته الابتدائية والمسافة التي يقطعها منذ بدء حركته حتى يتوقف لحظياً. « ٦٠ م/ث ، ٣٦٠ م»

١٨ بدأ جسم حركته بسرعة ٧ م/ث وبالعجلة منتظمة ٢ م/ث<sup>٢</sup> فقطع مسافة ٣٠ متراً ثم انقطعت العجلة وسار بسرعة منتظمة مسافة ٥٢ متراً. أوجد :  
١) الزمن الكلى للحركة.  
٢) المسافة المقطوعة في الثانية الثالثة.  
« ٧ ثوان ، ١٢ م»

١٩ بدأ جسم حركته من سكون في خط مستقيم بعجلة منتظمة ٠,٣٦ كم/س/ث. وعندما أصبح سرعته ٨ م/ث تحرك بتقصير منتظم حتى سكن بعد ١١٢ ثانية من بداية الحركة. احسب التقصير المنتظم والمسافة الكلية.  
« ١/٤ متر/ث<sup>٢</sup> ، ٤٤٨ متر»

٢٠  تحرك جسم من سكون فقطع ١٥٠ م حتى أصبحت سرعته ٥٤ كم/س فإذا انقطعت العجلة عندئذ وسار بالسرعة التي اكتسبها مسافة ٢٠٠ متر ، ثم تحرك بعد ذلك بتقصير منتظم قدرة ٣/٤ م/ث<sup>٢</sup> حتى سكن. احسب السرعة المتوسطة خلال الرحلة كلها.  
« ١٠,٥ م/ث»

٢١ تحركت سيارة من السكون في خط مستقيم بعجلة منتظمة ٣ متر/ث<sup>٢</sup> وفي اللحظة التي بلغت فيها سرعتها ١١٨,٨ كم/س شاهد سائقها طفلاً يعبر الشارع فضغط على الفرامل فوقفت بعد أن قطعت مسافة ٢٤,٧٥ متراً. أوجد المسافة الكلية التي تحركتها السيارة والزمن الكلي لحركتها. «٢٠٦,٢٥ متراً ، ١٢,٥ ثانية»

٢٢ تحرك جسيم من السكون في اتجاه ثابت بعجلة منتظمة وعند نهاية ٤٠٠ متر كانت سرعته ١٠ متر/ث فسار بهذه السرعة مسافة ٨٠٠ متر ثم تحرك حركة تقصيرية بعجلة منتظمة مسافة ٢٠٠ متر حتى سكن لحظياً. أوجد الزمن الذي استغرقه في قطع المسافة كلها وسرعته المتوسطة خلال قطعها. «٢٠٠ ثانية ، ٧ متر/ث»

٢٣ أطلقت رصاصة بسرعة ٢٠٠ م/ث في اتجاه عمودي على حائط رأسى سمكه ١٤ سم ، فخرجت منه بسرعة ١٥٠ م/ث. أوجد مقدار العجلة ، وإذا أطلقت الرصاصة بنفس السرعة على حائط رأسى آخر له نفس المقاومة ، فأوجد المسافة التي تغوصها حتى تسكن ، علماً بأن العجلة التي تتحرك بها الرصاصة واحدة في الحالتين. «٦٢٥٠٠ م/ث<sup>٢</sup> ، ٢٢ سم»

٢٤ تحرك جسم في خط مستقيم فقطع ٥٢ سم في ٤ ثوان بعجلة منتظمة ، ثم أوقفت العجلة لمدة ٣ ثوان قطع خلالها الجسم مسافة ٤٨ سم ، ثم تحرك الجسم بعد ذلك بتقصير منتظم يساوي ضعف عجلته الأولى حتى وقف تماماً.

أوجد السرعة الابتدائية للجسم ثم احسب المسافة الكلية التي قطعها الجسم. «١٠ سم/ث ، ١٤٢ ٢/٣ سم»

٢٥ تحرك جسيم في خط مستقيم من السكون فقطع مسافة ١٢٥ متراً بعجلة منتظمة ١٠ متر/ث<sup>٢</sup> ثم انقطعت العجلة فسار بالسرعة التي اكتسبها مسافة أخرى قدرها ٤٠٠ متر ، ثم تحرك حركة تقصيرية بعجلة منتظمة ٥ متر/ث<sup>٢</sup> حتى سكن. أوجد الزمن الذي قطع فيه المسافة كلها. «٢٣ ثانية»

٢٦ يتحرك جسيم في خط مستقيم بعجلة منتظمة ٢ متر/ث<sup>٢</sup> في اتجاه حركته وبعد أن قطع مسافة ١٥٠ متراً انقطعت العجلة وسار بالسرعة التي اكتسبها في نهاية هذه المسافة لمدة ٢٠ ثانية ، فإذا كانت المسافة الكلية التي قطعها الجسيم هي ١١٥٠ متراً. فأوجد سرعته التي بدأ بها حركته. «٤٠ متر/ث»

٢٧ بدأت سيارة الحركة من سكون بعجلة منتظمة ١٨٠ كم/س لكل دقيقة وبعد ٢٤ ثانية أوقفت العجلة فتناقصت السرعة بانتظام بفعل الاحتكاك ومقاومة الهواء بمعدل ٤٥٠ متر/س/ث وبعد ٣٢ ثانية استخدمت فرامل السيارة فأوقفتها في مدة ٨ ثوانٍ. أوجد المسافة الكلية التي قطعتها السيارة. «٨٨٠ متراً»

٢٨ يتحرك جسم في خط مستقيم بسرعة منتظمة ٢٥ سم/ث ، وبعد ثانيتين من مروره بموضع معين تحرك جسم آخر من نفس الموضع وفي نفس الاتجاه بسرعة ابتدائية ١٥ سم/ث وبجعة منتظمة ٨ سم/ث<sup>٢</sup>. متى يتلاقى الجسمان ؟ «٥ ثوانٍ من بدء تحرك الجسم الثاني»

٢٩ تتحرك كرة صغيرة في خط مستقيم بسرعة منتظمة ١٢ سم/ث وبعد ٤ ثوان من مرورها بنقطة معينة تحركت كرة أخرى من هذه النقطة في نفس اتجاه حركة الكرة الأولى وبسرعة ابتدائية ٤ سم/ث وبعجلة منتظمة ٢ سم/ث<sup>٢</sup>. أوجد متى وأين تتصادم الكرتان وكم كانت سرعة الكرة الثانية قبل الاصطدام مباشرة.

«١٢ ثانية من بدء تحرك الكرة الثانية ، ١٩٢ سم ، ٢٨ سم/ث»

٣٠ مصعد ساكن بقاع منجم ، أخذ المصعد في الارتفاع بعجلة مقدارها ١٢٠ سم/ث<sup>٢</sup> مسافة ٥٤٠ سم ثم بسرعة منتظمة مسافة ٣٦٠ سم ثم بتقصير منتظم مسافة ٧٢٠ سم حتى سكن عند فوهة المنجم. احسب الزمن الذي استغرقه المصعد في الصعود من قاع المنجم إلى فوهته.

«٨ ثوان»

٣١ قطار يسير في خط مستقيم بين محطتين المسافة بينهما ٥٢٨٠ متراً فيبدأ من السكون من إحدى المحطتين ويسير بعجلة منتظمة ٢,٢ متر/ث<sup>٢</sup> إلى أن تبلغ سرعته ٤٤ متر/ث فيسير بهذه السرعة فترة من الزمن ثم يسير بعجلة منتظمة في عكس اتجاه الحركة قدرها ١,١ متر/ث<sup>٢</sup> إلى أن يقف في المحطة الأخرى. أوجد الزمن الذي يستغرقه في السير بين المحطتين.

«٢,٥ دقيقة»

٣٢ يتحرك ترام بين محطتين المسافة بينهما ٧٠٠ متر فيبدأ من السكون من المحطة الأولى بعجلة ١/٣ متر/ث<sup>٢</sup> لمدة عشر ثوان ، ثم يسير بعد ذلك بسرعة منتظمة فترة من الزمن ، ثم يقطع أخيراً مسافة ٦٠ متراً تكون حركته خلالها تقصيرية حتى يتوقف في المحطة الثانية. أوجد الزمن الذي استغرقه في قطع المسافة بين المحطتين.

«٥٥ ٢/٣ ث»

٣٣ يسير قطار في خط مستقيم بين محطتين مبتدئاً من السكون بعجلة منتظمة (ح) م/ث<sup>٢</sup> لمدة دقيقة واحدة وبعدها يسير بالسرعة التي اكتسبها بانتظام لمدة دقيقتين ثم يسير بعد ذلك بعجلة منتظمة (٢ ح) م/ث<sup>٢</sup> في عكس اتجاه الحركة حتى يسكن. أوجد النسبة بين المسافات الثلاثة التي يتحركها. وإذا كانت المسافة بين المحطتين ٩,٩ كم. فأوجد مقدار ح والسرعة المنتظمة التي تحرك بها. «٢ : ٨ : ١ : ١ متر/ث<sup>٢</sup> ، ٦٠ متر/ث»

٣٤ تحرك جسيم في خط مستقيم حركة متسارعة بعجلة منتظمة مقدارها (ح) سم/ث<sup>٢</sup> فقطع مسافة ٤٠٠ سم في ١٠ ثوان ثم زاد مقدار العجلة فأصبح (٢ ح) سم/ث<sup>٢</sup> فقطع الجسيم مسافة أخرى قدرها ٧٠٠ سم في ١٠ ثوان ، ثم تحرك الجسيم حركة تقصيرية بعجلة مقدارها (٣ ح) سم/ث<sup>٢</sup> حتى سكن.

احسب قيمة (ح) والمسافة الكلية التي تحركها الجسيم. «٢ سم/ث<sup>٢</sup> ، ١٧٧٥ سم»


٣٥ س ، ص نقطتان على طريق مستقيم أفقى بدأت سيارة ٩ الحركة من س نحو ص من السكون وبعجلة منتظمة ١٠ م/ث<sup>٢</sup> وفي نفس اللحظة كانت تتحرك سيارة أخرى ب من ص نحو س بسرعة منتظمة مقدارها ٥٤ كم/س ، فإذا كانت السرعة النسبية للسيارة ٩ بالنسبة للسيارة ب لحظة التقائهما تساوى ١٦٢ كم/س. أوجد الزمن الذي تأخذه كل من السيارتين من لحظة تحركهما معاً حتى لحظة التقائهما.

«٢ ثانية»

كرة صغيرة تم دفعها فى عكس اتجاه الرياح بسرعة أفقية مقدارها ٩ م/ث فتحررت فى خط مستقيم حركة تقصيرية بعجلة منتظمة مقدارها ١,٨ م/ث<sup>٢</sup>. أوجد :

- ١) إزاحة الكرة عندما تسكن لحظياً.
  - ٢) المسافة التى تقطعها الكرة من بدء الحركة حتى تعود للنقطة التى دُفعت منها.
  - ٣) إزاحة الكرة بعد زمن قدره ٨ ثوانٍ من بدء الحركة والمسافة التى تكون الكرة قد قطعتها عندئذ.
  - ٤) سرعة الكرة عندما تكون على بُعد ٤٠ متراً فى الجهة المضادة للجهة التى بدأت فيها الحركة.
- « ٢٢,٥ متراً ، ٤٥ متراً ، ١٤,٤ متراً ، ٣٠,٦ متراً ، ١٥ م/ث فى الاتجاه المضاد »

الشكل المقابل يمثل منحنى (السرعة - الزمن)



لجسم بدأ التحرك بسرعة ابتدائية مقدارها ١٠ م/ث وحتى تسكن بعد زمن قدره ١١٠ ثانية. أوجد :

- ١) عجلة التسارع.
- ٢) مقدار التقصير المنتظم للجسم حتى يسكن.
- ٣) المسافة الكلية التى تحركها الجسم.

« ٢ م/ث<sup>٢</sup> ، ٣,٥ م/ث<sup>٢</sup> ، ٦١٠٠ متر »

### ثالثاً مسائل تقيس مستويات علمنا من التفكير

١ اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

- ١) أى مما يأتى يكون مستحيل الحدوث لجسم يتحرك فى خط مستقيم ؟
  - (أ) له سرعة فى اتجاه الشرق وعجلة فى اتجاه الغرب.
  - (ب) له سرعة فى اتجاه الشرق وعجلة فى اتجاه الشرق.
  - (ج) له عجلة ثابتة غير صفرية وسرعة متغيرة.
  - (د) له سرعة ثابتة غير صفرية وعجلة متغيرة.
- ٢) يتحرك جسم من السكون بعجلة منتظمة لمدة ٢٠ ثانية فإذا قطع مسافة (ف<sub>١</sub>) فى العشر ثوانى الأولى وقطع مسافة (ف<sub>٢</sub>) فى العشر ثوانى التالية فإن .....

$$(أ) \quad f_2 = f_1 \quad (ب) \quad f_2 = 2f_1 \quad (ج) \quad f_2 = 3f_1 \quad (د) \quad f_2 = 4f_1$$

٢) بدأ قطار حركته من السكون من إحدى المحطات بعجلة  $1 \text{ م/ث}^2$  وفي نفس اللحظة يتحرك رجل بسرعة منتظمة  $10 \text{ م/ث}$  خلف القطار وعلى بُعد  $50 \text{ متر}$  من آخر باب في القطار في نفس اتجاه حركة القطار فإن الزمن اللازم للرجل حتى يلحق بالقطار = ..... ثانية.

- (أ) 5 (ب) 10 (ج) 15 (د) 20

٤) قطار متحرك بعجلة منتظمة فإذا عبرت مقدمة القطار نقطة ثابتة بسرعة  $(1ع)$  وعبرت مؤخرة القطار نفس النقطة الثابتة بسرعة  $(2ع)$  فإن نقطة منتصف القطار تعبر نفس النقطة الثابتة بسرعة .....

- (أ)  $\frac{1ع + 2ع}{2}$  (ب)  $\frac{2ع + 1ع}{2}$  (ج)  $\sqrt{1ع + 2ع}$  (د)  $\sqrt{\frac{1ع + 2ع}{2}}$


٥) بدأ جسم حركته بسرعة ابتدائية  $7 \text{ سم/ث}$  في خط مستقيم بعجلة منتظمة  $4 \text{ سم/ث}^2$  فقطع مسافة  $30 \text{ سم}$  ثم انقطعت العجلة وسار بسرعة منتظمة مسافة  $24 \text{ سم}$  فإن المسافة المقطوعة في الثانية الثالثة فقط هي ..... سم.

- (أ) 16,5 (ب) 17 (ج) 17,5 (د) 18

٦) إذا فقد جسم نصف سرعته في غوص مسافة  $3 \text{ سم}$  في حاجز خشبي سمكه  $10 \text{ سم}$  فإن المسافة التي يقطعها الجسم بعد ذلك حتى يسكن = ..... سم.

- (أ) 1 (ب) 2 (ج) 3 (د) 4

٧) إذا كانت حركة شاحنة وسيارة يبدآن من نفس المكان وفي خط مستقيم وكان الشكل المقابل يمثل منحني «السرعة - الزمن» فإن أي مما يأتي صحيح بالنسبة للمسافة المقطوعة حتى اللحظة  $(1ص)$  ؟



(أ) لهما نفس المسافة المقطوعة.

(ب) الشاحنة لا تتحرك.

(ج) السيارة تتحرك مسافة أكثر من الشاحنة.

(د) الشاحنة تتحرك مسافة أكثر من السيارة.

٨) الشكل المقابل يمثل منحني «الموضع - الزمن» لجسمين ١، ٢، أي مما يأتي يكون صحيح ؟

(أ) كل من ١، ٢ يتحرك بسرعة منتظمة متساوية.

(ب) ١ يتحرك بتسارع بينما ٢ يتحرك بتباطؤ.


(ج) كل من ١، ٢ يتحرك بسرعة منتظمة وسرعة ١ أكبر من سرعة ٢

(د) كل من ١، ٢ يتحرك بسرعة منتظمة وسرعة ٢ أكبر من سرعة ١



- ٩) يتحرك الجسمان ٢ ، ٣ فى الاتجاه الموجب لمحور السينات بحيث كان الجسم ٢ خلف الجسم ٣ بمسافة ٤٠ متر فإذا تحرك الجسم (٢) بسرعة ابتدائية ١٢ م/ث وبعجلة ٤ م/ث<sup>٢</sup> بينما بدء الجسم (٣) التحرك بسرعة ابتدائية ٤ م/ث وبعجلة ١٢ م/ث<sup>٢</sup> فإن أقل مسافة بين الجسمين = ..... متر.

(١) ٣٠ (ب) ٣٢ (ج) ٣٦ (د) ٤٠



- ١٠) الشكل المقابل يمثل منحنى السرعة - الزمن لسيارة تتحرك فى خط مستقيم من السكون إذا كان  $١ : ٢ : ٣ = ح : ب : ا$  فإن


السرعة المتوسطة للسيارة خلال الرحلة = ..... كم/س

(١) ٣٠ (ب) ٣٢ (ج) ٤٠ (د) ٤٠


- ١١) إذا فقدت رصاصة  $\frac{1}{3}$  سرعتها عندما تنفذ من لوح خشبى فما هو أقل عدد من الألواح الخشبية يكفى لإيقاف الرصاصة؟ علمًا بأن الرصاصة تتحرك بنفس التقصير فى كل الألواح الخشبية.

(١) ٥ (ب) ٦ (ج) ٧ (د) ٨


- ١٢) سيارتان تتحركان فى اتجاه واحد من نقطة بداية واحدة وفى نفس اللحظة انطلقت السيارة الأولى بسرعة ٤ م/ث بعجلة منتظمة (ح) ٢ م/ث<sup>٢</sup> وانطلقت السيارة الأخرى بسرعة ٦ م/ث بنفس العجلة (ح) ٢ م/ث<sup>٢</sup> أولاً : أى من الأشكال التالية يوضح المسافة بينهما بعد زمن  $t$  ثانية من بداية الحركة؟



- ثانياً : أى من الأشكال التالية يبين القياس الجبرى للمتجه  $\vec{v}$  بعد زمن  $t$  ثانية؟



٢ تتحرك سيارة بسرعة منتظمة ٥٤ كم/س ، مرت على سيارة شرطة ساكنة فبدأت سيارة الشرطة في متابعتها بعد ٣٠ ثانية من مرورها متحركة بعجلة منتظمة مسافة ٢٠٠ متر ، حتى بلغت سرعتها ٧٢ كم/س ثم سارت بهذه السرعة حتى لحقت بالسيارة الأولى. أوجد الزمن الذي استغرقتة عملية المطاردة من لحظة تحرك سيارة الشرطة والمسافة التي قطعتها سيارة الشرطة.



« ٤٠ ثانية »

٣ الشكل المقابل يمثل منحنى (السرعة - الزمن)

لحركة سيارتين س ، ص بدأتا الحركة من نفس

الموضع معاً وفي نفس الاتجاه أوجد :

الزمن الذي تتقابل فيه السيارتان.

(فسر إجابتك).





### الدرس 3

## الحركة الرأسية تحت تأثير الجاذبية الأرضية (السقوط الحر)

كان المعتقد قديماً أن الأجسام الثقيلة تصل إلى سطح الأرض في حالة سقوطها من نقطة ترتفع عن سطح الأرض في زمن أقل من الذي تستغرقه الأجسام الخفيفة إذا سقطت من نفس الارتفاع ، إلى أن أثبت أحد العلماء أن جميع الأجسام ثقيلها وخفيفها تسقط نحو الأرض بنفس العجلة المنتظمة وذلك بالتجربة العملية بأن وضع جنيهاً من الذهب مع ريشة صغيرة بداخل أنبوبة أسطوانية من الزجاج مفرغة من الهواء ثم قلب الأنبوبة فوصل الجنيه والريشة إلى قاع الأنبوبة في نفس اللحظة وهذا يؤكد أن جميع الأجسام بصرف النظر عن وزنها تتحرك عند سقوطها نحو الأرض سقوطاً حراً بنفس العجلة المنتظمة.

وقد أمكن حساب عجلة الأجسام الساقطة ولاحظ أنها ثابتة المعيار عند نفس المكان ويختلف معيارها قليلاً باختلاف خط العرض فيقل عند خط الاستواء ويزداد قليلاً كلما اتجهنا نحو أحد القطبين وكذلك ينقص معيارها كلما ارتفعنا عن سطح الأرض.

وقد سميت هذه العجلة المنتظمة بعجلة التثاقل أو عجلة الجاذبية الأرضية أو عجلة السقوط الحر وهي تعمل دائماً نحو مركز الأرض ويرمز لها بالرمز «  $g$  »

وسوف نعتبر معيار  $g$  أي  $980 \text{ سم/ث}^2$  أو  $9.8 \text{ متر/ث}^2$ . ما لم يذكر خلاف ذلك.


### قوانين الحركة الرأسية للأجسام

لما كانت الأجسام المتحركة رأسياً حركة حرة تكون حركتها بعجلة منتظمة معيارها ( $g$ ) فهي إذن تخضع لنفس قوانين الحركة المستقيمة ذات العجلة المنتظمة مع استخدام الرمز ( $g$ ) الدال على عجلة الجاذبية الأرضية بدلاً من الرمز ( $h$ ) وبذلك تأخذ القوانين السابقة الصور الآتية :

$$v = g \cdot t + v_0 \quad , \quad v^2 = 2g \cdot h + v_0^2 \quad , \quad h = \frac{1}{2} g t^2 + v_0 t$$

مع ملاحظة أن  $g$  ،  $v$  ،  $h$  ،  $t$  هي القياسات الجبرية للمتجهات  $\vec{g}$  ،  $\vec{v}$  ،  $\vec{h}$  ،  $\vec{t}$  مما يتطلب مراعاة إشارة كل منها عند استخدام العلاقات السابقة كما يلي :

## أولا إذا كان الجسم ساقطاً أو مقذوفاً إلى أسفل



نعتبر الاتجاه الموجب هو الاتجاه الرأسى إلى أسفل فتكون كل من ع ، ع ، s ، ف موجبة وعلى ذلك فإن :

١ كلاً من ع ، ف تزداد بازدياد الزمن  $t$  مقيساً من لحظة السقوط أو القذف إلى

أسفل كما أن ع تزداد كلما زادت ف المقيسة من مكان السقوط أو القذف إلى أسفل.

٢ الإزاحة ف فى أى فترة زمنية = المسافة المقطوعة خلال هذه الفترة.

٣ إذا سقط جسم (أى يبدأ حركته من السكون) فإن : ع . = ٠

## مثال ١

سقط جسم من ارتفاع ٤٤,١ متراً نحو سطح الأرض. فما هى سرعة الجسم بعد ثانية واحدة من لحظة سقوطه؟ ومتى يصل إلى سطح الأرض؟ وما هى سرعته عندئذٍ؟

## الحل

نعتبر الاتجاه الموجب هو الاتجاه الرأسى إلى أسفل

∴ ع . = ٠ ، s = ٩,٨ م/ث<sup>٢</sup> ، ف = ٤٤,١ متراً

$$∴ ع = ع + s \cdot t$$

$$∴ ع = ٠ + ٩,٨ \times ١$$

∴ ع (سرعة الجسم بعد ١ ثانية) = ٩,٨ متر/ث

$$∴ ف = s \cdot \frac{t^2}{2} + v_0 \cdot t$$

$$∴ ٤٤,١ = ٩,٨ \times \frac{1^2}{2} + ٠$$

$$∴ ٩ = \frac{٤٤,١}{٩,٨} = ٢ \cdot t$$

∴ t = ٣ ثوانٍ وهو زمن الوصول لسطح الأرض

$$∴ ع = ع + s \cdot t$$

$$∴ ع = ٠ + ٩,٨ \times ٣ = ٢٩,٤ \text{ متر/ث}$$

∴ ع (سرعة الجسم عند وصوله للأرض) = ٢٩,٤ متر/ث


## مثال ٢

من قمة برج ارتفاعه ١١٢ متراً قذف جسم رأسياً إلى أسفل بسرعة ٨,٤ متر/ث. احسب :

١ المسافة التى يقطعها الجسم فى الثانية الثالثة من حركته.

٢ زمن وصول الجسم إلى سطح الأرض.

٣ السرعة التى يصل بها الجسم لسطح الأرض.



نعتبر الاتجاه الموجب هو الاتجاه الرأسى إلى أسفل

∴ ع = ٨,٤ متر/ث ، س = ٩,٨ متر/ث<sup>٢</sup> ، ف = ١١٢ متراً

١ ∴ السرعة المتوسطة للجسيم خلال الثانية الثالثة

= سرعة الجسيم بعد ٢,٥ ثانية من بدء الحركة

ع = ع + ص ∴ ع = ٨,٤ + ٩,٨ × ٢,٥ = ٣٢,٩ متر/ث

∴ ف (وهى المسافة المقطوعة فى الثانية الثالثة) = ع × م = ١ × ٣٢,٩ = ٣٢,٩ متراً

٢ ∴ ف = ع + ١/٢ ص<sup>٢</sup>

∴ ١١٢ = ٨,٤ + ١/٢ × ٩,٨ × ص<sup>٢</sup> ∴ ٤٩ = ٨٤ + ١/٢ ص<sup>٢</sup> ∴ ١١٢ = ١١٢ - ص + ١/٢ ص<sup>٢</sup>

∴ ١٦٠ = ١٢ - ص + ١/٢ ص<sup>٢</sup> ∴ (٤ - ص) (٤٠ + ص) = ٠

∴ ص = ٤ ثوانٍ وهى زمن وصول الجسيم لسطح الأرض.

٣ ∴ ع = ع + ص ∴ ع = ٨,٤ + ٩,٨ × ٤ = ٤٧,٦ متر/ث


∴ سرعة وصول الجسيم لسطح الأرض = ٤٧,٦ متر/ث

أ ، ∴ ع = ع + ٢ × ف ∴ ع = ٨,٤ + ٢ × ١١٢ = ٢٢٦٥,٧٦

∴ ع = √(٢٢٦٥,٧٦) = ٤٧,٦ متر/ث

### ثانياً إذا كان الجسيم مقدوماً إلى أعلى

ع = أقصى ارتفاع



١ فى هذه الحالة نعتبر الاتجاه الموجب هو الاتجاه الرأسى إلى أعلى فتكون :

ع. موجبة ، س سالبة.

٢ إذا قذف جسيم من الموضع (و) رأسياً إلى أعلى فإن سرعته تتناقص حتى

تصبح صفراً عند الموضع (ب) ويقال عندئذ أن الجسيم قد وصل إلى أقصى

ارتفاع له وهو (و) ، بعد ذلك يعود الجسيم هابطاً من السكون وتصبح عجلته

موجبة فتعمل على زيادة سرعته حتى يعود مرة أخرى إلى (و). وإذا لم يتوقف

عند (و) فإنه يستمر فى الهبوط رأسياً إلى أسفل كما هو مبين بالشكل الموضح.

٣ • سرعة الجسيم أثناء الصعود تكون موجبة وأثناء الهبوط تكون سالبة

فمثلاً : ع موجبة بينما ع ، ع سالبتين.

أما السرعة عند أقصى ارتفاع فإنها تساوى صفر فمثلاً ع = صفر

• الإزاحة (ف) تكون موجبة إذا كانت في الاتجاه الموجب أى أعلى نقطة القذف ، وسالبة إذا كانت أسفل نقطة القذف.

**فمثلاً :** عندما يصل الجسم إلى الموضع أ تكون الإزاحة = و أ موجبة.

وعندما يصل إلى ب (أقصى ارتفاع) تكون الإزاحة = و ب موجبة.

وعندما يصل إلى ح تكون الإزاحة = و ح موجبة.

وعندما يعود إلى نقطة القذف (و) تكون الإزاحة = صفراً

وعندما يهبط إلى نقطة ه أسفل نقطة القذف تكون الإزاحة = و ه سالبة

٤] حيث إن عجلة الجاذبية الأرضية للأجسام المقذوفة رأسياً إلى أعلى تكون سالبة فإن قوانين الحركة المستخدمة في حركة هذه الأجسام تأخذ الصورة :

$$ع = ع - و س ، ف = ع - و س - \frac{1}{2} و س^2 ، ع^2 = ع - و س - \frac{1}{2} و س^2$$

٥] الإزاحة في فترة زمنية ما ليس بالضرورة أن تكون مساوية للمسافة التي قطعها الجسم خلال هذه الفترة.

**فمثلاً :** الجسم عندما يصل إلى الموضع ح تكون الإزاحة ف = و ح

بينما المسافة المقطوعة = و ب + و ح

وعندما يعود الجسم إلى نقطة القذف تكون الإزاحة = صفراً

بينما المسافة المقطوعة = و ب + و ح = و ب

٦] لاحظ أنه عندما يقذف جسم رأسياً إلى أعلى فإنه يتحرك في الخط الرأسى المار بنقطة القذف ويعود أيضاً في نفس الخط الرأسى إلا أنه عند حل المسائل يستحسن أن نرسم خط الهبوط بجوار خط الصعود للإيضاح كما بالشكل السابق.

### إيجاد زمن ومسافة أقصى ارتفاع لجسم مقذوف رأسياً إلى أعلى

$$\therefore ع = ع - و س ، \therefore ع = ع \text{ عند أقصى ارتفاع}$$

$$\therefore ع = ع - و س \therefore ع = و س$$

$$\therefore و = \frac{ع}{س} = \frac{\text{مقدار سرعة القذف}}{\text{مقدار عجلة الجاذبية الأرضية}}$$

$$\therefore ع^2 = ع - و س - \frac{1}{2} و س^2 ، ع = ع \text{ عند أقصى ارتفاع}$$

$$\therefore ع^2 = ع - و س - \frac{1}{2} و س^2 \therefore ع^2 = و س$$

$$\therefore ف (\text{أقصى ارتفاع}) = \frac{ع^2}{2 و} = \frac{\text{مربع مقدار سرعة القذف}}{\text{ضعف مقدار عجلة الجاذبية الأرضية}}$$

إذا قذف جسم رأسياً إلى أعلى فإن :

- ١ زمن الصعود إلى أقصى ارتفاع = زمن الهبوط إلى نقطة القذف.
- ٢ القياس الجبري للسرعة التي يعود بها الجسم إلى نقطة القذف = - (سرعة القذف)

### البرهان

عندما يعود الجسم إلى نقطة القذف تكون الإزاحة  $f = 0$  صفراً

$$\begin{aligned} \therefore f = 0 &= v \cdot t - \frac{1}{2} g t^2 \\ \therefore 0 &= v \cdot t - \frac{1}{2} g t^2 \\ \therefore 0 &= v - \frac{1}{2} g t \end{aligned}$$

$\therefore$  الزمن الذي يستغرقه الجسم حتى يعود إلى نقطة القذف =  $\frac{v}{\frac{1}{2}g}$

ولكن زمن الصعود (أي زمن الوصول إلى أقصى ارتفاع) =  $\frac{v}{g}$

$\therefore$  زمن الهبوط (أي زمن العودة من أقصى ارتفاع إلى مكان القذف) =  $\frac{v}{g} + \frac{v}{g} = \frac{2v}{g}$

$\therefore$  زمن الصعود = زمن الهبوط

(المطلوب أولاً)

$$\therefore v = v - 2v \text{ و } f = 0 \quad \therefore v = 2v \quad \therefore v = \pm v$$

(المطلوب ثانياً)

الإشارة الموجبة لسرعة القذف والإشارة السالبة للسرعة التي يعود بها جسم لنقطة القذف.

### نشاط


إذا قذفت كرة رأسياً لأعلى بسرعة ابتدائية مقدارها  $19,6$  م/ث فإن  $h = 9,8 - 4,9 t^2$  (الحركة لأعلى)

$$h = 19,6 - 4,9 t^2 \text{ و } f = 19,6 - 4,9 t^2$$

ويستخدم أي برنامج لرسم العلاقات (مسافة - زمن) ، (سرعة - زمن) ، (عجلة - زمن) في الفترة  $t \in [0, 4]$  فإننا نحصل على الأشكال التالية :


منحنى (العجلة - الزمن)

(ج) العجلة




منحنى (السرعة - الزمن)

(د) السرعة



منحنى (المسافة - الزمن)

(هـ) الإزاحة



## مثال ٣

قذف جسيم رأسياً إلى أعلى بسرعة ٢٤,٥ متر/ث احسب أقصى ارتفاع يبلغه عن نقطة القذف والزمن الذي يستغرقه في الوصول إليه. احسب أيضاً الزمن الذي يستغرقه في العودة من نقطة أقصى ارتفاع إلى مكان القذف وماذا تكون سرعته عندئذٍ ؟

## الحل

نعتبر الاتجاه الموجب هو الرأسى إلى أعلى

$$\therefore v = v_0 - g \cdot t \quad \text{ف} \quad 0 = 24,5 - 9,8 \cdot t$$

$$\therefore \text{ف (أقصى ارتفاع)} = 30,625 \text{ متراً}$$

$$\text{(يمكن إيجاد أقصى ارتفاع مباشرة من العلاقة } v = \frac{v_0^2}{2g} = \frac{24,5^2}{2 \cdot 9,8} = 30,625 \text{ متراً)}$$

$$\therefore v = 0 \quad \text{ع} = 2,5 \text{ ث}$$

$$\therefore \text{ع (زمن الوصول إلى أقصى ارتفاع)} = \frac{24,5}{9,8} = 2,5 \text{ ثانية}$$

$$\text{(يمكن إيجاد زمن الوصول إلى أقصى ارتفاع مباشرة من العلاقة } t = \frac{v_0}{g} = \frac{24,5}{9,8} = 2,5 \text{ ثانية)}$$

$$\therefore \text{ع} = \text{ع} - 2,5 = 0 \text{ ث}$$

$$\therefore \text{ع} = 2,5 \text{ ثانية}$$

$$\therefore \text{ع} = \text{ع} = 2,5 \text{ ثانية}$$

$$\therefore \text{ع} = 24,5 \text{ متر/ث رأسياً إلى أسفل}$$

## مثال ٤

قذف جسيم رأسياً إلى أعلى بسرعة ١٩,٦ متر/ث. احسب سرعته عندما يكون على ارتفاع ١٤,٧ متراً فوق نقطة القذف.

## الحل

نعتبر الاتجاه الموجب هو الرأسى إلى أعلى

$$\therefore v = v_0 - g \cdot t \quad \text{ف} \quad 14,7 = 19,6 - 9,8 \cdot t$$

$$\therefore \text{ع} = 9,8 \pm \text{متر/ث}$$

والسرعة الموجبة هي سرعته عندما يكون على ارتفاع ١٤,٧ متراً من نقطة القذف وهو صاعد إلى أعلى.

والسرعة السالبة هي سرعته عندما يكون على نفس الارتفاع من نقطة القذف وهو هابط إلى أسفل بعد وصوله إلى أقصى ارتفاع.

## ملاحظة :

من المثال السابق نلاحظ أن مقدار سرعة الجسيم عند أي نقطة وهو صاعد تكون مساوية لمقدار سرعته عند مروره بنفس النقطة وهو هابط مع اختلاف اتجاهي السرعتين.

مثال ٥

قذف جسم رأسياً إلى أعلى من نقطة على سطح الأرض فعاد إلى نقطة القذف بعد ٦ ثوانٍ من لحظة قذفه. احسب السرعة التي قذف بها وكذلك أقصى ارتفاع بلغه الجسم وكذلك سرعته بعد ٤,٥ ثانية من لحظة قذفه.

الحل

نعتبر الاتجاه الموجب هو الرأسى إلى أعلى

∴ الجسم عاد إلى موضع القذف بعد ٦ ثوانٍ من لحظة قذفه

$$\therefore \text{زمن الصعود} = \text{زمن الهبوط} = \frac{٦}{٢} = ٣ \text{ ثوانٍ}$$

$$\therefore \text{زمن الوصول إلى أقصى ارتفاع} = \frac{ع}{٩,٨} \quad \therefore \frac{ع}{٩,٨} = ٣$$

$$\therefore ع. (السرعة التي قذف بها الجسم) = ٣ \times ٩,٨ = ٢٩,٤ \text{ متر/ث}$$

$$\therefore \text{مسافة أقصى ارتفاع} = \frac{ع^2}{٢g} = \frac{٢٩,٤^2}{2 \times ٩,٨} = ٤٤,١ \text{ متراً}$$

$$\therefore ع = ع - v_s = ٤,٥ \times ٩,٨ - ٢٩,٤ = -١٤,٧ \text{ متر/ث}$$

∴ سرعة الجسم بعد ٤,٥ ثانية = ١٤,٧ متر/ث إلى أسفل

مثال ٦

قذف حجر صغير بسرعة ١٩,٦ م/ث رأسياً إلى أعلى من قمة برج ارتفاعه ١٥٦,٨ م عن سطح الأرض أوجد:

١ الزمن الذي يستغرقه الجسم من لحظة القذف حتى يصل إلى سطح الأرض.

٢ سرعة الجسم عند وصوله إلى سطح الأرض.

الحل

نعتبر الاتجاه الموجب هو الرأسى إلى أعلى عندما يصل الحجر إلى سطح الأرض فإن:

$$١٥٦,٨ - ع = ١٩,٦ - \frac{١}{٢} g t^2$$


$$\therefore ١٥٦,٨ - ١٩,٦ = \frac{١}{٢} \times ٩,٨ \times t^2$$

$$\therefore ١٣٧,٢ = ٤,٩ t^2 \quad \therefore t^2 = \frac{١٣٧,٢}{٤,٩} = ٢٨$$

$$\therefore t = \sqrt{٢٨} = ٥,٢٩ \text{ ثوانٍ}$$

$$\therefore ع = ع - v_s = ١٩,٦ - ٥,٢٩ \times ٩,٨ = ١٤,٧ \text{ م/ث}$$

$$\therefore ع (سرعة الوصول لسطح الأرض) = ١٤,٧ \text{ م/ث}$$



أي أن الحجر يصل إلى سطح الأرض بسرعة مقدارها ١٤,٧ م/ث لأسفل.

## مثال ٧

من مكان يعلو عن سطح الأرض قذف جسيم رأسياً إلى أعلى بسرعة ١٩,٦ متر/ث. عين موضع الجسيم :

١ بعد ٣ ثوانٍ من لحظة قذفه. ٢ بعد ٥ ثوانٍ من لحظة قذفه.

## الحل

نعتبر الاتجاه الموجب هو الرأسى إلى أعلى.

$$١ \quad \therefore \text{ف} = \text{ع} \cdot \text{ح} - \frac{١}{٢} \text{ح}^٢ \quad \therefore \text{ف} = ١٩,٦ \times ٣ - \frac{١}{٢} \times ٩ = ١٤,٧ \text{ متراً}$$

،  $\therefore$  ف موجبة

$\therefore$  الجسيم بعد ٣ ثوانٍ يكون أعلى نقطة القذف بمقدار ١٤,٧ متراً.

$$٢ \quad \therefore \text{ف} = \text{ع} \cdot \text{ح} - \frac{١}{٢} \text{ح}^٢ \quad \therefore \text{ف} = ١٩,٦ \times ٥ - \frac{١}{٢} \times ٢٥ = ٢٤,٥ \text{ متراً}$$

،  $\therefore$  ف سالبة

$\therefore$  الجسيم بعد ٥ ثوانٍ يكون أسفل نقطة القذف بمقدار ٢٤,٥ متراً.

## مثال ٨

سقط حجر من السكون من ارتفاع ١٠ أمتار فوق كومة من الرمل فخاص فيها مسافة ١٩٦ سم أوجد العجلة التي تحرك بها داخل الرمل.

## الحل

• قبل الغوص في الرمل :

$$\text{ع} = ٠ ، \text{ف} = ١٠ \text{ أمتار} ، \text{ح} = ٩,٨ \text{ م/ث} ، \therefore \text{ع}^٢ = ٢ \cdot \text{ع} + ٢ \cdot \text{ف}$$

$$\therefore \text{ع}^٢ = \text{صفر} = ١٠ \times ٩,٨ \times ٢ + ٢ \cdot \text{ع}$$

$$\therefore \text{ع} = ١٤ \text{ م/ث}$$

• بعد الغوص في الرمل :

$$\text{ع} = ١٤ \text{ م/ث} ، \text{ع} = ٠ ، \text{ف} = ١,٩٦ \text{ متر}$$

$$\therefore \text{ع}^٢ = ٢ \cdot \text{ع} + ٢ \cdot \text{ف}$$

$$\therefore \text{صفر} = ٢(١٤) + ٢ \times ١,٩٦$$

$$\therefore \text{ح} = - \frac{٢(١٤)}{١,٩٦ \times ٢} = - ٥٠ \text{ م/ث}^٢$$

## مثال ٩

قذفت كرة صغيرة رأسياً إلى أعلى من نافذة أحد المنازل وشوهدت الكرة وهي هابطة أمام النافذة بعد ٨ ثوانٍ من قذفها ثم وصلت إلى الأرض بعد ٩ ثوانٍ من لحظة القذف. أوجد ارتفاع هذه النافذة عن سطح الأرض بالأمتار.



**الحل**

∴ زمن أقصى ارتفاع  $\Delta = \frac{h}{v}$  =  $\Delta$  ثوانٍ

$$v = \frac{g}{2} \Delta$$

$$\therefore \text{ع.} = 9.8 \times \Delta = 39.2 \text{ م/ث}$$

$$\therefore \text{ف.ع.} = v - \frac{1}{2} g \Delta = 39.2 - 9 \times \frac{1}{2} \Delta = 44.1 - 4.5 \Delta$$

أى أن النافذة تكون على ارتفاع 44,1 مترًا عن سطح الأرض.

**حل آخر:**

∴ زمن أقصى ارتفاع  $\Delta = \frac{h}{v}$  =  $\Delta$  ثوانٍ

$$v = g \Delta - 9.8$$

$$\therefore \text{ع.} = 39.2 \text{ م/ث}$$

$$\therefore 0 = 9.8 \Delta - 9.8$$

∴ سرعة الكرة لحظة مرورها بنقطة القذف =  $39.2 \text{ م/ث}$

∴ زمن العودة لنقطة القذف = زمن الوصول لأقصى ارتفاع

∴ زمن الوصول من مكان القذف عائداً لسطح الأرض = 1 ثانية

$$\therefore \text{ف.ع.} = v + \frac{1}{2} g \Delta = 39.2 + 9.8 \times \frac{1}{2} = 44.1 \text{ متر}$$

**أى أن ارتفاع النافذة عن سطح الأرض = 44,1 متر**

**مثال ١٠**

سقطت كرة رأسياً إلى أسفل من ارتفاع 2,5 مترًا نحو أرض أفقية فاصطدمت بالأرض ثم ارتدت رأسياً إلى أعلى بسرعة مقدارها يعادل  $\frac{4}{5}$  مقدار سرعتها قبل الاصطدام. أوجد أقصى ارتفاع بلغته الكرة بعد اصطدامها لأول مرة بالأرض.

**الحل**

• في حالة الهبوط :

$$\therefore v^2 = 2gh + 0$$


$$49 = 2 \times 9.8 \times 2.5 + 0$$

∴ ع (سرعة الكرة قبل الاصطدام بالأرض مباشرة) =  $7 \text{ م/ث}$

• في حالة الارتداد : نعتبر الاتجاه الموجب هو الرأسى إلى أعلى

$$\therefore \text{ع.} = 7 \times \frac{4}{5} = 5.6 \text{ م/ث}$$

$$\therefore \text{أقصى ارتفاع} = \frac{v^2}{2g} = \frac{(5.6)^2}{2 \times 9.8} = 1.6 \text{ مترًا}$$





اختبر نفسك

مستويات عليا

تطبيق

فهم

تذكر

أولاً أسئلة الاختيار من متعدد

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

١) إذا سقط جسم رأسياً لأسفل فإن .....

- (أ)  $v = 0$  (ب)  $v = 0$  (ج)  $v = 0$  (د)  $v = 0$

٢) إذا وصل جسم إلى أقصى ارتفاع فإن : .....

- (أ)  $v = 0$  (ب)  $v = 0$  (ج)  $v = 0$  (د)  $v = 0$

٣) إذا عاد الجسم إلى نقطة القذف فإن : .....

- (أ) مقدار  $v = 0$  (ب) مقدار  $v = 0$  (ج)  $v = 0$  (د)  $v = 0$

(أ)  $v = 0$  (ب)  $v = 0$  (ج)  $v = 0$  (د)  $v = 0$

٤) إذا قذف جسم رأسياً إلى أعلى بسرعة (ع) م/ث إلى أقصى ارتفاع (ف) متر فإن زمن الوصول لأقصى ارتفاع (ص) يساوي ..... ثانية.

- (أ)  $\frac{2v}{g}$  (ب)  $\frac{v}{g}$  (ج)  $\frac{2v}{g}$  (د)  $\frac{v}{g}$

٥) قذف جسم رأسياً لأعلى بسرعة ٩٨ م/ث فإن زمن وصوله لأقصى ارتفاع = ..... ثانية.

- (أ) ١٥ (ب) ١٠ (ج) ٣ (د) ٢٠

٦) قذف جسم رأسياً لأعلى بسرعة ٤٢ م/ث فإن أقصى ارتفاع يصل إليه الجسم يساوي ..... متر.

- (أ) ٦٥ (ب) ٩٨ (ج) ٨٤ (د) ٩٠

٧) قذف جسم رأسياً لأعلى من نقطة على سطح الأرض فكان أقصى ارتفاع يمكن أن يصل إليه الجسم هو ٤٤.١ متر فإن السرعة التي قذف بها الجسم = ..... م/ث.

- (أ) ٤٤.١ (ب) ٢٢.٠٥ (ج) ١٩.٦ (د) ٢٩.٤

٨) قذف جسم رأسياً لأعلى فقطع مسافة ٨٨.٢ م حتى عاد إلى نقطة القذف فإن الزمن اللازم لذلك = ..... ثانية.

- (أ) ٤ (ب) ٦ (ج) ٥.٥ (د) ٣

٩) قذف جسم رأسياً إلى أعلى بسرعة ٢٤.٥ م/ث فإنه يعود إلى نقطة القذف بعد ..... ثانية.

- (أ) ٢.٥ (ب) ٥ (ج) ١٠ (د) صفر

١٠) إذا قذف جسم رأسياً إلى أعلى من سطح الأرض فعاد إلى نقطة القذف بعد ١٢ ثانية فإن زمن الهبوط = ..... ثانية.

(أ) صفر (ب) ٣ (ج) ٦ (د) ١٢

١١) إذا قذف جسم رأسياً إلى أعلى من نقطة على سطح الأرض فعاد إليها بعد ١٠ ثوان فإن أقصى ارتفاع يصل إليه = ..... متر.

(أ) ١٢٢,٥ (ب) ٢٤٥ (ج) ٤٩ (د) ٤٩٠

١٢) أطلقت رصاصة لأعلى ثم عادت لنقطة البداية بعد ١٠ ثواني فإن السرعة الابتدائية للرصاصة = ..... م/ث.

(أ) ٩,٨ (ب) ٤٩ (ج) ٢٥ (د) ٩٨

١٣) قذف جسم لأعلى بسرعة ابتدائية ٧ م/ث

فإن المسافة المقطوعة حتى عودته لنقطة القذف = ..... متر.

(أ) صفر (ب) ٥ (ج) ٧,٥ (د) ١٠

١٤) إذا سقط جسم من ارتفاع ١٠ أمتار على أرض أفقية

فإن سرعته لحظة اصطدامه بالأرض بوحدة م/ث هي .....

(أ) صفر (ب) ٢٠ (ج) ١٤ (د) ١٩٦

١٥) من نقطة على ارتفاع ٧٨,٤ متراً عن سطح الأرض سقط جسم رأسياً إلى أسفل

فإن سرعة الجسم بعد مرور ٣ ثوان من سقوطه = ..... م/ث.

(أ)  $26 \frac{2}{15}$  (ب) ٤٤,١ (ج) ٢٩,٤ (د) ١٤,٧

١٦) قذف جسم رأسياً لأسفل بسرعة ١٥ م/ث من ارتفاع ١٠٠ متر

فإن سرعته بعد مرور ٢ ثوان = ..... م/ث.

(أ) ٤٦,٧ (ب) ٢٩,٤ (ج) ٤٤,٤ (د) ٣٢,٨

١٧) سقط جسم من حافة بئر فوصل إلى قاع البئر بعد ثنيتين فإن عمق البئر = ..... متر.

(أ) ٧٨,٤ (ب) ١٩,٦ (ج) ١١,٠٢٥ (د) ١٧,٢

١٨) سقطت كرة من قمة برج ارتفاعه ١٢٢,٥ متر فإن زمن وصولها لسطح الأرض = ..... ثوان.

(أ) ٤ (ب) ٧ (ج) ٦ (د) ٥

١٩) قذف جسم رأسياً لأسفل بسرعة ٢٠,٦ م/ث من قمة برج ارتفاعه ١٠٥,٩ متر

فإن السرعة التي يصل بها إلى سطح الأرض = ..... م/ث.

(أ) ٢٥ (ب) ٥٠ (ج) ٢٨ (د) ٢٩,٤

٢٠) قذف جسم رأسياً لأسفل بسرعة ٣٢ م/ث فوصل الأرض بعد ٤ ثوان  
فإن الارتفاع الذي سقط منه = ..... متر.

(أ) ٢٠٦,٤ (ب) ١٠٥,٧ (ج) ١٩٨,٢ (د) ٢١٧

٢١) سقط جسيم من قمة برج ارتفاعه ٣٢,٤ متراً فإن سرعته عندما يكون على ارتفاع ٩,٩ متر  
من سطح الأرض = ..... م/ث.

(أ) ١٩٤,٠٤ (ب)  $\frac{11\sqrt{21}}{5}$  (ج) ٢١ (د) ٤٤١

٢٢) قذف جسيم رأسياً لأسفل فقطع مسافة ١٥,٥ متر خلال الثانية الأولى من قذفه  
فإن السرعة التي قذف بها الجسيم لأسفل = ..... م/ث.

(أ) ١٥,٥ (ب) ١٠,٦ (ج) ٩,٨ (د) ١٧,٢

٢٣) سقط جسيم من ارتفاع ٢٤٠,١ متر فإن سرعة الجسيم عند لحظة منتصف الزمن اللازم لوصوله سطح  
الأرض = ..... م/ث.

(أ) ٣٤,٣ (ب) ٤٥ (ج) ٤٩ (د) ٣٢,٨

٢٤) إذا سقط جسيم من شرفة منزل فإن المسافة المقطوعة خلال الثانية الأولى من سقوطه = ..... متر.

(أ) ٩,٨ (ب) ٤,٩ (ج) ٢,٤٥ (د) ١,٢٥

٢٥) سقط جسيم من قمة برج فإن المسافة المقطوعة خلال الثانية الثالثة فقط من سقوطه = ..... متر.

(أ) ٩,٨ (ب) ١٩,٦ (ج) ٤٤,١ (د) ٢٤,٥

٢٦) قذف جسيم رأسياً لأعلى بسرعة ٤٩ متر/ث فإن المسافة المقطوعة خلال الثانية الرابعة فقط من لحظة  
قذفه = ..... متر.

(أ) ٩,٨ (ب) ١٤,٧ (ج) ١١٧,٦ (د) ٢٤,٥

٢٧) من قمة برج قذف جسم لأعلى بسرعة ابتدائية ٩,٨ م/ث فوصل إلى سطح الأرض بعد مرور ١٢ ثانية  
فإن ارتفاع البرج = ..... متر.

(أ) ٤٩٠ (ب) ٥٨٨ (ج) ٤٩٨ (د) ٥٣٤

٢٨) قذف حجر رأسياً لأعلى بسرعة ٢٨ م/ث من سطح الأرض فسقط بجانب سطح منزل بعد ٤ ثوان من  
لحظة القذف فإن ارتفاع المنزل = ..... متر.

(أ) ١١٢ (ب) ٩٨ (ج) ٣٣,٦ (د) ٣٨,٤

٢٩) قذف حجر رأسياً إلى أعلى بسرعة ١٩,٦ متر/ث من نقطة على سطح الأرض أسفل منزل ارتفاعه  
١٤,٧ متراً فإن الزمن الذي يستغرقه الحجر حتى يهبط عند سطح المنزل = ..... ثانية.

(أ) ٣ (ب) ٢,٥ (ج) ١ (د) ٢

٣٠) قذف جسم رأسياً لأعلى بسرعة ٢٤ م/ث من قمة مبنى ارتفاعه ٣٢,٤ متر  
فإن الزمن الذي يصل فيه إلى الأرض = ..... ثانية.

- (أ) ٤ (ب) ٨ (ج) ٥ (د) ٦

٣١) قذف جسم رأسياً لأسفل بسرعة ١٠,٣ م/ث من ارتفاع ١١٩,٦ متر فإن المسافة المقطوعة خلال  
الثانية الأخيرة قبل اصطدامه بالأرض = ..... متر.

- (أ) ٤٤,٦ (ب) ٤٩,٥ (ج) ٨٢ (د) ٧٢,٣٥٤

٣٢) من قمة برج قذف جسم رأسياً إلى أعلى وشاهد أمام نقطة القذف وهو هابط بعد ٤ ثوان من لحظة  
قذفه ووصل سطح الأرض بعد ٣ ثوان أخرى فإن أقصى ارتفاع وصل إليه  
الجسم فوق سطح الأرض = ..... متر.

- (أ) ١٠٢,٩ (ب) ١٢٢,٥ (ج) ١١٢,٧٥ (د) ١١١,٥

٣٣) سقطت كرة من ارتفاع ٩٠ متر عن سطح الأرض وعند وصولها للأرض ارتدت ثانية إلى أعلى بسرعة  
تساوى نصف سرعة وصولها إلى الأرض. فإن أقصى ارتفاع تصل إليه الكرة = ..... متر.

- (أ) ٤٥ (ب) ١٨ (ج) ٢٢,٥ (د) ١٩,٦

٣٤) تتحرك طائرة هليكوبتر رأسياً لأعلى بسرعة منتظمة ١٠ م/ث قفز منها رجل المظلات فإن سرعته  
الإبتدائية = .....

- (أ) صفر. (ب) ١٠ م/ث لأسفل.

- (ج) ١٠ م/ث لأعلى. (د) ٩,٨ م/ث لأسفل.

٣٥) يتحرك منطاد رأسياً لأعلى بسرعة ٢٤,٥ م/ث فسقط منه جسم فوصل سطح الأرض بعد ٨ ثوان فإن  
ارتفاع المنطاد عن سطح الأرض لحظة سقوط الجسم = ..... متر.

- (أ) ١١٧,٦ (ب) ١١٩,٨ (ج) ١٠٨,٧ (د) ٩٦,٨


٣٦) قذف جسم رأسياً لأسفل بسرعة ٢٠ م/ث من طائرة تتحرك لأعلى بسرعة ١٨٠ كم/س فإن السرعة  
الابتدائية للجسم هي .....

- (أ) ١٦٠ م/ث لأسفل. (ب) ٣٠ م/ث لأعلى.

- (ج) ٧٠ م/ث لأعلى. (د) ٣٠ م/ث لأسفل.

٣٧) سقطت كرة ملساء من يد رجل يقف داخل مصعد كهربائي يتحرك رأسياً لأسفل بسرعة منتظمة ٥٠ سم/ث  
فإن سرعة الكرة بعد  $\frac{1}{4}$  ثانية هي .....

- (أ) ٥٠ سم/ث (ب) ٢٥ سم/ث (ج) ٥٤,٩ سم/ث (د) ٥٠,٤ سم/ث



٣٨ إذا قذف جسم رأسياً لأعلى.

وكان الشكل المقابل يمثل بيانياً

العلاقة بين الإزاحة والزمن

فإن السرعة الابتدائية تكون ..... م/ث

(ب) ٩,٨

(أ) صفر

(د) ٩٨

(ج) ٤٩

٣٩ قذف جسم رأسياً لأعلى فإن المسافة التي يقطعها في كل ثانية .....

(ب) تتناقص بمقدار ٩,٨ متر.

(أ) تتناقص بمقدار ٤,٩ متر.

(د) تظل ثابتة.

(ج) تتزايد بمقدار ٩,٨ متر.

٤٠ إذا سقط جسم فإن المسافات التي يقطعها هذا الجسم خلال الثلاث ثواني الأولى هي على الترتيب .....

(ب) ٤,٩ متر ، ١٤,٧ متر ، ٢٤,٥ متر.

(أ) ٩,٨ متر ، ٩,٨ متر ، ٩,٨ متر.

(د) ٩,٨ متر ، ١٩,٦ متر ، ٢٩,٤ متر.

(ج) ٢٤,٥ متر ، ١٤,٧ متر ، ٤,٩ متر.

٤١ سقط جسم رأسياً لأسفل فإذا كانت  $t_1$  ،  $t_2$  ،  $t_3$  هي سرعات الجسم في نهاية الثوان الأولى والثانية والثالثة على الترتيب فإن  $t_1 : t_2 : t_3 =$  .....

(د) ١ : ٢ : ٣

(ج) ٤ : ٢ : ١

(ب) ٣ : ٢ : ١

(أ) ١ : ١ : ١

٤٢ قذف جسم رأسياً لأعلى فقطع في الثانية الأولى مسافة  $f_1$  وفي الثانية الثانية مسافة  $f_2$  وفي الثانية الثالثة مسافة  $f_3$  حتى وصل إلى أقصى ارتفاع بعد ٣ ثوان فإن .....

(ب)  $f_1 > f_2 > f_3$

(أ)  $f_1 = f_2 = f_3$

(د)  $f_2 = f_1 + f_3$

(ج)  $f_2 = f_1 + f_3$

٤٣ سقط جسم من قمة برج فقطع في الثانية الأخيرة من سقوطه مسافة ١٩,٦ متراً

فإن ارتفاع البرج = ..... متر.

(د)  $32 \frac{5}{8}$

(ج)  $30 \frac{5}{8}$

(ب)  $27 \frac{3}{4}$

(أ) ٣٥

٤٤ إذا قذف جسم رأسياً لأعلى فإن المسافة التي يقطعها الجسم في الثانية الأخيرة قبل أن يصل

لأقصى ارتفاع تكون .....

(ب) تعتمد على سرعة القذف (ع).

(أ) ثابتة.

(د) تعتمد على أقصى ارتفاع يصل إليه الجسم.

(ج) تعتمد على وزن الجسم.

٤٥) قذف جسمان رأسياً لأعلى بسرعتين  $v_1$  ،  $v_2$  الأول وصل لارتفاع  $f_1$  والثاني وصل لارتفاع  $f_2$  فإن :

$$(ب) \frac{v_1^2}{2g} = \frac{v_2^2}{2g}$$

$$(د) f_1 v_1 = f_2 v_2$$

.....

$$(أ) \frac{v_1}{g} = \frac{v_2}{g}$$

$$(ج) \frac{v_1}{g} = \frac{v_2}{g}$$

٤٦) قذف جسم رأسياً بسرعة ( $v$ ) ليصل لأقصى ارتفاع ( $f$ ) فإن السرعة التي يجب أن يقذف بها هذا الجسم ليصل لأقصى ارتفاع ( $3f$ ) هي .....

(أ)  $3v$  ع. (ب)  $v$  ع. (ج)  $\sqrt{3}v$  ع. (د)  $9v$  ع.

٤٧) قذفت كرة رأسياً لأعلى وأخذت  $3$  ثواني حتى تصل لأقصى ارتفاع فإن الزمن اللازم لكي تصل الكرة إلى  $2,2$  متر أعلى نقطة القذف = ..... ثانية.

(أ)  $2,4$  ع. (ب)  $4,8$  ع. (ج)  $4,2$  ع. (د)  $2,6$  ع.

٤٨) إذا سقط جسم من ارتفاع ( $f_1$ ) فوق سطح أرض رملية فغاص فيها مسافة ( $f_2$ ) فإن عجلة الحركة داخل الرمل تكون ..... عجلة الجاذبية الأرضية.

(أ)  $<$  (ب)  $\leq$  (ج)  $>$  (د)  $=$

٤٩) إذا سقط جسم من ارتفاع  $19,6$  متر على أرض رملية فغاص فيها  $14$  سم حتى سكن فإن عجلة حركة الجسم داخل الرمل = ..... م/ث<sup>2</sup>

(أ)  $-13772$  ع. (ب)  $-9,8$  ع. (ج)  $19,6$  ع. (د)  $1732$  ع.

٥٠) إذا كان حيوان الكانجرو يستطيع أن يقفز إلى ارتفاع  $2,5$  متر فإن السرعة التي يقفز بها الكانجرو ليصل لهذا الارتفاع = ..... م/ث

(أ)  $5,8$  ع. (ب)  $6,4$  ع. (ج)  $7$  ع. (د)  $7,2$  ع.

٥١) إذا كان أحد لاعبي كرة السلة يستطيع الوثب  $1,29$  متر فإن الزمن اللازم لهذا اللاعب حتى يقفز ويرجع إلى نقطة القفز = ..... ثانية.

(أ)  $0,5$  ع. (ب)  $1,02$  ع. (ج)  $1,35$  ع. (د)  $2,7$  ع.

٥٢) لتحديد ارتفاع كوبرى فوق نهر النيل يسقط شخص حجر ويقيس زمن وصول الحجر إلى الماء فإذا كان زمن وصول الحجر إلى الماء =  $2,5$  ثانية فإن ارتفاع الكوبرى = ..... متر.

(أ)  $42$  ع. (ب)  $33$  ع. (ج)  $31$  ع. (د)  $29$  ع.

٥٣) قذف جسم رأسياً لأعلى من نقطة على سطح الأرض فقطع مسافة  $16$  متر خلال  $2$  ثانية الأولى وهو ساعد فإن المسافة التي يقطعها خلال  $2$  ثانية الأخيرة وهو هابط تساوى ..... متر.

(أ)  $2$  ع. (ب)  $4$  ع. (ج)  $8$  ع. (د)  $16$  ع.

٥٤) قذفت كرة رأسياً لأعلى بسرعة ما ، ولو حظ أنها تمر بنقطة معينة مرتين بعد ٥ ثوان ، ١١ ثانية من بداية القذف فإن أقصى ارتفاع تصل إليه الكرة = ..... متر.

(١) ٧٨,٤ (ب) ٣١٣,٦ (ج) ٦٢٧,٢ (د) ١٢٥٤,٤

٥٥) قذف جسم رأسياً لأعلى بسرعة ابتدائية ٣٩,٢ م/ث من قمة مبنى ارتفاعه ٨٠ متر فإن الفترة الزمنية التي يكون عندها ارتفاع الجسم عن الأرض أكبر من ارتفاع المبنى هي .....

(أ) من  $t=٤$  ثانية إلى  $t=٨$  ثانية فقط.

(ب) من  $t=٠$  = صفر إلى  $t=٤$  ثانية فقط.

(ج) من  $t=٠$  = صفر إلى  $t=٨$  ثانية فقط.

(د) من  $t=٢$  إلى  $t=٨$  ثانية فقط.

## ثانياً الأسئلة المقالية

١) قذف جسم رأسياً إلى أسفل فقطع مسافة ٥٠ متراً في الثانية الثالثة من لحظة سقوطه وقطع مسافة ١٣٠ متراً في الثانية الرابعة والخامسة. احسب السرعة التي قذف بها وعجلة الجاذبية في هذا المكان.

« ٢٥ متر/ث ، ١٠ متر/ث<sup>٢</sup> »

٢) قذف جسم رأسياً إلى أسفل من قمة برج ارتفاعه ٢٤٠ متراً عن سطح الأرض فقطع مسافة ١٥٠,٥ متراً خلال الثانية الأولى من سقوطه. احسب الزمن الذي يستغرقه في الوصول إلى الأرض والسرعة التي يصل بها للأرض.

« ٦ ثوان ، ٦٩,٤ متر/ث »

٣) قذف جسم رأسياً إلى أعلى بسرعة ٣٩,٢ متر/ث أوجد :

١) الزمن الذي يستغرقه من لحظة قذفه حتى يعود إلى مكان القذف.

٢) الزمن الذي يمضي حتى يصبح الجسم على ارتفاع ٣٤,٣ متراً من نقطة القذف. فسّر معنى الجوابين.

« ٨ ثوان ، ١ ، ٧ ثوان »

٤) قذف جسم من قمة برج رأسياً إلى أعلى بسرعة مقدارها ٢٤,٥ م/ث فوصل إلى سطح الأرض بعد ٨ ثوانٍ أوجد :

١) ارتفاع البرج. ٢) أقصى ارتفاع يصل إليه الجسم عن سطح الأرض.

٢) المسافة التي يقطعها الجسم خلال هذه المدة. ١١٧,٦ متر ، ١٤٨,٢٢٥ متر ، ١٧٨,٨٥ متر



٥ من قمة برج ارتفاع ٩,٨ مترًا قذف جسم رأسياً لأعلى بسرعة ٤,٩ م/ث أوجد :

١ أقصى ارتفاع يصل إليه الجسم من نقطة القذف.

٢ الزمن الذي يستغرقه الجسم وهو هابط حتى تصبح سرعته ١١,٢ م/ث

٣ زمن وصول الجسم إلى نقطة القذف.

٤ زمن وصول الجسم إلى سطح الأرض.

٥ سرعة الجسم لحظة وصوله إلى سطح الأرض.

«١,٢٢٥ متر ،  $\frac{1}{v}$  ثانية ، ١ ثانية ، ٢ ثانية ، ١٤,٧ م/ث»

٦ قذف جسم رأسياً إلى أعلى من مكان يرتفع عن سطح الأرض بمقدار ١٤٠ مترًا فوجد أنه قطع في الثانية الثالثة وهو صاعداً مسافة ١٠,٥ مترًا. أوجد :

١ السرعة التي قذف بها الجسم.

٢ أقصى ارتفاع يصل إليه الجسم عن سطح الأرض.

٣ الزمن الذي يستغرقه للوصول إلى سطح الأرض.

«٣٥ متر/ث ، ٢٠٢,٥ مترًا ، ١٠ ثوانٍ»

٧ قذف جسم رأسياً إلى أعلى بسرعة ١٩,٦ متر/ث من نقطة تعلو سطح الأرض بمقدار ٢٣٠,٤ مترًا. أوجد :

١ أقصى ارتفاع عن سطح الأرض يصله الجسم.

٢ موضع الجسم بالنسبة لنقطة القذف بعد ٥ ثوانٍ من لحظة قذفه.

٣ أقصى سرعة يكتسبها الجسم.

«٢٥٠ مترًا ، ٢٤,٥ مترًا للأسفل ، ٧٠ متر/ث»

٨ قذف جسم رأسياً إلى أعلى بسرعة ١٤ م/ث من نقطة على ارتفاع ٣٥٠ مترًا من سطح الأرض. أوجد :

١ الزمن الذي يأخذه الجسم حتى يصل إلى سطح الأرض.

٢ المسافة الكلية التي قطعها الجسم حتى وصوله لسطح الأرض.

«١٠ ثوان ، ٣٧٠ متر»

٩ قذفت كرة رأسياً لأعلى من قمة برج رأسى بسرعة ٢٤,٥ م/ث. أوجد :

١ متى تصل الكرة إلى ارتفاع ٢٩,٤ متر فوق موضع قذفها.

٢ متى تصل الكرة إلى بُعد ٢٩,٤ متر تحت موضع قذفها.

«٢ ، ٣ ثانية ، ٦ ثانية»

١٠ قذف جسم رأسياً إلى أعلى بسرعة ٢٤,٥ متر/ث

عَيِّن موضع الجسم واتجاه حركته بعد  $t$  ثانية من لحظة قذفه إذا كانت  $v$  تساوى :

١ ٢ ثانية. ٢ ٤ ثوانٍ. ٣ ٥ ثوانٍ. ٤ ٦ ثوانٍ.

١١ من أعلى تل ارتفاعه ٩,٨ متراً قذف جسم رأسياً إلى أعلى بسرعة ٤,٩ م/ث أوجد :

- ١ سرعة الجسم عند لحظة وصوله إلى أسفل التل.
- ٢ الزمن الذي استغرقه للوصول إلى أسفل التل.

«١٤,٧ م/ث ، ٢ ثانية»

١٢ قذفت كرة رأسياً إلى أعلى من نافذة فوصلت إليها بعد ٤ ثوانٍ من لحظة القذف ووصلت إلى سطح

الأرض بعد ٥ ثوانٍ من لحظة القذف. أوجد :

- ١ سرعة قذف الكرة.
- ٢ أقصى ارتفاع وصلت إليه الكرة من نقطة القذف.
- ٣ ارتفاع النافذة من سطح الأرض.

«١٩,٦ م/ث ، ١٩,٦ متر ، ٢٤,٥ متر»

١٣ يتدرب طالب على ركل كرة القدم رأسياً إلى أعلى في الهواء ، ثم تعود الكرة أثر كل ركلة فتصطدم

بقدمه ، فإذا استغرقت الكرة من لحظة ركلها وحتى اصطدامها بقدمه ٠,٣ ثانية. أوجد :

- ١ السرعة الابتدائية.
- ٢ الارتفاع الذي وصلت إليه الكرة بعد أن ركلها الطالب.

«١,٤٧ م/ث ، ٠,١١٠٢٥ متر»

١٤ سقط جسم من ارتفاع ف عن سطح الأرض فقطع في الثانية الأخيرة من حركته ٣,٣ متراً. أوجد :

- ١ سرعة وصول الجسم إلى سطح الأرض.
- ٢ الارتفاع الذي سقط منه الجسم.

«٣٩,٢ م/ث ، ٧٨,٤ متر»

١٥ سقط جسم من ارتفاع ف متراً فقطع في الثانية الأخيرة  $\frac{9}{10}$  ف متراً. أوجد :

- ١ الارتفاع الذي سقط منه.
- ٢ سرعة الجسم لحظة الوصول لسطح الأرض.

«١٢٢,٥ متراً ، ٤٩ م/ث»

١٦ سقط جسم رأسياً إلى أسفل من ارتفاع ما نحو أرض رخوة فغاص فيها مسافة ١٤ سم قبل أن

يسكن فإذا كان الجسم يتحرك داخل الأرض بتقصير منتظم مقدار ٦٣ م/ث<sup>٢</sup>. فما هو الارتفاع الذي

سقط منه الجسم.

١٧ سقط جسم من ارتفاع ٢٢,٥ متراً على أرض رملية فغاص فيها مسافة ٢٥ سم. احسب كلاً من :

- ١ سرعة الجسم عند سطح الأرض.
- ٢ العجلة التي تحرك بها الجسم داخل الأرض الرملية.

«٢١ م/ث ، -٨٨٢ م/ث<sup>٢</sup>»

١٨ سقط جسم من ارتفاع ٦,٤ متراً عن سطح أرض رملية فغاص في الرمل مسافة ٣٢ سم. أوجد :

- ١ العجلة المنتظمة التي تحرك بها الجسم داخل الرمل.
- ٢ الزمن الذي استغرقه من لحظة سقوطه حتى سكن في الرمل.

«١٩٦ م/ث<sup>٢</sup> ، ١,٢ ثانية»

١٩ سقطت كرة من المطاط من ارتفاع ١٠ أمتار ، فاصطدمت بالأرض وارتدت رأسياً إلى أعلى مسافة  $2\frac{1}{3}$  متر. احسب سرعة الكرة قبل وبعد اصطدامها بالأرض مباشرة.  
«١٤ م/ث ، ٧ م/ث»

٢٠ سقطت كرة من ارتفاع ٩٠ متر عن سطح الأرض وعند وصولها للأرض ارتدت ثانية إلى أعلى بسرعة تساوي نصف سرعة وصولها إلى الأرض. أوجد أقصى ارتفاع تصل إليه الكرة.  
«٢٢,٥ متر»

٢١ من قمة برج يعلو ١٩٦ متراً عن سطح الأرض قذف جسيماً بسرعة واحدة ١٤,٧ م/ث أحدهما رأسياً إلى أسفل والآخر رأسياً إلى أعلى. فما هو الزمن الذي يستغرقه كل منهما في الوصول إلى سطح الأرض ؟  
«٥ ، ٨ ثوانٍ»

٢٢ سقط جسم من ارتفاع ٤٠ متراً عن سطح الأرض وفي نفس اللحظة ومن سطح الأرض قذف جسم آخر رأسياً لأعلى بسرعة ٢٠ م/ث فتقابل الجسمان بعد فترة زمنية  $t$ . أوجد :

١) الفترة الزمنية  $t$

٢) المسافة التي قطعها كل منهما.

«٢ ثانية ، ١٩,٦ متراً ، ٢٠,٤ متراً»

٢٣ سقط جسم من ارتفاع ٦٠ متراً من سطح الأرض ، وفي نفس اللحظة قذف جسم آخر رأسياً لأعلى من سطح الأرض بسرعة ٢٠ م/ث فتقابل الجسمان بعد فترة زمنية.

أوجد هذا الزمن ، ثم أوجد المسافة التي قطعها كل من الجسمين خلال هذه الفترة الزمنية ، ثم اذكر هل الجسمان لحظة التقابل متحركان في اتجاهين متضادين أم في نفس الاتجاه.

«٣ ثوانٍ ، ٤٤,١ متر ،  $\frac{449}{9}$  متر ، في نفس الاتجاه»

٢٤ جسم ساكن على ارتفاع ١٢٥,٦ متر من سطح الأرض مربوط بخيط يشد الجسم رأسياً إلى أعلى بعجلة  $2,٤٥$  م/ث<sup>٢</sup> وبعد ثانيتين من بدء الحركة قطع الخيط. أوجد :

١) سرعة الجسم قبل قطع الخيط مباشرة.

٢) أقصى ارتفاع يصل إليه الجسم عن سطح الأرض.

٣) سرعة الجسم عند وصوله سطح الأرض.

«٤,٩ م/ث ، ١٢,٢٥ متر ، ٤,٩ م/ث»

٢٥ قذف جسيم رأسياً إلى أعلى بسرعة ٤٠ متر/ث من نقطة على سطح الأرض وبعد ثانية قذف جسيم آخر من نفس النقطة وبنفس السرعة الابتدائية للجسيم الأول. بعد كم ثانية وعلى أي ارتفاع يتلاقى الجسيمن (اعتبر عجلة الجاذبية الأرضية  $g = ١٠$  متر/ث<sup>٢</sup>) ؟  
«٤,٥ ثانية ، ٧٨,٧٥ متر»

٢٦ منطاد يتحرك رأسياً بسرعة ١٤,٧ متر/ث سقط منه جسيم فوصل سطح الأرض بعد ٤ ثوانٍ من لحظة سقوطه. احسب ارتفاع المنطاد عن سطح الأرض لحظة سقوط الجسيم منه في كل من الحالتين الآتيتين :

١) المنطاد يتحرك رأسياً إلى أسفل.

٢) المنطاد يتحرك رأسياً إلى أعلى.

«١٣٧,٢ متراً ، ١٩,٦ متراً»

يرتفع منطاد رأسياً إلى أعلى بسرعة منتظمة مقدارها ٢٤,٥ م/ث وعندما وصل إلى ارتفاع ٢٤٥ متراً من سطح الأرض سقط منه جسيم أوجد :

- ١) أقصى ارتفاع يصل إليه هذا الجسيم بالنسبة لسطح الأرض.
- ٢) السرعة التي يصل بها الجسيم للأرض.
- ٣) الزمن الذي يستغرقه في الوصول للأرض.
- ٤) ارتفاع المنطاد عن سطح الأرض لحظة وصول الجسيم لسطح الأرض.

«  $\frac{5}{8}$  متراً ، ٢٧٥ م/ث ، ٧٣,٥ م/ث ، ١٠ ثوانٍ ، ٤٩٠ م/ث »

منطاد يصعد رأسياً إلى أعلى بسرعة منتظمة ٢٨ متر/ث قذف منه حجر رأسياً إلى أسفل بسرعة ١٢,٥ متر/ث فوصل إلى الأرض بعد ٥ ثوانٍ من لحظة قذفه. أوجد :


- ١) ارتفاع المنطاد عن سطح الأرض لحظة وصول الحجر لها.
- ٢) مقدار واتجاه سرعة الحجر بعد ٤ ثوانٍ من لحظة قذفه.

« ١٨٥ متراً ، ٢٣,٧ م/ث لأسفل »

### مسائل تقيس مستويات عليا من التفكير

١ اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

١) ولد يقف أعلى كوبرى يرمى حجر بيده لأسفل وباعتبار الاتجاه لأعلى هو الاتجاه الموجب فإن أى من الأشكال الآتية تمثل العلاقة بين العجلة والزمن ؟



٢) قذف جسم رأسياً لأعلى فإن عجلة الجسم عند أقصى ارتفاع تساوى .....

- (أ) صفر
- (ب) ٩,٨ م/ث<sup>٢</sup> لأسفل.
- (ج) ٩,٨ م/ث<sup>٢</sup> لأعلى.
- (د) تعتمد على سرعة القذف.

٣) جسمان كتليهما ١٠ كجم ، ٢٠ كجم وقعا من نفس الارتفاع وبإهمال مقاومة الهواء إذا كانت الكتلة ٢٠ كجم تأخذ زمن (v) حتى تصل إلى الأرض فإن الزمن الذي تأخذه الكتلة ١٠ كجم حتى تصل للأرض = .....

- (أ) v
- (ب) ٢v
- (ج)  $\frac{1}{2}v$
- (د)  $\frac{1}{4}v$

٤) في نفس اللحظة التي سقط فيها جسم من ارتفاع ٥٨,٨ متر عن سطح الأرض قذف جسم لأعلى بسرعة ابتدائية ١٩,٦ م/ث فإن الجسمان يتقابلان بعد ..... ثانية.

- (أ)  $\sqrt{2}$  (ب) ٢ (ج) ١,٥ (د)  $\sqrt{2}$

٥) تم قذف كرتان بنفس السرعة الابتدائية من أعلى منزل إحداهما لأعلى والأخرى لأسفل. قارن بين سرعتي الكرتان قبل الوصول للأرض مباشرة.

- (أ) الكرة التي قذفت لأعلى تتحرك أسرع لأن سرعتها الابتدائية لأعلى.  
 (ب) الكرة التي قذفت لأسفل تتحرك أسرع لأن سرعتها الابتدائية لأسفل.  
 (ج) لهما نفس السرعة.  
 (د) الكرة التي قذفت لأعلى تتحرك أسرع لأن عجلتها أكبر.

٦) سقط جسم (أ) من قمة مبنى ثم بعد ١ ثانية سقط جسم آخر (ب) من نفس المبنى بإهمال مقاومة الهواء فإن الفرق بين سرعتيهما مع تقدم الزمن .....

- (أ) يزداد. (ب) يقل.  
 (ج) يظل ثابت. (د) لا يمكن تحديدها.

٧) قذف جسم رأسياً لأعلى بسرعة ٢٤,٥ م/ث فإن المسافة المقطوعة في الثانية الثالثة = ..... متر.

- (أ) صفر (ب) ٤,٩ (ج) ٢,٤٥ (د) ٢٤,٥

٨) سقط جسم من قمة برج فوصل لسطح الأرض بعد ٨ ثواني فإن الزمن الذي يستغرقه الجسم منذ لحظة سقوطه لقطع  $\frac{1}{4}$  ارتفاع البرج هو ..... ثانية.

- (أ) ٢ (ب) ٣ (ج) ٤ (د) ٥

٩) سقط جسمان من ارتفاعان ف ، ٣ ف على الترتيب فإن النسبة بين سرعتيهما عند وصولهما للأرض هي .....

- (أ) ٣ : ١ (ب)  $\sqrt{3}$  : ١ (ج) ٩ : ١ (د) ١ : ٣

١٠) سقطت كرة من قمة برج ارتفاعه ف متر وتصل إلى الأرض بعد  $t$  ثانية فإن الكرة بعد  $\left(\frac{1}{3}t\right)$  ثانية تكون على ارتفاع ..... متر من الأرض.

- (أ)  $\frac{1}{9}f$  (ب)  $\frac{2}{9}f$  (ج)  $\frac{7}{9}f$  (د)  $\frac{8}{9}f$

١١) سقط جسم من قمة برج فقطع ٣٦٪ من ارتفاع البرج في الثانية الأخيرة قبل اصطدامه بالأرض فإن ارتفاع البرج يكون ..... متر.

- (أ) ٥٠ (ب) ٧٥ (ج) ١٠٠ (د) ١٢٢,٥

١٢) سقط جسم رأسياً من ارتفاع معين. فإذا كانت النسبة بين المسافة المقطوعة في الثانية الأخيرة إلى المسافة المقطوعة في الثانية قبل الأخيرة تساوي ٥ : ٤ فإن زمن وصول الجسم إلى سطح الأرض يساوي ..... ثانية.

- (١) ٥ (ب)  $\frac{1}{4}$  (ج) ٦ (د)  $\frac{1}{6}$

١٣) إذا وقعت بيضة من عش عصفور في شجرة ارتفاعه ٢,٥ متر وتوجد بنت تبعد عن قاعدة الشجرة ١٣ متر فتحركت البنت بسرعة منتظمة حتى تصل وتلحق بالبيضة قبل أن تصل للأرض بالكاد فإن سرعة البنت اللازمة لذلك هي ..... م/ث

- (١) ١,٣٣ (ب) ٣,٧٥ (ج) ٩,٨٣ (د) ١٨,٢

١٤) يتدرب لاعب الجمباز بالقفز لأعلى مرتين في المرة الأولى كانت السرعة الابتدائية (ع). وفي المرة الثانية

زادت سرعته الابتدائية حتى أصبحت (٤ ع). فإن :

$$\frac{\text{أقصى ارتفاع يصل إليه في المحاولة الثانية}}{\text{أقصى ارتفاع يصل إليه في المحاولة الأولى}} = \dots\dots\dots$$

- (١) ٢ (ب) ٤ (ج) ٨ (د) ١٦

١٥) يهبط أحد جنود المظلات رأسياً لأسفل بسرعة منتظمة وعندما كان على ارتفاع (ف) متر من سطح الأرض سقط منه عملة معدنية فإذا كانت سرعة الرجل عند وصوله سطح الأرض هي (١ع) وزمن وصول الرجل للأرض منذ لحظة سقوط العملة هو (١ص) وسرعة العملة المعدنية عند وصولها سطح الأرض هي (٢ع) وزمن وصول العملة المعدنية للأرض هي (٢ص) فإن :

أولاً : العلاقة بين ١ع ، ٢ع هي .....

- (١)  $١ع = ٢ع$  (ب)  $١ع < ٢ع$  (ج)  $١ع > ٢ع$  (د)  $١ع = \frac{1}{٢} ٢ع$

ثانياً : العلاقة بين ١ص ، ٢ص هي .....

- (١)  $١ص = ٢ص$  (ب)  $١ص < ٢ص$  (ج)  $١ص > ٢ص$  (د)  $١ص = \frac{1}{٢} ٢ص$


١٦) في الشكل المقابل :

جسيم سقط من قمة برج سقوطاً حراً فإن النسبة بين الأزمنة

التي يقطع فيها المسافات أ ، ب ، ج ، ح هي .....

- (١) ١ : ١ : ١ (ب) ١ : ٢ : ٣ (ج) ١ : ٣ : ٤ (د) ١ : ٤ : ٩

- (١) ١ : ١ : ١ (ب) ١ : ٢ : ٣ (ج) ١ : ٣ : ٤ (د) ١ : ٤ : ٩



١٧ من قمة برج ارتفاع ٢٩,٤ متر قذف جسم (أ) رأسياً لأعلى وفي نفس اللحظة قذف جسم آخر (ب) من سطح الأرض بسرعة ٢٤,٥ م/ث فتقابل الجسمان عند قمة البرج عندما كان اتجاه حركة الجسم (ب) لأسفل فإن السرعة التي قُذِف بها الجسم (أ) من قمة البرج = ..... م/ث.

(أ) ٩,٨ (ب) ١٤,٧ (ج) ١٩,٦ (د) ٢٤,٥

١٨ قذفت كرة رأسياً لأعلى من قمة برج ارتفاعه (ف) بسرعة (ع) فوصلت للأرض بعد زمن (١٧) وإذا قذفت من قمة نفس البرج لأسفل بسرعة (ع) فإنها تصل إلى الأرض بعد زمن (٢٧) فإن زمن سقوط الكرة من قمة نفس البرج للأرض = .....

(أ)  $\frac{1}{2}(١٧ + ٢٧)$  (ب)  $١٧ + ٢٧$   
(ج)  $\sqrt{٢ \cdot ١٧ \cdot ٢٧}$  (د)  $١٧ \cdot ٢٧$

٢ قذف حجر رأسياً إلى أعلى بسرعة ٣٤,٣ متر/ث من مقدمة قطار طوله ٦٠ متراً وقتما بدأ القطار يتحرك من السكون في خط مستقيم بعجلة منتظمة ٢ متر/ث<sup>٢</sup> هل يصيب الحجر القطار عندما يعود إلى مكان القذف؟ وعلى أي بُعد من مؤخرة القطار؟ «نعم، ١١ متراً»

## قانون الجذب العام

علمنا أن أى جسم يسقط لأسفل أو يتم قذفة لأسفل أو لأعلى فإنه يتحرك بعجلة تسمى بعجلة الجاذبية الأرضية ولكن ما سبب وجود هذه الجاذبية ولماذا تختلف من مكان لآخر فتقل كلما اقتربنا من خط الاستواء وتزداد كلما اقتربنا من أحد القطبين. وهل الجاذبية هذه خاصة بالكرة الأرضية فقط أم موجوده فى باقى الأجرام السماوية وهل الكرة الأرضية نفسها تقع تحت تأثير جاذبية أجرام سماوية أخرى ... وهكذا.

كل هذه الأسئلة يجب عنها قانون الجذب العام لنيوتن والذي نشره فى بحثه الرياضى «مبادئ الفلسفة الطبيعية» والذي نص على :

كل الأجسام فى الكون تتجاذب مع الأجسام الأخرى بتأثير قوة متبادلة مباشرة تتناسب طردياً مع كل من كتلتى الجسمين وعكسياً مع مربع المسافة بين مركزيهما.

$$F = G \frac{m_1 m_2}{r^2} \quad \text{ومنها} \quad G = \frac{F r^2}{m_1 m_2}$$

حيث :

- $G$  : قوة الجذب المتبادلة بين الجسمين بالنيوتن.
  - $m_1, m_2$  : كتلتا الجسمين بالكجم
  - $r$  : المسافة بين مركزي الجسمين بالمتر.
  - $G$  : ثابت الجذب العام.
- ويعرف أيضاً قانون الجذب العام بقانون التربيع العكسى.

### تعريف : ثابت الجذب العام

هو قوة الجذب المتبادلة بين كتلتين مقدار كل منهما ١ كيلوجرام والمسافة بين مركزيهما ١ متر ويساوى تقريباً

$$6,67 \times 10^{-11} \text{ نيوتن. م}^2 / \text{كجم}^2$$



مثال ١

كرتان كتلة الأولى ١٠ كجم والثانية ٥ كجم وضعا بحيث كانت المسافة بين مركزيهما ٠,٥ متر احسب قوة التجاذب بينهما علماً بأن ثابت الجذب العام  $= 6,67 \times 10^{-11}$  نيوتن.م<sup>٢</sup>/كجم<sup>٢</sup>

الحل

$$F = G \frac{m_1 m_2}{r^2}$$

$$\therefore \text{قوة الجذب بين الكرتين} = 6,67 \times 10^{-11} \times \frac{5 \times 10}{(0,5)^2} = 1,334 \times 10^{-8} \text{ نيوتن.}$$

وهي قوة صغيرة جداً.

ملاحظات :

- ١ عندما تسقط تفاحة مثلاً على الأرض فإن قوة التجاذب بين التفاحة والأرض هي قوة متبادلة حيث أن الأرض تجذب التفاحة والتفاحة بدورها تجذب الأرض.
- ٢ تقل قوة الجذب بين كتلتين كلما زادت المسافة بين مركزيهما.
- ٣ تزداد قوة الجذب بين كتلتين كلما قلت المسافة بين مركزيهما.
- ٤ كل الأجسام حولنا والتي تبدو ساكنة بالنسبة لبعضها البعض يوجد بينها قوى تجاذب متبادلة ولكنها صغيرة بدرجة لا تقوى على تحريك هذه الأجسام.
- ٥ قوة جذب الأرض لجسم كتلته (ك) كجم = وزن الجسم = ك و

مثال ٢

احسب قوة التجاذب المتبادلة بين كل من الشمس وكوكب المشتري بفرض أن كتلة الشمس  $2 \times 10^{30}$  كجم وكتلة المشتري  $1,89 \times 10^{27}$  كجم والمسافة بين مركزيهما  $7,73 \times 10^{11}$  متر علماً بأن ثابت الجذب العام  $= 6,67 \times 10^{-11}$  نيوتن.م<sup>٢</sup>/كجم<sup>٢</sup>

الحل

$$F = G \frac{m_1 m_2}{r^2}$$

$$\therefore \text{قوة التجاذب المتبادلة} = 6,67 \times 10^{-11} \times \frac{2 \times 10^{30} \times 1,89 \times 10^{27}}{(7,73 \times 10^{11})^2} \approx 4,22 \times 10^{23} \text{ نيوتن.}$$

مثال ٣

قمر صناعي كتلته ١٥٠٠ كجم يدور على ارتفاع ٥٤٠ كم من سطح الأرض التي كتلتها  $6 \times 10^{24}$  كجم ونصف قطرها ٦٣٦٠ كم. أوجد قوة جذب الأرض للقمر بالنيوتن علماً بأن ثابت الجذب العام يساوي  $6,67 \times 10^{-11}$  نيوتن.م<sup>٢</sup>/كجم<sup>٢</sup>

## الحل

$$ف = 6360 + 540 = 6900 \text{ كم} = 6900000 \text{ متر}$$

$$، \quad \therefore \quad \theta = \frac{r}{F} \times \frac{1}{F}$$

$$\therefore \text{ قوة جذب الأرض للقمر} = 6,67 \times 10^{-11}$$

$$\times \frac{2410 \times 6 \times 1500}{(6900000)^2} = 1,26 \times 10^{-4} \text{ نيوتن.}$$

## لاحظ أن

تم إهمال نصف قطر القمر الصناعي لصغره جداً بالنسبة لنصف قطر الأرض

## مثال ٤

إذا كانت قوة جذب الأرض للقمر هي :  $3,11 \times 10^{24}$  نيوتن وكانت كتلة الأرض  $6 \times 10^{24}$  كجم وكتلة القمر  $7 \times 10^{22}$  كجم فأوجد المسافة بين مركزيهما إذا كان ثابت الجذب العام  $6,67 \times 10^{-11}$  نيوتن.متر<sup>٢</sup>/كجم<sup>٢</sup>

## الحل

$$\therefore \quad \theta = \frac{r}{F} \times \frac{1}{F}$$

$$\therefore \quad 3,11 \times 10^{24} = \frac{6 \times 10^{24} \times 7 \times 10^{22}}{F^2} \times 6,67 \times 10^{-11}$$

$$\therefore \quad \theta = \frac{r}{F} \times \frac{1}{F}$$

$$\therefore \quad F = 3 \times 10^6 \text{ متر}$$

## معلومة إثرائية

إذا كان هناك قوى تجاذب هائلة بين الأجرام السماوية وبعضها البعض كالأرض والقمر والأرض والشمس ... وهكذا. فلماذا لا يقترب القمر من الأرض إلى أن يصطدم بها وكذلك الأرض والشمس وباقي الأجرام السماوية؟ يرجع ذلك لسبب أن الأرض مثلاً تدور حول الشمس في مسار شبيه دائري بسرعة تكسبها ما يسمى بقوة الطرد المركزي وهذه القوة تتوازن مع قوة الجذب مما يحافظ على وجود كل جرم سماوي في مداره.

## مثال ٥

احسب كتلة الأرض بالكجم إذا علمت أن طول نصف قطرها  $6360$  كم وبأن ثابت الجذب العام  $6,67 \times 10^{-11}$  نيوتن.م<sup>٢</sup>/كجم<sup>٢</sup> ، وعجلة الجاذبية الأرضية  $9,8$  م/ث<sup>٢</sup>

## الحل

بفرض أن جسمًا كتلته  $r$  موضوع على سطح الأرض وليكن كتلتها  $R$

،  $\therefore$  وزن الجسم هو قوة جذب الأرض للجسم

$$\therefore \quad r \times s = \frac{rR}{F^2} \times \theta$$

$$\therefore \quad 9,8 = \frac{R}{(6360000)^2} \times 6,67 \times 10^{-11}$$

$\therefore \quad R = (كتلة الأرض) = 6 \times 10^{24}$  كجم.

مثال ٦

احسب طول نصف قطر الأرض بفرض أن جسمًا كتلته ١ كجم وضع فوق سطحها علمًا بأن كتلة الأرض تساوي  $6 \times 10^{24}$  و ثابت الجذب العام  $6,67 \times 10^{-11}$  نيوتن.م<sup>٢</sup>/كجم<sup>٢</sup> ، وعجلة الجاذبية الأرضية  $g = 9,8$  م/ث<sup>٢</sup>

الحل

∴ وزن الجسم هو قوة جذب الأرض له

∴  $W = F_g = \frac{G M m}{r^2}$  حيث  $W$  كتلة الجسم ،  $M$  كتلة الأرض.

$$\therefore 1 \times 9,8 = \frac{6,67 \times 10^{-11} \times 6 \times 10^{24}}{r^2}$$

∴ نق (طول نصف قطر الأرض) =  $642,642,642$  متر =  $639,0$  كم.

مثال ٧

احسب عجلة الجاذبية الأرضية بوحدة م/ث<sup>٢</sup> لجسم كتلته ١ كجم وضع فوق سطحها. علمًا بأن كتلة الأرض تساوي  $5,95 \times 10^{24}$  كجم ، نصف قطر الأرض يساوي  $6360$  كم ، ثابت الجذب العام  $6,67 \times 10^{-11}$  نيوتن.م<sup>٢</sup>/كجم<sup>٢</sup>.

الحل

∴ وزن الجسم هو قوة جذب الأرض له

∴  $W = F_g = \frac{G M m}{r^2}$  حيث  $W$  كتلة الجسم ،  $M$  كتلة الأرض.

$$\therefore 1 \times g = \frac{6,67 \times 10^{-11} \times 5,95 \times 10^{24}}{(6360 \times 10^3)^2}$$

∴  $g = 9,81$  م/ث<sup>٢</sup>.

المقارنة بين عجلتي الجاذبية على سطحي كوكبين

بفرض  $g_1$  ،  $g_2$  عجلتي الجاذبية على سطحي كوكبين كتلتاهما  $M_1$  ،  $M_2$  كجم وطولاهما نصفى قطريهما  $r_1$  ،  $r_2$  متر وكان جسم كتلته  $m$  كجم موضوع على سطح أحد الكوكبين.

\* بالنسبة للكوكب الأول :

∴ وزن الجسم على الكوكب = قوة جذب الكوكب للجسم

(١)

$$\therefore W_1 = F_{g1} = \frac{G M_1 m}{r_1^2}$$

\* بالنسبة للكوكب الثاني :

∴ وزن الجسم على الكوكب = قوة جذب الكوكب للجسم

(٢)

$$\therefore W_2 = F_{g2} = \frac{G M_2 m}{r_2^2}$$

$$\text{بقسمة (١) على (٢) : } \frac{W_1}{W_2} = \frac{M_1 r_2^2}{M_2 r_1^2}$$

## مثال ٨

كوكب كتلته ثلاثة أمثال كتلة الأرض وقطره ضعف قطر الأرض. احسب النسبة بين عجلة الجاذبية على هذا الكوكب وعجلة الجاذبية الأرضية.

## الحل

بفرض  $r_1$  عجلة الجاذبية الأرضية ،  $K_1$  كتلة الأرض ،  $r_2$  طول نصف قطرها ،  $r_3$  عجلة الجاذبية على الكوكب ،  $K_3$  كتلة الكوكب ،  $r_4$  طول نصف قطره.

$$\therefore \frac{r_3}{r_4} \times \frac{K_1}{K_3} = \frac{r_3}{r_4} \cdot \frac{r_4^2}{r_3^2} = \frac{r_4}{r_3}$$

$$\therefore \frac{r_3}{r_4} = \frac{r_3}{r_4} \cdot \frac{r_4^2}{r_3^2} = \frac{r_4}{r_3} \quad \therefore \frac{r_3}{r_4} = \frac{r_3}{r_4} \cdot \frac{r_4^2}{r_3^2} = \frac{r_4}{r_3}$$

## مثال ٩

إذا علمت أن كتلة الأرض  $5,97 \times 10^{24}$  كجم وطول نصف قطرها  $6,34 \times 10^6$  م وكتلة القمر  $7,36 \times 10^{22}$  وطول نصف قطره  $1,74 \times 10^6$  م فأوجد النسبة بين عجلة الجاذبية على سطح القمر إلى سطح الأرض.

## الحل

بفرض عجلة الجاذبية على سطح القمر  $r_1$  ، على سطح الأرض  $r_2$

$$\therefore \frac{r_1}{r_2} = \frac{r_1}{r_2} \cdot \frac{r_2^2}{r_1^2} = \frac{r_2}{r_1} \quad \therefore \frac{r_1}{r_2} = \frac{r_1}{r_2} \cdot \frac{r_2^2}{r_1^2} = \frac{r_2}{r_1}$$

أي أن : عجلة الجاذبية على سطح القمر سدس مقدارها على سطح الأرض تقريباً.

## شدة مجال الجاذبية الأرضية

هي قوة جذب الأرض لكل ١ كجم من كتلة الجسم عند نقطة ما وهي تساوي عجلة الجاذبية عند هذه النقطة.

$$\text{شدة مجال الجاذبية عند نقطة ارتفاعها (ع) متر عن سطح الأرض} = \frac{K}{(ع + ر)^2}$$

حيث  $K$  ثابت الجذب العام ،  $K$  كتلة الأرض بالكجم ،  $R$  طول نصف قطر الأرض بالمتر.

## مثال ١٠

إذا علمت أن كتلة الأرض  $5,97 \times 10^{24}$  كجم وطول نصف قطرها  $6,36 \times 10^6$  متر. احسب شدة مجال الجاذبية الأرضية على ارتفاع ٥٠ كم من سطح الأرض.

## الحل

عند نقطة على ارتفاع ٥٠ كم = ٥٠٠٠٠ متر من سطح الأرض

$$\text{فإن شدة مجال الجاذبية} = \frac{K}{(٥٠٠٠٠ + ٦,٣٦ \times 10^6)^2} \times 5,97 \times 10^{24} = 9,69 \text{ نيوتن/كجم}$$

من أسئلة الكتاب المدرسي

مستويات عليا

تطبيق

فهم


تذكر

ملاحظة :

اعتبر ثابت الجذب العام لنيوتن :  $\Gamma = 6,67 \times 10^{-11}$  نيوتن. م<sup>2</sup>/كجم<sup>2</sup>

### أولاً أسئلة الاختيار من متعدد

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

- ١) ماذا يحدث لوزنك كلما ابتعدت عن سطح الأرض ؟  
 (أ) يزداد. (ب) لا يتأثر. (ج) يتضاعف. (د) يقل.
- ٢) لا تظهر قوى التجاذب المادي بين الأجرام السماوية بوضوح وذلك : .....  
 (أ) لبعد المسافة بينهما. (ب) لكبر كتل هذه الأجسام.  
 (ج) لقرب المسافة بينهما. (د) س ، ح معاً
- ٣) أى من المدارات الموضحة بالشكل التالي يُعتبر مداراً ممكناً لكوكب ما حول الشمس ؟  


٤) قوة التجاذب بين كتلتين كل منهما ٥٠ كجم والمسافة بين مركزيهما ٥٠ سم هي ..... نيوتن.

- (أ)  $1 \times 10^{-11}$  (ب)  $8 \times 10^{-11}$  (ج)  $6,6 \times 10^{-11}$  (د)  $6,67 \times 10^{-11}$

٥) كرتان كتلة الأولى ٥.٢ كجم وكتلة الثانية ٢٥.٠ كجم ، وضعت الكرتان بحيث كانت المسافة بين مركزيهما ٥٠ سم. فإن قوة التجاذب بينهما = ..... نيوتن.

- (أ)  $3,47 \times 10^{-10}$  (ب)  $3,47 \times 10^{-14}$

- (ج)  $4,83 \times 10^{-12}$  (د)  $2,68 \times 10^{-13}$

٦) قوة الجذب العام بين كوكبين كتلة الأول  $2 \times 10^{21}$  طن ، وكتلة الثاني  $4 \times 10^{20}$  طن ، والمسافة بين مركزيهما  $2 \times 10^6$  كم هي ..... نيوتن.

- (أ)  $2 \times 10^{24}$  (ب)  $2,234 \times 10^{20}$

- (ج)  $2,668 \times 10^{20}$  (د)  $1,234 \times 10^{24}$

٧) وضعت كرة من الحديد على بعد ٤٠ سم من كرة أخرى من النيكل كتلتها ٥٠ كجم فكانت قوة التجاذب بينهما  $12 \times 10^{-10}$  نيوتن. فإن كتلة كرة الحديد = ..... كجم.

(أ) ١٤,٣٩٣ (ب) ٥,٧٥٧ (ج)  $3,84 \times 10^{-10}$  (د) ٣,٨٦٥

٨) إذا علمت أن قوة الجذب المتبادلة بين الشمس والأرض هي  $35,67 \times 10^{21}$  نيوتن وأن كتلة كل من الأرض والشمس هي  $5,97 \times 10^{24}$  كجم ،  $19 \times 10^{24}$  كجم فإن المسافة بين الأرض والشمس = ..... متر.

(أ)  $6,36 \times 10^6$  (ب)  $2,12 \times 10^{22}$

(ج)  $1,8 \times 10^{12}$  (د)  $1,46 \times 10^{11}$

٩) قمر صناعي كتلته ٤٠٠٠ كجم يدور حول الأرض في مدار شبه دائري على ارتفاع ٤٤٠ كم من سطح الأرض فإذا كانت كتلة الأرض  $6 \times 10^{24}$  كجم وطول نصف قطرها  $6,36 \times 10^6$  متر. فإن قوة الجذب المتبادلة بين الأرض والقمر الصناعي = ..... نيوتن.

(أ) ٣٤٤١٨ (ب)  $2,35 \times 10^{11}$  (ج) ٣٤٦١٩ (د) ٣٩٥٧٥

١٠) قمر صناعي كتلته  $\frac{3}{4}$  طن يدور حول الأرض على ارتفاع ثابت فإذا كانت كتلة الأرض  $6 \times 10^{24}$  كجم وطول نصف قطرها ٦٣٦٠ كم وقوة جذب الأرض للقمر  $1,26 \times 10^4$  نيوتن.

فإن ارتفاع القمر عن سطح الأرض = ..... متر.

(أ) ٥٤٢٠٠٠ (ب) ٥٤٢٣٨١ (ج) ٥٧٦٥٤٣ (د) ٢٣٤٥٦١

١١) عجلة الجاذبية الأرضية .....

(أ) تزداد بزيادة كتلة الجسم.

(ب) تزداد بزيادة ارتفاع الجسم عن سطح الأرض.

(ج) تزداد باقتراب الجسم من مركز الأرض.

(د) ثابتة مهما بُعد الجسم عن مركز الأرض.

١٢) إذا كانت كتلة جسم على سطح القمر = ٤٠ كجم فإن وزنها على الأرض = ..... نيوتن.

(أ) ٢٤٠ (ب) ٣٩٢ (ج) ٧٨٤ (د) ٢٣٥٢

١٣) إذا كانت قوة الجاذبية بين جسمين هي ٢ وإذا نقصت كتلة كل منهما إلى النصف دون تغيير المسافة بينهما فإن قوة الجاذبية بينهما تصبح .....

(أ) ٢ (ب) ٢ (ج)  $\frac{1}{4}$  (د)  $\frac{1}{8}$

١٤) كتلتان قوة الجذب بينهما ٢ نيوتن زادت المسافة بينهما إلى الضعف

فإن قوة الجذب بينهما تصبح ..... نيوتن.

(أ) ٤ (ب) ٢ (ج) ١ (د)  $\frac{1}{4}$

- ١٥) ماذا يحدث لقوة الجذب بين جسمين عند مضاعفة المسافة بين مركزيهما ؟  
 (أ) تصبح الضعف. (ب) تصبح أربعة أمثال.  
 (ج) تصبح النصف. (د) تصبح الربع.
- ١٦) كتلتان قوة التجاذب بينهما ٢٧ نيوتن فإذا زادت المسافة بينهما إلى ثلاثة أمثال ما كانت عليه فإن قوة التجاذب بينهما تصبح ..... نيوتن.  
 (أ) ٨١ (ب) ٩ (ج) ٣ (د) ٢٧
- ١٧) زادت المسافة بين مركزي كتلتين إلى ثلاثة أمثال فقلت قوة الجاذبية بينهما. فإن النسبة بين قوة الجذب قبل زيادة المسافة وبعدها = .....  
 (أ) ١ : ٣ (ب) ٣ : ١ (ج) ١ : ٩ (د) ٩ : ١
- ١٨) قلت المسافة بين مركزي كتلتين فزادت قوة الجاذبية بينهما إلى الضعف فإن النسبة بين المسافتين الأولى والثانية = .....  
 (أ) ١ : ٢ (ب) ٢ : ١ (ج) ١ : ٤ (د) ٤ : ١
- ١٩) كوكبان كتلة الأول ضعف كتلة الثاني ونصف قطر الثاني ضعف نصف قطر الأول فإن نسبة عجلة جاذبية الأول إلى عجلة جاذبية الثاني = .....  
 (أ) ١ : ٨ (ب) ١ : ٤ (ج) ١ : ٢ (د) ١ : ١
- ٢٠) كوكبان كتلتاهما ٤ ل، ٩ ل كجم وطولاهما نصفى قطريهما ٢ نق، ٣ نق متر فإن النسبة بين عجلتي الجاذبية على سطحهما = .....  
 (أ)  $\frac{3}{8}$  (ب)  $\frac{2}{3}$  (ج)  $\frac{1}{27}$  (د) ١
- ٢١) كوكبان الأول كتلته ١,٩ × ١٠<sup>١٩</sup> كجم وطول نصف قطره ٢٠٠٠ كم والآخر كتلته ٣,٨ × ١٠<sup>١٩</sup> كجم وطول نصف قطره ٣٠٠٠ كم. فإن النسبة بين عجلتي الجاذبية في كل من الكوكبين = .....  
 (أ) ٢ : ١ (ب) ٤ : ٣ (ج) ٨ : ٩ (د) ٧ : ٢
- ٢٢) كوكب كتلته مساوية ثلاث مرات كتلة الأرض وقطره يساوي ثلاث مرات قدر قطر الأرض فإن النسبة بين عجلة الجاذبية على سطح هذا الكوكب وسطح الأرض = .....  
 (أ) ٩ : ١ (ب) ٣ : ١ (ج) ١ : ٩ (د) ١ : ٣
- ٢٣) إذا كان طول نصف قطر كل من القمر والأرض ١٦٠٠ كم، ٦٤٠٠ كم على الترتيب، وكانت النسبة بين عجلتي الجاذبية لكل منهما ١ : ٦ فإن النسبة بين كتلتيهما على الترتيب = .....  
 (أ) ٢٤ : ١ (ب) ١ : ٢٤ (ج) ١ : ٩٦ (د) ٩٦ : ١

٢٤) إذا كانت نق طول نصف قطر الأرض،  $r$  هي عجلة الجاذبية الأرضية لجسم يقع على ارتفاع  $f$  من سطح الأرض،  $r$  هي عجلة الجاذبية الأرضية لجسم يقع على ارتفاع  $f$  من سطح الأرض فإن  $\frac{r^2}{f^2} = \dots\dots\dots$

(أ)  $\frac{r}{f}$  (ب)  $\frac{r^2}{f^2}$  (ج)  $\frac{r+f}{r}$  (د)  $\frac{(r+f)^2}{(r+f)^2}$

٢٥) شدة مجال الجاذبية لكوكب كتلته  $M$  كجم وطول نصف قطره  $r$  متر على ارتفاع  $f$  متر من سطحه =  $\dots\dots\dots$  نيوتن/كجم حيث  $G$  ثابت الجذب العام.

(أ)  $G \times \frac{M}{r^2}$  (ب)  $G \times \frac{M}{r^2}$  (ج)  $G \times \frac{M}{r^2 + f^2}$  (د)  $G \times \frac{M}{(r+f)^2}$

٢٦) إذا علمت أن كتلة الأرض  $6.0 \times 10^{24}$  كجم وطول نصف قطرها  $6.37 \times 10^6$  متر فإن شدة مجال الجاذبية الأرضية على سطح الأرض =  $\dots\dots\dots$  نيوتن/كجم.

(أ) 9.8 (ب) 9.81 (ج) 9.993 (د) 9.89

٢٧) عجلة الجاذبية على سطح كوكب المشتري علماً بأن كتلة المشتري  $1.898 \times 10^{27}$  كجم وطول نصف قطره 69911 كم تساوى  $\dots\dots\dots$  م/ث<sup>٢</sup>

(أ)  $3.9 \times 10^{11}$  (ب) 9.8 (ج)  $25.9 \times 10^6$  (د) 25.9

٢٨) عجلة الجاذبية الأرضية عند نقطة على عمق 8000 متر من سطح الأرض إذا علم أن كتلة الأرض  $6 \times 10^{24}$  كجم وطول نصف قطرها 6370 كم تساوى  $\dots\dots\dots$  م/ث<sup>٢</sup>

(أ) 10.15 (ب) 9.919 (ج) 9.81 (د) 9.85

٢٩) إذا كانت عجلة الجاذبية الأرضية (g) هي 10 م/ث<sup>٢</sup> وطول نصف قطر الأرض يساوى  $6.37 \times 10^6$  متر. فإن كتلة الأرض =  $\dots\dots\dots$  كجم.

(أ)  $4.04 \times 10^{14}$  (ب)  $5.943 \times 10^{24}$  (ج)  $6.06 \times 10^{24}$  (د)  $8.34 \times 10^{24}$

٣٠) كتلة كوكب المريخ إذا علمت أن عجلة جاذبيته 3.711 م/ث<sup>٢</sup> وطول نصف قطره 3390 كم تساوى  $\dots\dots\dots$  كجم.

(أ)  $3.69 \times 10^{23}$  (ب)  $8.34 \times 10^{24}$  (ج)  $6.39 \times 10^{23}$  (د)  $4.265 \times 10^{13}$



٣١ من نقطة على سطح القمر قذف أحد رواد الفضاء كرة لأعلى بسرعة ابتدائية ١٤ متر/ث

فإن أقصى ارتفاع تصل إليه الكرة = ..... متر.

(علماً بأن عجلة الجاذبية على سطح القمر =  $\frac{٤٩}{٣}$  متر/ث<sup>٢</sup>)

(د) ٦٠

(ج) ١٥

(ب)  $٤\frac{٢}{٧}$


(أ) ٢,٥

٣٢ في الشكل المقابل :

ثلاث كتل متساوية عند رؤوس مثلث قائم الزاوية

وكانت  $٢$  تعبر عن قوة الجذب المتبادلة بين الكتلتين عند ١ ، ٢

فإن : .....



(ب)  $٢ < ١ < ٣$

(أ)  $٢ < ١ < ٣$

(د)  $٢ > ١ > ٣$

(ج)  $٢ > ١ > ٣$

٣٣ في الشكل المقابل :


ثلاث كتل ١ ، ٢ ، ٣

موضوعة عند رؤوس مثلث متساوي

الأضلاع وكانت  $٢$  تعبر عن قوة

الجذب المتبادلة بين الكتلتين عند ١ ، ٢

فإن : .....



(ب)  $٢ > ١ > ٣$

(أ)  $٢ < ١ < ٣$

(د)  $٢ > ١ > ٣$

(ج)  $٢ < ١ < ٣$

٣٤ في الشكل المقابل :


أربعة أجسام كتلة كل منها ١

موضوعة عند رؤوس مربع طول قطره ٢ ف

إذا وضع جسم كتلته ١ في مركز المربع

فإن قوى التجاذب المؤثرة على الجسم الموضوع

عند مركز المربع = .....



(د) ٤ ث  $(\frac{١}{ف})^٢$

(ج) ٢ ث  $(\frac{١}{ف})^٢$

(ب) ٢ ث  $(\frac{١}{ف})^٢$

(أ) صفر

## ثانياً الأسئلة المقالية

١ احسب قوة التجاذب المتبادلة بين الشمس والأرض إذا علمت أن الأرض تسير في مدار شبه دائري حول الشمس وأن كتلة الأرض تساوي  $6 \times 10^{24}$  كجم ، وكتلة الشمس تساوي  $19 \times 10^{29}$  كجم ، والمسافة بين مركزيهما تساوي  $1,5 \times 10^{11}$  متر.

« $2,379 \times 10^{22}$  نيوتن»

٢ إذا علمت أن كتلة الأرض  $6 \times 10^{24}$  كجم وكتلة القمر  $7 \times 10^{22}$  كجم والمسافة بين مركزيهما  $3 \times 10^6$  متر وثابت الجذب العام  $6,67 \times 10^{-11}$  نيوتن. م<sup>٢</sup>/كجم<sup>٢</sup>. أوجد قوة جذب الأرض للقمر.

« $2,11 \times 10^{24}$  نيوتن»

٣ صاروخ كتلته ٨ طن انطلق من على سطح الأرض ويعد أن أصبح على بعد ١٥٠ كم من سطح الأرض فقد ربع كتلته نتيجة لاحتراق الوقود احسب وزنه حينئذ علماً بأن كتلة الأرض  $5,97 \times 10^{24}$  كجم وطول نصف قطرها ٦٣٦٠ كم.

«٥٦٣٧٥ نيوتن»

٤ قمر صناعي كتلته ٤ كجم يدور على ارتفاع ٤٤٠ كم من سطح الأرض التي كتلتها  $6 \times 10^{24}$  كجم ونصف قطرها ٦٣٦٠ كم. أوجد له لأقرب كجم علماً بأن ثابت الجذب العام يساوي  $6,67 \times 10^{-11}$  نيوتن. م<sup>٢</sup>/كجم<sup>٢</sup> ، قوة جذب الأرض للقمر هي ١٧٣١٠ نيوتن.

«٢٠٠٠ كجم»

٥ إذا علمت أن كتلة الأرض  $5,97 \times 10^{24}$  كجم وطول نصف قطرها  $6,34 \times 10^6$  متر أوجد شدة جذب الأرض لجسم كتلته ١٠٠٠ كجم موضوع على سطح الأرض ومنها أوجد عجلة الجاذبية الأرضية.

« $9,9 \times 10^{-2}$  نيوتن ،  $9,9$  م/ث<sup>٢</sup>»

٦ إذا كانت كتلة الأرض قدر كتلة القمر ٨١ مرة وقطراهما ١٢٧٥٦ كم ،  $3476$  كم على الترتيب فإذا كانت عجلة الجاذبية الأرضية  $9,8$  م/ث<sup>٢</sup> فكم يكون تسارع الجاذبية على سطح القمر ؟

« $1,63$  م/ث<sup>٢</sup>»

٧ إذا كانت كتلة المريخ تساوي  $0,107$  من كتلة الأرض وطول نصف قطر الأرض  $6400$  كم وعجلة الجاذبية على سطح المريخ تساوي  $0,28$  من عجلة الجاذبية على سطح الأرض. احسب طول نصف قطر المريخ.

« $2,3961 \times 10^6$  متر»

٨ إذا علمت أن كتلة الأرض تساوي  $5,97 \times 10^{24}$  كجم وطول نصف قطرها  $6,34 \times 10^6$  متر وكتلة القمر تساوي  $7,36 \times 10^{22}$  كجم فأوجد طول نصف قطر القمر إذا كانت الجاذبية على سطح الأرض ستة أمثالها على سطح القمر.

« $1,724 \times 10^6$  متر»

٩ محطة فضائية دولية وزنها على سطح الأرض  $421997,6$  نيوتن. أوجد وزنها عندما تكون في المدار الخارجي على ارتفاع  $350$  كم من سطح الأرض علماً بأن طول نصف قطر الأرض يساوي  $6,37 \times 10^6$  كم وكتلتها  $5,6 \times 10^{24}$  كجم.

« $3,79 \times 10^9$  نيوتن»

١٠ مركبة فضائية وزنها ٢١٩٦٠٠ نيوتن على سطح الأرض ووزنها على سطح المريخ ٨٣١٥٧ نيوتن فإذا كانت كتلة الأرض  $6 \times 10^{24}$  كجم وطول نصف قطرها ٦٣٦٠ كم ، وكتلة المريخ  $6,39 \times 10^{23}$  أوجد طول نصف قطر كوكب المريخ.

«٣,٢٧٣ × ١٠ متر»

١١ سقطت كرة من يد رائد فضاء من على ارتفاع ٧٣٥ سم من سطح القمر فاصطدمت بسطح القمر بعد ٣ ثوانٍ فإذا كانت كتلة القمر  $7,36 \times 10^{22}$  كجم وكتلة الأرض  $5,97 \times 10^{24}$  كجم وطول نصف قطر الأرض  $6,34 \times 10^6$  متر وعجلة جاذبية الأرض هي ٩,٨ متر/ث<sup>٢</sup> . أوجد طول نصف قطر القمر. «١٧٢٤٣١٥ متر»

١٢ إحدى شركات التنقيب عن البترول بالبحر الأبيض المتوسط قامت بدق أسطوانة مفرغة ارتفاعها ٢٠٠٠ متر ثم قامت بإنزال جسم كتلته واحد طن مربوطة بحبل سوف ينقطع إذا بلغ الشد فيه ٩٩٠٠ نيوتن في هذه الأسطوانة فإذا كانت كتلة الأرض  $6 \times 10^{24}$  كجم. وطول نصف قطرها ٦٣٦٠٠٠٠ متر فهل سيصل الجسم إلى قاع الأسطوانة أم سينقطع الحبل قبلها وإن كان الحبل سينقطع فاحسب المسافة التي تدلى بها الحبل إلى لحظة انقطاعه.

«سينقطع ، ١٩٩٣,٨٣٣ متر»

## الاحتمال

## الوحدة

# 2

1 الدرس  
بعض المصطلحات والمفاهيم الأساسية -  
الأحداث - العمليات على الأحداث.

2 الدرس  
مسلمات وقوانين الاحتمال - حساب الاحتمال.



بعض المصطلحات والمفاهيم الأساسية  
- الأحداث - العمليات على الأحداث

\* لاحظ كلاً من المواقع التالية :

سلة تحتوي على ٣ كرات متماثلة  
غير معروف ألوانها



أنا لا أعلم لون الكرة  
المسحوبة ولا أستطيع  
أن أتنبأ حتى بالألوان  
الممكنة الحدوث

ليست تجربة عشوائية

سلة بها ٣ كرات متماثلة ألوانها  
(حمراء - خضراء - سوداء)



أنا لا أعلم لون الكرة  
المسحوبة ولكنها إما  
حمراء أو خضراء  
أو سوداء

تجربة عشوائية

سلة بها ٣ كرات حمراء متماثلة



أنا متأكد أن لون  
الكرة المسحوبة أحمر

ليست تجربة عشوائية

\* التجربة العشوائية :

هي كل تجربة يمكن معرفة جميع النواتج الممكنة لها قبل إجرائها ولكن لا نستطيع أن نحدد أيًا من هذه النواتج  
سوف يتحقق فعلاً عند إجرائها.

\* فضاء العينة (أو فضاء النواتج) :

هو مجموعة كل النواتج الممكنة الحدوث لتجربة عشوائية ما  
ويرمز له عادة بالرمز (ف) ويرمز لعدد عناصر فضاء العينة بالرمز n(ف).

## مثال ١

بين أيًا من التجارب التالية عشوائية وأيها غير عشوائية ثم اكتب فضاء العينة لكل من التجارب العشوائية ، مبيّنًا عدد عناصره :

- ١ إلقاء قطعة نقود مرة واحدة وملاحظة الوجه الظاهر.
- ٢ إلقاء حجر نرد مرة واحدة وملاحظة العدد الظاهر على الوجه العلوي.
- ٣ سحب بطاقة من خمس بطاقات مرقمة من ١٠ إلى ١٤ وملاحظة العدد المكتوب على البطاقة.
- ٤ سحب بطاقة مرقمة من حقيبة تحتوي على مجموعة من البطاقات المرقمة (دون أن نعرف أرقامها) وملاحظة رقم البطاقة المسحوبة.
- ٥ سحب كرة من كيس يحتوي على كرة سوداء وكرة حمراء وكرة صفراء وكرة بيضاء وملاحظة لون الكرة المسحوبة.
- ٦ اختيار عدد أولى ينحصر بين ١٥ ، ٣٢

## الحل

١ التجربة عشوائية ، النواتج الممكنة لهذه التجربة هي : صورة (ص) ، كتابة (ع)

$$\therefore \text{ف} = \{ص ، ع\} ، \text{ص} = (ف) ، \text{ع} = (ف) = ٢$$

٢ التجربة عشوائية ، ف = {١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ ، ٥ ، ٦} ، ص = (ف) = ٦

٣ التجربة عشوائية ، ف = {١٠ ، ١١ ، ١٢ ، ١٣ ، ١٤} ، ص = (ف) = ٥

٤ التجربة غير عشوائية.

٥ التجربة عشوائية ، ف = {أسود ، أحمر ، أصفر ، أبيض} ، ص = (ف) = ٤

٦ التجربة عشوائية ، ف = {١٧ ، ١٩ ، ٢٣ ، ٢٩ ، ٣١} ، ص = (ف) = ٥

## مثال ٢


اكتب فضاء العينة لتجربة إلقاء قطعة نقود مرتين متتاليتين وملاحظة نتائج الصور والكتابات مبيّنًا عدد عناصره.

## الحل

كل ناتج من نواتج التجربة هو زوج مرتب على الصورة : (ناتج الرمية الأولى ، ناتج الرمية الثانية) وحيث إن النواتج الممكنة لكل من الرميتين الأولى والثانية هي : صورة (ص) ، كتابة (ع)

$$\therefore \text{ف} = \{(ص ، ص) ، (ص ، ع) ، (ع ، ص) ، (ع ، ع)\}$$

ناتج الرمية الأولى  
ناتج الرمية الثانية  
فضاء العينة (ف)



$$\text{أي أن } F = \{ص, ك\} \times \{ص, ك\}$$

$$n(F) = 2 \times 2 = 4$$

ويمكن التوصل إلى عناصر فضاء العينة بواسطة الشجرة البيانية المقابلة :

لاحظ أن :  $(ص, ك) \neq (ك, ص)$

### ملاحظة :

فضاء ناتج إلقاء قطعتي نقود متميزتين (مختلفتين في اللون أو الشكل أو الحجم ...) معاً في آن واحد هو نفس فضاء ناتج إلقاء قطعة نقود واحدة مرتين متتاليتين. ويكون كل ناتج من ناتج التجربة هو زوج مرتب على الصورة (وجه القطعة الأولى ، وجه القطعة الثانية)

### مثال ٣

اكتب فضاء العينة لتجربة إلقاء حجر نرد مرتين متتاليتين وملاحظة العدد الذي يظهر على الوجه العلوي في الرميّتين مبيّناً عدد عناصره.

### الحل

كل ناتج من ناتج التجربة هو زوج مرتب على الصورة : (ناتج الرمية الأولى ، ناتج الرمية الثانية).

$$F = \{(س, ص) : س \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}, ص \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}\}$$


$$\text{أي أن } F = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\} \times \{1, 2, 3, 4, 5, 6\} \quad n(F) = 6 \times 6 = 36$$

ويمكن تمثيل فضاء العينة (ف) بالصور التالية :


١ على صورة جدول :

		ناتج الرمية الثانية					
		١	٢	٣	٤	٥	٦
ناتج الرمية الأولى	١	(١, ١)	(٢, ١)	(٣, ١)	(٤, ١)	(٥, ١)	(٦, ١)
	٢	(١, ٢)	(٢, ٢)	(٣, ٢)	(٤, ٢)	(٥, ٢)	(٦, ٢)
	٣	(١, ٣)	(٢, ٣)	(٣, ٣)	(٤, ٣)	(٥, ٣)	(٦, ٣)
	٤	(١, ٤)	(٢, ٤)	(٣, ٤)	(٤, ٤)	(٥, ٤)	(٦, ٤)
	٥	(١, ٥)	(٢, ٥)	(٣, ٥)	(٤, ٥)	(٥, ٥)	(٦, ٥)
	٦	(١, ٦)	(٢, ٦)	(٣, ٦)	(٤, ٦)	(٥, ٦)	(٦, ٦)

٣ بالشجرة البيانية :



٢ هندسياً على الشبكة البيانية :



ملاحظات :

- \* فضاء العينة لتجربة إلقاء حجر نرد مرتين متتاليتين هو نفسه فضاء العينة لتجربة إلقاء حجر نرد متميزين مرة واحدة.
- \* عدد عناصر فضاء العينة  $V(n) = n^2$  حيث  $n$  هو عدد النواتج الممكنة للرمية الواحدة ،  $n$  هو عدد الرميات. فمثلاً عند إلقاء حجر نرد ثلاث مرات فإن عدد عناصر فضاء العينة  $= 3^2(6) = 216$

مثال ٤

صندوق به ٣ كرات إحداهما بيضاء والثانية حمراء والثالثة سوداء. سحبت كرتان من الصندوق ولوحظ لونهما. أوجد فضاء العينة مبيئاً عدد عناصره في كل من الحالات الآتية :

- ١ إذا سحبت الكرتان الواحدة بعد الأخرى مع الإحلال.
- ٢ إذا سحبت الكرتان الواحدة وراء الأخرى بدون إحلال.
- ٣ إذا سحبت الكرتان معاً.

الحل


نرمز للكرة البيضاء (ب) ، والكرة الحمراء (ح) والكرة السوداء (س)

١ إذا سحبت الكرتان الواحدة بعد الأخرى مع الإحلال «معناها أن الكرة المسحوبة أولاً تعاد إلى الصندوق قبل السحبة الثانية».


وباستخدام الشجرة البيانية المقابلة نجد أن :

$$F = \{(ب، ب)، (ب، ح)، (ب، س)، (ح، ب)، (ح، ح)، (ح، س)، (س، ب)، (س، ح)، (س، س)\}$$

$$n(F) = 9$$







٢ إذا سحبت الكرتان الواحدة وراء الأخرى بدون إحلال «معناها أن الكرة المسحوبة أولاً لا تعاد إلى الصندوق قبل السحبة الثانية»

وباستخدام الشجرة البيانية المقابلة نجد أن :

$$ف = \{(ع، س)، (س، س)، (س، ع)\}$$

$$ن(ف) = 3$$

٣ إذا سحبت الكرتان معاً [فى هذه الحالة لا يراعى ترتيب ظهور الكرتين]

$$ف = \{س، س، ع، ع، س\}$$

$$ن(ف) = 3$$

### مثال ٥


اكتب فضاء العينة لكل من التجارب العشوائية التالية مبيئاً هل هو منته أم غير منته :

١ إلقاء قطعة نقود ثم حجر نرد وملاحظة ما يظهر على وجهيهما العلويين (ماذا يحدث إذا ألقى حجر النرد أولاً ثم قطعة النقود).

٢ التسديد على هدف ٤ مرات على الأكثر على أن تتوقف عن التسديد عند إصابته.

٣ التسديد على هدف ما إلى أن تتم إصابة الهدف وملاحظة عدد مرات التسديد.

### الحل



$$١ \quad ف = \{ص، ك\} \times \{١، ٢، ٣، ٤، ٥، ٦\}$$

$$= \{(ص، ١)، (ص، ٢)، (ص، ٣)، (ص، ٤)، (ص، ٥)، (ص، ٦)، (ك، ١)، (ك، ٢)، (ك، ٣)، (ك، ٤)، (ك، ٥)، (ك، ٦)\}$$

$$\{(ك، ١)، (ك، ٢)، (ك، ٣)، (ك، ٤)، (ك، ٥)، (ك، ٦)\}$$

$$ن(ف) = 6 \times 2 = 12 \text{ «هذا الفضاء منته»}$$

\* أما إذا ألقى حجر النرد أولاً ثم قطعة النقود

$$ف = \{١، ٢، ٣، ٤، ٥، ٦\} \times \{ص، ك\}$$


$$= \{(١، ص)، (٢، ص)، (٣، ص)، (٤، ص)، (٥، ص)، (٦، ص)، (١، ك)، (٢، ك)، (٣، ك)، (٤، ك)، (٥، ك)، (٦، ك)\}$$

$$\{(١، ك)، (٢، ك)، (٣، ك)، (٤، ك)، (٥، ك)، (٦، ك)\}$$

$$ن(ف) = 6 \times 2 = 12$$

## لاحظ أن

$$F_1 \neq F_2 \text{ ولكن } n(F_1) = n(F_2)$$



٢ إذا رمزنا للإصابة بالرمز (ص) ورمزنا للخبط

بالرمز (ع) وباستخدام الشجرة البيانية المقابلة نجد أن :

$$F = \{ص، ع، ص، ع، ع، ص، ع، ع، ص، ع، ع، ع، ص، ع، ع، ع\}$$

$$\{ص، ع، ص، ع، ع، ص، ع، ع، ص، ع، ع، ع، ص، ع، ع، ع\}$$

$$n(F) = 16$$

« هذا الفضاء منته ويسمى أيضًا بالفضاء غير المنتظم »

$$٣ F = \{١، ٢، ٣، ٤، \dots\}$$

## ملاحظة :

يكون فضاء العينة منتهيًا إذا كان عدد عناصره محدودًا ويكون غير منته إذا كان عدد عناصره غير محدود وسندرس فقط فضاء النواتج المنتهي.

\* لاحظ في تجربة إلقاء حجر نرد مرتين متتاليتين الفرق بين :

١ ملاحظة « العديدين الظاهرين على الوجه العلوي ».

$$\therefore F_1 = \{١، ٢، ٣، ٤، ٥، ٦\} \times \{١، ٢، ٣، ٤، ٥، ٦\} = \{(١، ١)، (١، ٢)، \dots، (٦، ٦)\} = ٣٦ = n(F_1)$$

٢ ملاحظة « مجموع العديدين الظاهرين على الوجه العلوي ».

$$\therefore F_2 = \{٢، ٣، ٤، ٥، ٦، ٧، ٨، ٩، ١٠، ١١، ١٢\} = n(F_2) = ١١$$

$$\text{لاحظ أن : } F_1 \neq F_2 \text{ ، } n(F_1) \neq n(F_2)$$

## الأحداث

\* الحدث :

هو أي مجموعة جزئية من فضاء العينة.

\* وقوع الحدث :

يقال إن حدثًا ما قد وقع إذا كان ناتج التجربة العشوائية هو أحد عناصر المجموعة التي يتألف منها هذا الحدث.

\* الحدث المؤكد (F) :

هو حدث لا بد أن يقع عند إجراء التجربة العشوائية.

\* الحدث المستحيل ( $\emptyset$ ) :


هو حدث لا يمكن أن يقع عند إجراء التجربة العشوائية.

\* الحدث البسيط (أو الأولي) :

هو مجموعة جزئية من فضاء العينة (F) تحتوى على عنصر واحد فقط.

## العمليات على الأحداث


### ١ تقاطع حدثين $(A \cap B)$ :



\* هو حدث وقوع  $A$  و  $B$  معاً

\* هو حدث وقوع الحدثين معاً.


### ٢ اتحاد حدثين $(A \cup B)$ :



\* هو حدث وقوع  $A$  أو  $B$  أو كليهما

\* هو حدث وقوع أحدهما على الأقل.

### ٣ الفرق بين حدثين $(A - B)$ :




\* هو حدث وقوع  $A$  فقط

\* هو حدث وقوع  $A$  و عدم وقوع  $B$

$$A - B = A \cap B^c$$

### ٤ الحدث المكمل $(A^c)$ :



\* هو حدث عدم وقوع  $A$

فمثلاً في تجربة إلقاء حجر نرد مرة واحدة وملاحظة العدد الظاهر على الوجه العلوي نجد أن :

$$F = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

وإذا كان :  $A$  حدث الحصول على عدد زوجي ،  $B$  حدث الحصول على عدد أولى

$$A = \{2, 4, 6\} \text{ ، } B = \{1, 2, 3\}$$





$$\text{حدث وقوع أحد الحدثين على الأقل} = A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

$$\text{حدث وقوع الحدثين معاً} = A \cap B = \{2\}$$

$$\text{حدث وقوع } A \text{ فقط} = A - B = A \cap B^c = \{4, 6\}$$

$$\text{حدث عدم وقوع } A = A^c = \{1, 3, 5, 6\}$$

\* والجدول الآتي يوضح بعض الأحداث والتعبير اللفظي عنها وتمثيلها بشكل فن :

<p>* حدث عدم وقوع أ و ب معاً. * حدث وقوع أحدهما على الأكثر.</p>  <p>ف</p> <p><math>\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}</math></p>	<p>* حدث عدم وقوع الحدثين أ و ب معاً. * حدث وقوع أحدهما على الأكثر.</p>  <p>ف</p> <p><math>\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}</math></p>
<p>قانونا دي مورجان</p>	
<p>* حدث وقوع أحد الحدثين دون الآخر. * حدث وقوع أحد الحدثين فقط. * حدث وقوع أ فقط أو وقوع ب فقط.</p>  <p>ف</p> <p><math>(A - B) \cup (B - A)</math> <math>(A \cap B) - (A \cup B) =</math></p>	<p>* حدث وقوع ب أو عدم وقوع أ * حدث عدم وقوع أ فقط.</p>  <p>ف</p> <p><math>(B - A) = \overline{A} \cap B</math></p>

\* الأحداث المتنافية : يقال إن الحدثين متنافيين إذا استحال وقوعهما معاً (في نفس الوقت) أي أن وقوع أحدهما ينفى (يمنع) وقوع الآخر.

**فمثلاً** : إذا كان «حدث نجاح باسم في امتحان ما» ، «حدث رسوبه في نفس الامتحان» فإن وقوع أحد الحدثين ينفى وقوع الآخر. ∴ أ ، ب حدثان متنافيان.

### تعريف

- ١) يقال إن الحدثين أ ، ب من فضاء عينة ف متنافيان إذا وفقط إذا كان  $A \cap B = \emptyset$
- ٢) يقال لعدة أحداث إنها متنافية إذا وفقط إذا كانت متنافية مثنى مثنى.

### ملاحظات :

\* الأحداث البسيطة (الأولية) المختلفة في أي تجربة عشوائية تكون متنافية.

\* الحدث أ ومكمله  $\overline{A}$  حدثان متنافيان ويكون :

$$\overline{A} \cap A = \emptyset \quad (1) \quad \text{(الحدث المستحيل)}$$

$$A \cup \overline{A} = \Omega \quad (2) \quad \text{(الحدث المؤكد).}$$

مثال ٦

في تجربة إلقاء حجر نرد مرة واحدة وملاحظة العدد الذي يظهر على الوجه العلوي له. اكتب فضاء العينة ثم اكتب كلاً من الأحداث الآتية مبيناً أيًا من هذه الأحداث بسيط وأيها مستحيل :

- ١ حدث «الحصول على عدد أكبر من أو يساوي ٣»
- ٢ حدث «الحصول على عدد أصغر من ٥»
- ٣ حدث «الحصول على عدد يقبل القسمة على ٣»
- ٤ حدث «الحصول على عدد فردي غير أولي».
- ٥ حدث «الحصول على عدد أكبر من ٢ وأصغر من ٣»
- ٦ وحدث «الحصول على عدد ينحصر بين ٠ ، ٧»

الحل

فضاء العينة ف = {١، ٢، ٣، ٤، ٥، ٦}

- |  |  |
|--|--|
| <p>٢ = {١، ٢، ٣، ٤}</p> <p>٤ = {١} «حدث بسيط»</p> <p>٢ = {١، ٢، ٣، ٤، ٥، ٦} «حدث مؤكد»</p> | <p>١ = {١، ٢، ٣، ٤، ٥، ٦}</p> <p>٣ = {٢، ٣، ٦}</p> <p>٥ = ∅ «حدث مستحيل»</p> |
|--|--|

مثال ٧

في تجربة اختيار عدد صحيح من بين الأعداد ١ إلى ١٠. اكتب فضاء النواتج ثم عيّن كلاً من الأحداث الآتية :

- ١ حدث «الحصول على عدد زوجي».
- ٢ حدث «الحصول على عدد أولي».
- ٣ حدث «الحصول على عدد فردي».
- ٤ حدث «الحصول على عدد يقبل القسمة على ٤».
- ٥ حدث «الحصول على عدد  $\geq ٣$ »
- ٦ وحدث «الحصول على عدد مربع كامل».
- ٧ حدث «الحصول على عدد زوجي أولي».
- ٨ ل حدث «الحصول على عدد زوجي أو أولي».
- ٩ س حدث «الحصول على عدد يحقق المعادلة :  $٣ - س = ٥$ ».
- ١٠ ص حدث «الحصول على عدد يحقق المتباينة :  $٣ - س \leq ٢٠$ ».

الحل

ف = {١، ٢، ٣، ٤، ٥، ٦، ٧، ٨، ٩، ١٠}

- |   |   |
|---|---|
| <p>٢ = {٢، ٣، ٤، ٥، ٦، ٧، ٨}</p> <p>٤ = {٨، ٤}</p> <p>٦ = {١، ٤، ٩}</p> <p>٨ = {٢، ٣، ٤، ٥، ٦، ٧، ٨، ٩، ١٠} = ٢ ∪ ٤ = ل</p> <p>١٠ = {٧، ٨، ٩، ١٠} = ص</p> | <p>١ = {٢، ٤، ٦، ٨، ١٠}</p> <p>٣ = {١، ٣، ٥، ٧، ٩}</p> <p>٥ = {١، ٢، ٣}</p> <p>٧ = ٢ ∩ ٤ = ل</p> <p>٩ = {٩} = س</p> |
|---|---|

## مثال ٨

في تجربة رمي قطعة نقود مرتين متتاليتين وملاحظة نتائج ظهور الصور والكتابات اكتب فضاء العينة ف ثم عبّر عن كل من الأحداث التالية :

- ١ حدث «الحصول على صورة في الرمية الأولى».
- ٢ حدث «الحصول على صورة في إحدى الرميات».
- ٣ حدث «الحصول على صورة في إحدى الرميات وكتابة في الرمية الأخرى».
- ٤ حدث «الحصول على نفس الشيء في الرميات».
- ٥ حدث «الحصول على صورة في الرميات».
- ٦ حدث «الحصول على صورة على الأكثر في الرميات».

## الحل

$$F = \{(ص، ص)، (ص، ل)، (ل، ص)، (ل، ل)\}$$

$$\begin{aligned} \text{١} \quad \{ (ص، ص)، (ص، ل) \} &= \text{أ} \\ \text{٢} \quad \{ (ص، ص)، (ص، ل)، (ل، ص)، (ل، ل) \} &= \text{ب} \\ \text{٣} \quad \{ (ص، ل)، (ل، ص) \} &= \text{ج} \\ \text{٤} \quad \{ (ص، ص)، (ل، ل) \} &= \text{د} \\ \text{٥} \quad \{ (ص، ص) \} &= \text{هـ} \\ \text{٦} \quad \{ (ص، ل)، (ل، ص)، (ل، ل) \} &= \text{و} \end{aligned}$$

## مثال ٩

من مجموعة الأرقام  $\{1, 2, 3, 4\}$  كون عدد من رقمين مختلفين. اكتب فضاء العينة لهذه التجربة ثم أوجد كلاً من الأحداث الآتية :

- ١ حدث «مجموع الرقمين = ٧»
- ٢ حدث «مجموع الرقمين عدد زوجي».
- ٣ حدث «مجموع الرقمين عدد أولي».
- ٤ حدث «العدد الناتج يقبل القسمة على ٣»
- ٥ حدث «رقم الآحاد زوجي».
- ٦ حدث «رقم العشرات أولي».

ثم أوجد كلاً من :  $A \cup B, A \cap B, A - B, A \cap C$

## الحل

باستخدام الشجرة البيانية المقابلة نجد أن :

$$F = \{21, 31, 41, 12, 32, 42, 13, 23, 43, 14, 24, 34\}$$

$$\text{١} \quad \{34, 43\} = \text{أ}$$

$$\text{٢} \quad \{24, 42, 13, 31\} = \text{ب}$$

$$\text{٣} \quad \{34, 14, 43, 23, 32, 12, 41, 21\} = \text{ج}$$


$$\text{٤} \quad \{24, 42, 12, 21\} = \text{د}$$

$$\text{٥} \quad \{34, 24, 14, 42, 32, 12\} = \text{هـ}$$

$$\text{٦} \quad \{34, 24, 23, 32, 31, 21\} = \text{و}$$

$$\text{أ} \cup \text{ب} = \{24, 42, 13, 31, 34, 43\}$$

رقم  
الأحاد



$$\{34, 14, 32, 12\} = S - H, \{24, 42\} = S \cap H,$$



$$\{14, 23, 32, 12, 41, 21\} = (S \cup H) = S \cap H,$$

مثال ١٥

في تجربة إلقاء حجر نرد مرتين متتاليتين وملاحظة العدد الذي يظهر على الوجه العلوي في الرميّتين ارسم شكلاً هندسيًا لفضاء العينة ثم اكتب كلاً من الأحداث الآتية موضعاً إياها على الشكل الهندسي لفضاء العينة :

- ١ حدث «الحصول على عددين مجموعهما فردي وأكبر من ٦».
  - ٢ حدث «الحصول على عددين أحدهما ٢ ومجموعهما أصغر من أو يساوي ٥».
  - ٣ حدث «الحصول على عددين الفرق المطلق بينهما يساوي ٢».
  - ٤ حدث «الحصول على عددين أكبرهما هو العدد ٢».
  - ٥ حدث «الحصول على العدد ٥ مرة واحدة على الأقل».
- بيّن هل الأحداث ١، ٢، ٣، ٤ متنافية أم لا.

الحل



$$\{(3, 6), (6, 1), (5, 2), (4, 3), (3, 4), (2, 5), (1, 6)\} = A$$

$$\{(6, 5), (5, 6), (6, 3), (5, 4), (4, 5),$$

$$\{(2, 1), (2, 3), (3, 2), (2, 2), (1, 2)\} = B$$

$$\{(3, 5), (2, 4), (1, 3)\} = C$$

$$\{(4, 2), (3, 1), (4, 6),$$

$$\{(6, 4), (5, 3),$$

$$\{(2, 2), (1, 2), (2, 1)\} = D$$

لاحظ أنه :

إذا كان الفرق المطلق بين عددين = ٢  
فإن العددين يمكن أن يكونا (٢، ٥)  
أو (٥، ٣) ، ...  
لأن :  $2 = |5 - 3| = |3 - 5|$

$$\{ (٤, ٥), (٣, ٥), (٢, ٥), (١, ٥) \} = ه$$

$$\{ (٥, ١), (٥, ٢), (٥, ٣), (٥, ٤), (٥, ٦), (٦, ٥), (٥, ٥),$$

$$\therefore \text{الحدثان } ١, ٢ \text{ متنافيان } \quad \emptyset = ١ \cap ٢$$

$$\therefore \text{الحدثان } ١, ٤ \text{ متنافيان } \quad \emptyset = ١ \cap ٤$$

$$\therefore \text{الأحداث } ١, ٢, ٤ \text{ غير متنافية } \quad \emptyset \neq ١ \cap ٢ \cap ٤$$

## مثال ١١

ألقيت قطعة نقود مرة واحدة. فإذا كان الوجه الظاهر يحمل كتابة فسوف يلقي حجر نرد مرة واحدة أما إذا كان يحمل صورة فسوف تلقي قطعة النقاد مرة ثانية. اكتب فضاء العينة ثم اكتب كلاً من الأحداث الآتية :

$$٢ \text{ حدث «ظهور صورة أو عدد أولى».$$

$$٤ \text{ حدث «ظهور كتابة وعدد مربع كامل».$$

$$٦ \text{ و حدث «عدم وقوع ح».$$

$$٨ \text{ ح حدث «وقوع ١, ٢ معاً».$$

$$١ \text{ ١ حدث «ظهور كتابة وعدد زوجي».$$

$$٣ \text{ ح حدث «ظهور كتابة على الأقل».$$

$$٥ \text{ ه حدث «ظهور صورة أو عدد أصغر من ٣».$$

$$٧ \text{ نر حدث «وقوع ١ وعدم وقوع ٤».$$

## الحل

باستخدام الشجرة البيانية المقابلة نجد أن :

$$ف = \{ (ص, ص), (ص, ل), (ل, ص), (ل, ل), (١, ل), (٢, ل), (٣, ل), (٤, ل), (٥, ل), (٦, ل) \}$$

$$\{ (٦, ل), (٥, ل), (٤, ل), (٣, ل), (٢, ل) \} = ١$$

$$\{ (٦, ل), (٤, ل), (٢, ل) \} = ٢$$

$$\{ (٢, ل), (ل, ص), (ص, ص) \} = ٣$$

$$\{ (٥, ل), (٣, ل), (١, ل) \} = ٤$$

$$\{ (٤, ل), (٣, ل), (٢, ل), (١, ل), (ل, ص) \} = ٥$$

$$\{ (٦, ل), (٥, ل) \} = ٦$$


$$\{ (٤, ل), (١, ل) \} = ٧$$

$$\{ (٢, ل), (١, ل), (ل, ص), (ص, ص) \} = ٨$$

$$\{ (ص, ص) \} = ح = ٩$$

$$\{ (٢, ل) \} = ١٠ \cap ٢ = ١١$$

$$\{ (٦, ل), (٢, ل) \} = ١١ - ١٠ = ١٢$$





أولاً أسئلة الاختيار من متعدد

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

- ① في تجربة اختيار أحد ارقام العدد ٢٦٣٤٥ عشوائياً فإن فضاء العينة هو .....
- (أ) {٢، ٣، ٤، ٥} (ب) {٢، ٦٣، ٤٥}
- (ج) {٢٦٣٤٥} (د) {٤، ٥، ٣، ٢، ٦}
- ② سحب بطاقة من مجموعة بطاقات مرقمة دون معرفة الأرقام المكتوبة على البطاقات يعبر عن .....
- (أ) تجربة عشوائية. (ب) ليست تجربة عشوائية.
- (ج) حدث مستحيل. (د) حدث مؤكد.
- ③ إذا رمز إلى إصابة الهدف بالرمز ص وعدم إصابته بالرمز خ وكانت تجربة التسديد على الهدف ٣ مرات على الأكثر بحيث نتوقف عن التسديد عند إصابة الهدف فإن فضاء العينة = .....
- (أ) {خ، خ، ص، (خ، خ، ص)، (خ، خ، ص)، (خ، خ، ص)}
- (ب) {ص، ص، ص، (ص، ص، ص)، (ص، ص، ص)، (ص، ص، ص)}
- (ج) {خ، خ، خ، (خ، خ، خ)، (خ، خ، خ)، (خ، خ، خ)}
- (د) {خ، خ، خ، (خ، خ، خ)، (خ، خ، خ)، (خ، خ، خ)}
- ④ في تجربة القاء ٣ قطع نقود متمايزة مرة واحدة وملاحظة تتابع ظهور الصور والكتابات فإن عدد عناصر فضاء العينة = .....
- (أ) ٨ (ب) ٣ (ج) ٢٧ (د) ٦٤
- ⑤ في تجربة إلقاء حيز نرد ٣ مرات متتاليه فإن عدد عناصر فضاء العينة = .....
- (أ) ٢٧ (ب) ٨١ (ج) ٣٦ (د) ٢١٦
- ⑥ في تجربة عشوائية ، صندوق به ٣ كرات متماثلة ومرقمة من ١ إلى ٣ سُحبت كرتان الواحدة بعد الأخرى مع إعادة الكرة المسحوبة قبل سحب الثانية وملاحظة حاصل ضرب العددين المكتوبين على الكرتين فإن عدد عناصر فضاء العينة = .....
- (أ) ٩ (ب) ٦ (ج) ١٢ (د) ٢٧

٧) في تجربة تكوين عدد مكون من ٣ أرقام مختلفة من مجموعة الأرقام {٦، ٥، ٠، ٣} فإن عدد عناصر فضاء العينة = .....

- (أ) ١٨ (ب) ٢٤ (ج) ٤٨ (د) ٦٤


٨) عند القاء حجر نرد ثلاث مرات وملاحظة عدد المرات التي يظهر فيها الرقم ٦ على الوجه العلوي فإن عدد عناصر فضاء العينة = .....

- (أ) ٢٦ (ب) ٣٦ (ج) ٣ (د) ٤


٩) في تجربة تصويب لاعب على المرمى عدة مرات تتوقف التجربة إذا أصاب الهدف مرتين أو أخطأ الهدف مرتين فإن عدد عناصر فضاء العينة = .....

- (أ) ٩ (ب) ٨ (ج) ٤ (د) ٦


١٠) أي من الأشكال الآتية يعبر الجزء المظلل فيه عن وقوع أي من الحدثين أ، ب دون الآخر .....




(د)



(ج)




(ب)




(أ)


١١) أي من الأشكال الآتية يعبر عن الجزء المظلل فيه عن  $A \cup B$  :




(د)



(ج)




(ب)



(أ)

١٢) إذا كان : أ، ب حدثان من فضاء العينة ف فإن الجزء المظلل بالشكل المقابل يعبر عن .....




(ب)  $A \cap B$

(أ)  $A \cup B$

(د)  $A \cap B$

(ج)  $A \cup B$

١٣) إذا كان : أ، ب حدثان من فضاء العينة ف فإن الجزء المظلل بالشكل المقابل يعبر عن .....




(ب)  $A \cap B$

(أ)  $A \cup B$

(د)  $(A \cap B) - (A \cup B)$

(ج)  $(A \cap B)$

١٤) إذا كان : أ، ب حدثان من فضاء العينة ف فإن الجزء المظلل بالشكل المقابل يعبر عن .....




(ب)  $A \cup B$

(أ)  $A - B$

(د)  $A$

(ج)  $A \cup B$

ف



١٥ في الشكل المقابل :

الجزء المظلل يعبر عن الحدث .....

- (أ) وقوع ٢ ، ب  
(ب) وقوع ١ ، ب ، أ ، كلاهما  
(ج) وقوع أحد الحدثين على الأقل.  
(د) وقوع أحد الحدثين على الأكثر.

١٦ إذا كان ١ ، ب حدثين من فضاء العينة لتجربة عشوائية فإن حدث عدم وقوع أى من الحدثين يساوى .....

- (أ)  $1 \cap 2$  (ب)  $1 - 2$  (ج)  $1 \cap 2$  (د)  $1 \cup 2$

١٧ إذا كان ١ ، ب حدثين متنافيين فإن  $1 - 2 =$  .....

- (أ) ١ (ب) ٢ (ج)  $1 - 2$  (د)  $\bar{1}$

١٨ إذا كان ١ ، ب حدثين من فضاء عينة لتجربة عشوائية فإن حدث وقوع ب فقط = .....

- (أ)  $1$  (ب)  $1 \cap 2$  (ج)  $1 - 2$  (د)  $2 - 1$

١٩  $1 \cup 2 =$  .....

- (أ)  $1 \cap 2$  (ب)  $1 \cup 2$  (ج)  $1 - 2$  (د)  $2 - 1$

٢٠  $1 - 2 =$  .....

- (أ)  $1 - 2$  (ب)  $1 \cup 2$  (ج)  $1 - 2$  (د)  $1 \cup 2 - 1$

٢١ إذا كان ١ ، ب حدثين من فضاء العينة لتجربة عشوائية فإن حدث وقوع ١ و ب معاً هو .....

- (أ)  $1 \cup 2$  (ب)  $1 \cap 2$  (ج)  $\emptyset$  (د)  $1 \cap 2$

٢٢ إذا كان : ف فضاء العينة لتجربة عشوائية ، ١ ، ب حدثان فيها فإن : ف -  $1 \cup 2$  هو .....

(أ) حدث عدم وقوع أى من الحدثين ١ ، ب

(ب) حدث وقوع الحدثين ١ ، ب

(ج) حدث عدم وقوع الحدثين ١ ، ب معاً

(د) حدث وقوع ١ ، ب

٢٣ عند سحب بطاقة من بين ١٠ بطاقات متماثلة ومرقمة من ١ إلى ١٠ فإن حدث ظهور عدد يقبل القسمة

على ٢ على البطاقة المسحوبة هو .....

- (أ)  $\{2, 6\}$  (ب)  $\{2, 4, 6, 8\}$

- (ج)  $\{2, 4, 6, 8, 10, 12\}$  (د)  $\{2, 4, 6, 8, 10\}$

٢٤ ألقى قطعة نقود مرتين متتاليتين ولوحت نتائج الصور والكتابات فإن حدث ظهور كتابة فى الرمية الأولى

هو .....

- (أ)  $\{(ص, ص)\}$  (ب)  $\{(ص, ص), (ص, ع), (ع, ص), (ع, ع)\}$

- (ج)  $\{(ص, ص), (ص, ع), (ع, ص), (ع, ع), (ع, ع), (ع, ع), (ع, ع)\}$

- (د)  $\{(ص, ص), (ص, ع), (ع, ص), (ع, ع)\}$

٢٥ إذا كان ١ حدث من فضاء العينة ف لتجربة عشوائية وكان :  $1 = 2$  فإن الحدث ١ هو .....


- (أ) حدث أولى. (ب) حدث مستحيل. (ج) حدث مؤكد. (د) نفسه الحدث ١

٢٦ في تجربة القاء حجرى نرد متمايزين وملاحظة العددين الظاهرين على الوجهين العلويين وإيجاد الفرق المطلق بينهما فإن الحدث المؤكد من الأحداث التالية هو .....

(أ) {١، ٢، ٣، ٤، ٥، ٦} (ب) {٠، ١، ٤، ٥، ٢، ٣}

(ج) {٠، ١، ٢، ٣، ٤} (د) الفرق المطلق عدد طبيعي أقل من أو يساوى ٦

رقم الأحاد رقم العشرات



٢٧ في تجربة تكوين عدد من رقمين مختلفين من مجموعة الأرقام

{٢، ٣، ٥} تم استخدام الشجرة البيانية المقابلة فإن

عدد عناصر الحدث «العدد الناتج عدد فردي» هو .....

(أ) ٦ (ب) ٣

(ج) ٤ (د) ٢

٢٨ في تجربة القاء حجر نرد مرة واحدة فإن أى من الأحداث الآتية هو حدث أولى ؟

(أ) حدث ظهور عدد أولى.

(ب) حدث ظهور عدد أكبر من أو يساوى ٥

(ج) حدث ظهور عدد أكبر من ٦

(د) حدث ظهور عدد زوجي له عاملان مختلفان فقط.

٢٩ ألقى حجر نرد فإذا حدث وكان العدد الظاهر على الوجه العلوي للحجر عدداً زوجياً فسوف تلقى قطعة

نقود مرة واحدة أما إذا كان العدد الظاهر فردياً فإن قطعة النقود سوف تلقى مرتين فإن عدد عناصر

فضاء العينة لتلك التجربة = .....

(أ) ١٢

(ب) ٣٦

(ج) ١٨

(د) ٢٤

## ثانياً الأسئلة المقالية

١ اكتب فضاء العينة لكل من التجارب العشوائية الآتية ، مبيّناً عدد عناصره :

١ سحب بطاقة من بين أربع بطاقات مرقمة بالأرقام من ٢ إلى ٥ وملاحظة الرقم المكتوب على البطاقة.

٢ اختيار عدد أولى ينحصر بين ١٠ ، ٢٠

٣ اشتراك الأهلى والزمالك والإسماعيلى في دورة ثلاثية وملاحظة :

أولاً : الفائز بها. ثانياً : ترتيب الفرق الثلاثة.

٤ إلقاء ثلاث قطع نقود متمايزة مرة واحدة وملاحظة تتابع ظهور الصور والكتابات.

٥ الحصول على عدد مكون من رقمين مختلفين من الأرقام ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤

٦ الحصول على عدد مكون من رقمين من الأرقام ٠ ، ١ ، ٢

٧ كيس به ٤ كرات واحدة حمراء والثانية بيضاء والثالثة سوداء والرابعة صفراء ، والتجربة هى سحب

كرتين واحدة بعد الأخرى وملاحظة لونهما :

أولاً : مع الإحلال (إرجاع الكرة الأولى قبل سحب الثانية). ثانياً : بدون إحلال.

- ٨ إلقاء حجر نرد مرة واحدة وملاحظة العدد الظاهر على الوجه العلوي فإذا ظهر عدد أقل من ٦ تُلقى قطعة نقود مرة واحدة ، وإذا ظهر العدد ٦ تُلقى قطعة نقود مرتين متتاليتين.
- ٩ إلقاء قطعة نقود ثم حجر نرد فيه وجهان يحملان الرقم ١ ، ووجهان يحملان الرقم ٢ ، ووجهان يحملان الرقم ٣ ، وملاحظة ما يظهر على وجهيهما العلويين.
- ١٠ إلقاء قطعة نقود ثلاث مرات متتالية وملاحظة عدد الصور.

٢ في تجربة إلقاء حجر نرد مرة واحدة وملاحظة العدد الظاهر على الوجه العلوي اكتب فضاء العينة في ثم عبر عن كل من الأحداث الآتية ، مبيناً أي هذه الأحداث بسيط وأيها مؤكد وأيها مستحيل :

- ١ أ حدث «ظهور الرقم ٤».
- ٢ ب حدث «عدم ظهور الرقم ٥».
- ٣ ح حدث «ظهور عدد أكبر من ٣».
- ٤ د حدث «ظهور عدد أصغر من ٨».
- ٥ هـ حدث «ظهور عدد يقبل القسمة على ٧».
- ٦ و حدث «ظهور عدد أولي».
- ٧ ز حدث «ظهور عدد فردي أولي».
- ٨ ل حدث «ظهور عدد زوجي أو أولي».
- ٩ ن حدث «ظهور عدد ليس مربعاً كاملاً».
- ١٠ س حدث «ظهور عدد يحقق المعادلة :  $s - 2 = 15$ ».
- ١١ ص حدث «ظهور عدد يحقق المتباينة :  $s \geq 4$ ».

٣ حقيبة بها ٢٠ بطاقة متماثلة ومرقمة من ١ إلى ٢٠ ، سحبت بطاقة واحدة عشوائياً ولوحظ العدد المسجل على البطاقة المسحوبة ، اكتب الأحداث الآتية :

- ١ أ حدث «العدد المسجل زوجي وأكبر من ١٠».
- ٢ ب حدث «العدد المسجل عامل من عوامل ١٢».
- ٣ ح حدث «العدد المسجل فردي ويقبل القسمة على ٣».
- ٤ د حدث «العدد المسجل مضاعف للعدد ٢ ، ٥».
- ٥ هـ حدث «العدد المسجل أولي».
- ٦ و حدث «العدد المسجل يحقق المتباينة :  $3 \leq s < 17$ ».

٤ في تجربة إلقاء حجر نرد مرة واحدة وملاحظة العدد الظاهر على الوجه العلوي ، اكتب فضاء العينة (ف) ثم عين كلاً من الأحداث الآتية :

- ١ أ حدث «ظهور عدد فردي».
- ٢ ب حدث «ظهور عدد أولي».
- ٣ ج حدث وقوع أ و ب معاً.
- ٤ د حدث وقوع أحدهما على الأقل.
- ٥ هـ حدث عدم وقوع أ فقط.
- ٦ و حدث وقوع أ فقط.
- ٧ ز حدث وقوع ب فقط.
- ٨ ح حدث وقوع أحدهما فقط.
- ٩ ط حدث وقوع أحدهما على الأكثر.

٥ في تجربة رمى قطعة نقود مرتين متتاليتين وملاحظة تتابع الصور والكتابات اكتب فضاء العينة ف ثم عبر عن كل من الأحداث الآتية :

- ١ أ حدث «الحصول على كتابة في الرمية الأولى».
- ٢ ب حدث «الحصول على كتابة في إحدى الرميتين فقط».
- ٣ ج حدث «الحصول على صورة في الرمية الأولى أو كتابة في الرمية الثانية».
- ٤ د حدث «عدم ظهور صورة».
- ٥ هـ حدث «ظهور نفس الشيء في الرميتين».
- ٦ و حدث «ظهور شيء مختلف في الرميتين».

٦ أقيت قطعة نقود مرتين متتاليتين ولوحظ تتابع الصور والكتابات ،

اكتب فضاء العينة لهذه التجربة ثم عيّن الأحداث التالية :

- ١ أ حدث «ظهور صورة واحدة بالضبط».
  - ٢ ب حدث «ظهور صورة على الأقل».
  - ٣ ج حدث «ظهور صورة على الأكثر».
  - ٤ د حدث «ظهور صورتين بالضبط».
  - ٥ هـ حدث «ظهور أكثر من صورتين».
- ثم وضح أيًا من هذه الأحداث يكون حدثًا أوليًا (بسيطًا).

٧ عند إلقاء قطعة نقود عدة مرات وتوقفت التجربة عند ظهور صورة أو ٣ كتابات

اكتب فضاء النواتج ثم عيّن الأحداث الآتية :

- ١ أ حدث «ظهور صورة على الأكثر».
- ٢ ب حدث «ظهور صورة على الأقل».
- ٣ ج حدث «ظهور كتابتين على الأقل».
- ٤ د حدث «ظهور صورتين على الأقل».

٨ من مجموعة الأرقام { ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ } كوّن عدداً من رقمين مختلفين.

مثّل فضاء النواتج ف بشكل شجرة ، ثم اكتب ف و عيّن منها الأحداث الآتية :

- ١ أ حدث «أن يكون رقم الآحاد فردياً».
- ٢ ب حدث «أن يكون رقم العشرات فردياً».
- ٣ ج حدث «أن يكون كلا الرقمين فردياً».
- ٤ د حدث «أن يكون رقم الآحاد أو رقم العشرات فردياً».
- ٥ هـ حدث «مجموعة الأعداد التي بها الآحاد ضعف العشرات».

٩ حقيبة بها ٣ كرات حمراء ، ٣ كرات بيضاء. سحبت منها عشوائياً ٣ كرات الواحدة بعد الأخرى بدون إحلال.

اكتب فضاء العينة ثم اكتب الأحداث الآتية :

- ١ أ حدث «الحصول على كرتين حمراوين على الأقل».

٢) حدث «الحصول على كرتين بيضاوين على الأكثر».

٣) حدث «الحصول على كرتين بالضبط من لون واحد».

٤)  $\bar{A} \cap \bar{B}$       ٥)  $A \cap B$       ٦)  $A - B$

١٢) سحب بطاقة واحدة بعد الأخرى من بين ٨ بطاقات متماثلة ومرقمة من ١ إلى ٨ مع إعادة البطاقة المسحوبة

أولاً قبل سحب البطاقة الثانية ، ما عدد عناصر فضاء العينة ؟ وإذا كان :

١) حدث «العدد في السحبة الثانية ثلاثة أمثال العدد في السحبة الأولى».

٢) حدث «مجموع العددين أكبر من ١٣».

اكتب كلاً من ١ ، ٢ هل ١ ، ٢ حدثان متنافيان ؟ فسر ذلك.

١٣) في تجربة إلقاء حجر نرد مرتين متتاليتين وملاحظة العدد الظاهر على الوجه العلوي في كل مرة

ارسم شكلاً هندسياً لفضاء العينة ف ووضح عليه كلاً من الأحداث الآتية :

١) حدث «ظهور العدد ٣ في الرمية الأولى».

٢) حدث «ظهور العدد ٣ في الرمية الثانية».

٣) حدث «ظهور العدد ٣ في أى من الرميتين».

٤) حدث «ظهور عدد في الرمية الأولى يزيد ٢ عن العدد في الرمية الثانية».

٥) حدث «ظهور عدد في الرمية الثانية يزيد ١ عن العدد في الرمية الأولى».

١٤) ألقى حجر نرد مرتين متتاليتين ولوخط العدد الظاهر على الوجه العلوي في كل مرة.

عين كلاً من الأحداث الآتية :

١) حدث «مجموع العددين ٨».

٢) حدث «مجموع العددين ١٠».

٣) حدث «المجموع ٨ أو ١٠».

٤) حدث «المجموع ١٥».

٥) حدث «ظهور عددين متساويين».

١٥) في تجربة إلقاء حجرى نرد متمايزين وملاحظة العددين الظاهرين على الوجهين العلويين.

اكتب كلاً من الأحداث الآتية :

١) حدث «الفرق المطلق بين العددين الظاهرين = ٣».

٢) حدث «مجموع العددين الظاهرين يساوى ١٠ على الأقل».

٣) حدث «أصغر العددين الظاهرين = ٤».

٤)  $A \cap B$       ٥)  $A \cap \bar{B}$

٦) أ، حدث «أكبر العددين الظاهرين  $\geq 3$ ».

٧) أ، حدث «أكبر العددين الظاهرين  $\leq 5$ ».

وضح كلاً من أ، ب، ج، د، هـ على الشكل الهندسي لفضاء العينة ف

١٤ ألقى قطعاً نقود ثم حجر نرد ولو حظ الوجه العلوي لقطعة النقود والعدد الظاهر على الوجه العلوي لحجر النرد، مثل فضاء العينة بشكل شجري ثم أوجد الأحداث الآتية :

١) حدث «ظهور كتابة وعدد زوجي».

٢) حدث «ظهور صورة وعدد فردي».

٣) حدث «وقوع الحدث أ ووقوع الحدث ب».

٤) حدث «وقوع الحدث أ فقط».

٥) حدث «عدم وقوع أ أو عدم وقوع ب».

١٥ عند إلقاء قطعة نقود إذا كان الناتج صورة فسوف تلقى قطعة النقود مرة ثانية وتتوقف التجربة ، أما إذا كان الناتج كتابة في المرة الأولى فسوف يلقي حجر نرد مرة واحدة. اكتب فضاء العينة لتلك التجربة ثم اكتب كلاً من الأحداث الآتية :

١) حدث «ظهور كتابة وعدد زوجي».

٢) حدث «ظهور صورة واحدة على الأقل».

٣) حدث «ظهور كتابة وعدد أولي».





## الدرس 2

### مسلمات وقوانين الاحتمال - حساب الاحتمال

إذا كان لدينا فضاء عينة لتجربة عشوائية ما (ف) فإنه يمكننا تعريف مجموعة من الأحداث على هذا الفضاء ، ونستطيع أن نعبر عن مدى إمكانية وقوع أى حدث منها بصورة عددية بما يسمى احتمال الحدث ، وهو يحقق المسلمات الثلاث الآتية :

#### مسلمات الاحتمال

١ لكل حدث  $A \subset \Omega$  ف يوجد عدد حقيقى يسمى احتمال الحدث  $A$  ويرمز له بالرمز  $P(A)$  حيث :  $0 \leq P(A) \leq 1$

أى أن  $P(A) \in [0, 1]$

٢  $P(\Omega) = 1$  أى أن احتمال وقوع الحدث المؤكد = ١

٣ إذا كان  $A, B$  حدثين متنافيين من فضاء العينة ف فإن :  $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$  ويمكن تعميم هذه القاعدة لعدة أحداث متنافية (مثلى مثلى)  $A_1, A_2, \dots, A_n$  ، .....  $A_n$  فيكون :

$$P(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n) = P(A_1) + P(A_2) + \dots + P(A_n)$$

#### نتائج هامة

أى أن احتمال وقوع الحدث المستحيل = صفر

١  $P(\emptyset) = 0$  = صفر

٢ حيث  $A$  هو الحدث المكمل للحدث  $B$   $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$











٣  $P(\bar{A} \cup B) = P(\bar{A}) + P(B) - P(\bar{A} \cap B)$

حيث  $A, B$  ، أى حدثين من فضاء العينة ف (ليسا بالضرورة حدثين متنافيين)

٤  $P(\bar{A} \cap B) = P(B) - P(A \cap B)$

٥ إذا كان  $A \subset B$  فإن :  $P(A) \leq P(B)$  حيث  $A, B$  حدثان من نفس فضاء العينة.

الجدول الآتي يلخص لنا احتمالات بعض الأحداث ، كما يوضح التعبير اللفظي عنها وتمثيلها بشكل فن :

تمثيل الحدث بشكل فن	التعبير عنه لفظياً	احتمال الحدث
<p>ف</p> 	* احتمال وقوع الحدث المؤكد = ١	ل (ف)
<p>ف</p> 	* احتمال وقوع الحدث المستحيل = صفر	ل (∅)
<p>ف</p> 	* احتمال وقوع الحدث ؟	ل (أ)
<p>ف</p> 	* احتمال الحدث المكمل للحدث ؟ * احتمال عدم وقوع الحدث ؟	ل (أ) = ل (ف - أ)
<p>ف</p> 	* احتمال وقوع أ ، ب معاً.	ل (أ ∩ ب)
<p>ف</p> 	* احتمال وقوع أ أو ب أو كليهما. * احتمال وقوع أحدهما على الأقل. * احتمال وقوع أي من الحدثين.	ل (أ ∪ ب)
<p>ف</p> 	* احتمال وقوع أ وعدم وقوع ب * احتمال وقوع أ فقط.	ل (أ - ب) = ل (أ ∩ ب̄)
<p>ف</p> 	* احتمال عدم وقوع الحدثين معاً. * احتمال وقوع أحدهما على الأكثر.	ل (أ ∪ ب) = ل (ب̄ ∩ أ̄)
<p>ف</p> 	* احتمال عدم وقوع أي من الحدثين. * احتمال عدم وقوع أ وعدم وقوع ب	ل (أ ∩ ب) = ل (أ̄ ∪ ب̄)
<p>ف</p> 	* احتمال وقوع ب أو عدم وقوع أ * احتمال عدم وقوع أ فقط.	ل (أ ∪ ب) = ل (ب - أ)



\* احتمال وقوع أحد الحدثين دون الآخر.  
\* احتمال وقوع أحد الحدثين فقط.

$$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$$

### حساب الاحتمال

إذا كان ف فضاء عينة لتجربة عشوائية ما جميع نواتجها (الأحداث الأولية) متساوية الإمكانات ، فإن احتمال وقوع أي حدث  $A \subset F$  يعطى بالقانون :

$$P(A) = \frac{\text{عدد النواتج التي تؤدي إلى وقوع الحدث } A}{\text{عدد جميع النواتج الممكنة}}$$

أي أن  $P(A) = \frac{\text{عدد عناصر } A}{\text{عدد عناصر } F}$


فمثلاً :

إذا كان لدينا صندوق به ٢٤ تفاحة منها ٤ تفاحات تالفة وسحبنا من الصندوق تفاحة واحدة بطريقة عشوائية ، فإن احتمال أن تكون التفاحة المسحوبة تالفة =  $\frac{\text{عدد التفاحات التالفة}}{\text{عدد التفاحات في الصندوق}}$   
∴ ل (التفاحة المسحوبة تالفة) =  $\frac{4}{24} = \frac{1}{6}$

### ملاحظات :


- ١ في أي تجربة عشوائية تعتمد على إلقاء حجر نرد أو قطعة نقود فإننا نعتبر أن حجر النرد أو قطعة النقود منتظمة تماماً ما لم ينص على خلاف ذلك.
- ٢ في أي تجربة عشوائية تعتمد على اختيار عنصر من مجموعة بها عدد محدود من العناصر فإننا نعتبر أن الاختيار يتم بطريقة عشوائية أي أن جميع عناصر فضاء العينة ف يكون لها قيم احتمالية متساوية (نفس فرص الحدوث).

### ملاحظات هامة عند حل المسائل



١ إذا كان  $A \subset B$  فإن :

$$\begin{aligned} n(A \cup B) &= n(B) & n(A \cap B) &= n(A) \\ n(A - B) &= 0 & n(A - B) &= n(A) - n(A \cap B) \end{aligned}$$



٢ إذا كان  $A$  ،  $B$  حدثين متنافيين فإن :

$$\begin{aligned} n(A \cup B) &= n(A) + n(B) & n(A \cap B) &= 0 \\ n(A - B) &= n(A) & n(B - A) &= n(B) \end{aligned}$$

٣ إذا كان  $J(A) = J(B)$  فإن  $J\left(\frac{1}{A}\right) = J\left(\frac{1}{B}\right)$

وبصفة عامة : إذا كان  $J\left(\frac{A}{B}\right) = \frac{J(A)}{J(B)}$

$$\therefore J\left(\frac{A}{A+B}\right) = \frac{J(A)}{J(A+B)}$$

٤ قانونا «دي مورجان» :

$$\overline{(A \cup B)} = \overline{A} \cap \overline{B} , \quad \overline{(A \cap B)} = \overline{A} \cup \overline{B}$$

ولذلك نجد أن :

$$J(\overline{(A \cup B)}) = J(\overline{A} \cap \overline{B}) = J(\overline{A}) \cdot J(\overline{B}) = (1 - J(A)) \cdot (1 - J(B))$$

$$J(\overline{(A \cap B)}) = J(\overline{A} \cup \overline{B}) = J(\overline{A}) + J(\overline{B}) - J(\overline{A} \cap \overline{B}) = (1 - J(A)) + (1 - J(B)) - (1 - J(A \cap B))$$

٥ لاحظ الفرق بين التعبيرات الآتية :

$$* \text{ احتمال عدم وقوع } A \text{ أو عدم وقوع } B \Leftrightarrow J(\overline{(A \cup B)})$$

$$* \text{ احتمال عدم وقوع } A \text{ أو وقوع } B \Leftrightarrow J(\overline{A} \cup B)$$

\* احتمال عدم وقوع (A أو B)  $\Leftrightarrow J(\overline{(A \cup B)})$  «باقي التعبيرات اللفظية راجع الجدول السابق»

$$٦ \quad \overline{A} - \overline{B} = \overline{A} \cap B = \overline{(A \cap \overline{B})} = \overline{A} - (A \cap \overline{B})$$

ولذلك نجد أن :

$$J(\overline{A} - \overline{B}) = J(\overline{A} \cap B) = J(\overline{A}) \cdot J(B) = (1 - J(A)) \cdot J(B)$$

$$J(\overline{(A \cap \overline{B})}) = J(\overline{A} \cup B) = J(\overline{A}) + J(B) - J(\overline{A} \cap B) = (1 - J(A)) + J(B) - (1 - J(A)) \cdot J(B)$$

$$* J(\overline{(A \cup B)}) = J(\overline{A} \cap \overline{B}) = (1 - J(A)) \cdot (1 - J(B))$$

٧ من الشكل المقابل نجد أن :

$$J(\overline{(A \cap B)}) = J(\overline{A} \cup \overline{B}) = J(\overline{A}) + J(\overline{B}) - J(\overline{A} \cap \overline{B}) = (1 - J(A)) + (1 - J(B)) - (1 - J(A \cap B))$$

$$= 1 - J(A) - J(B) + J(A \cap B) + 1 - 1 + J(A \cap B) = 2 - J(A) - J(B) + 2J(A \cap B)$$

$$= 1 - J(A) - J(B) + J(A \cap B) + 1 - 1 + J(A \cap B) = 1 - J(A) - J(B) + 2J(A \cap B)$$

$$* J(\overline{(A \cup B)}) = J(\overline{A} \cap \overline{B}) = (1 - J(A)) \cdot (1 - J(B))$$

$$٨ \quad J(\overline{(A \cap B)}) = J(\overline{A} \cup \overline{B}) = J(\overline{A}) + J(\overline{B}) - J(\overline{A} \cap \overline{B}) = (1 - J(A)) + (1 - J(B)) - (1 - J(A \cap B))$$

$$* J(\overline{(A \cap B)}) = J(\overline{A} \cup \overline{B}) = J(\overline{A}) + J(\overline{B}) - J(\overline{A} \cap \overline{B}) = (1 - J(A)) + (1 - J(B)) - (1 - J(A \cap B))$$

$$= 1 - J(A) - J(B) + J(A \cap B) + 1 - 1 + J(A \cap B) = 2 - J(A) - J(B) + 2J(A \cap B)$$

٩ يمكنك دائماً حل مسائل الاحتمالات باستخدام أشكال فن بجانب القوانين والجدول السابقين.

مثال ١

إذا كان س، ص حدثين من فضاء عينة ف وكان: ل (س) = ٠,٣٥، ل (ص) = ٠,٤٨، ل (س ∩ ص) = ٠,٠٦،

فأوجد:

ل (س ∩ ص)	ل (س ∪ ص)	ل (س̄ ∩ ص̄)
ل (س ∩ ص̄)	ل (س̄ ∩ ص)	ل (س̄ ∪ ص̄)

الحل

ل (س̄) = ١ - ل (س) = ١ - ٠,٣٥ = ٠,٦٥، ل (ص̄) = ١ - ل (ص) = ١ - ٠,٤٨ = ٠,٥٢

ل (س ∪ ص) = ل (س) + ل (ص) - ل (س ∩ ص) = ٠,٣٥ + ٠,٤٨ - ٠,٠٦ = ٠,٧٧

ل (س ∩ ص̄) = ل (س) - ل (س ∩ ص) = ٠,٣٥ - ٠,٠٦ = ٠,٢٩

ل (س̄ ∩ ص) = ل (ص) - ل (س ∩ ص) = ٠,٤٨ - ٠,٠٦ = ٠,٤٢

ل (س̄ ∩ ص̄) = ل (س̄ ∪ ص̄) - ل (س̄ ∩ ص) - ل (س ∩ ص̄) = ١ - ٠,٤٢ - ٠,٢٩ = ٠,٢٩

ل (س̄ ∪ ص̄) = ١ - ل (س ∩ ص) = ١ - ٠,٠٦ = ٠,٩٤

ل (س̄ ∪ ص) = ل (س̄ ∩ ص) + ل (س ∩ ص) = ٠,٤٢ + ٠,٠٦ = ٠,٤٨

مثال ٢

إذا كان أ، ب حدثين من فضاء عينة لتجربة عشوائية وكان ل (أ) = ١/٦، ل (ب) = ١/٨، ل (أ ∩ ب) = ١/١٦

ل (أ ∪ ب) = ١/٨ + ١/٦ - ١/١٦ = ١/٤

أوجد:

ل (أ ∩ ب̄)	ل (أ ∪ ب̄)	ل (أ̄ ∩ ب̄)
ل (أ̄ ∩ ب)	ل (أ̄ ∪ ب)	ل (أ̄ ∪ ب̄)

ل (أ) = ١/٦

ل (ب) = ١/٨

ل (أ ∩ ب) = ١/١٦

ل (أ ∩ ب̄) = ل (أ) - ل (أ ∩ ب) = ١/٦ - ١/١٦ = ١/٨

ل (أ̄ ∩ ب) = ل (ب) - ل (أ ∩ ب) = ١/٨ - ١/١٦ = ١/١٦

ل (أ̄ ∩ ب̄) = ل (أ̄ ∪ ب̄) - ل (أ̄ ∩ ب) - ل (أ ∩ ب̄) = ١ - ١/١٦ - ١/٨ = ١١/١٦

ل (أ̄ ∪ ب̄) = ١ - ل (أ ∩ ب) = ١ - ١/١٦ = ١٥/١٦

## مثال ٣

إذا كان  $A$ ،  $B$  حدثين من فضاء عينة لتجربة عشوائية وكان  $P(A) = \frac{1}{4}$ ،  $P(B) = \frac{1}{3}$ ،  $P(A \cap B) = \frac{1}{12}$  أوجد قيمة  $P(\bar{A})$  إذا كان:

١  $A$ ،  $B$  حدثين متنافيين. ٢  $A \supset B$  ٣  $P(\bar{A} \cap \bar{B}) = \frac{1}{12}$

## الحل

$P(\bar{A}) = P(\bar{A} \cap B) + P(\bar{A} \cap \bar{B})$  ١  $P(\bar{A}) = P(\bar{A} \cap B) + P(\bar{A} \cap \bar{B})$  ٢  $P(\bar{A}) = P(\bar{A} \cap B) + P(\bar{A} \cap \bar{B})$  ٣

$\frac{1}{4} = P(\bar{A} \cap B) + P(\bar{A} \cap \bar{B})$  ١  $\frac{1}{4} = P(\bar{A} \cap B) + P(\bar{A} \cap \bar{B})$  ٢  $\frac{1}{4} = P(\bar{A} \cap B) + P(\bar{A} \cap \bar{B})$  ٣

$\frac{1}{4} = P(\bar{A} \cap B) + P(\bar{A} \cap \bar{B})$  ١  $\frac{1}{4} = P(\bar{A} \cap B) + P(\bar{A} \cap \bar{B})$  ٢  $\frac{1}{4} = P(\bar{A} \cap B) + P(\bar{A} \cap \bar{B})$  ٣

$\frac{1}{4} = P(\bar{A} \cap B) + P(\bar{A} \cap \bar{B})$  ١  $\frac{1}{4} = P(\bar{A} \cap B) + P(\bar{A} \cap \bar{B})$  ٢  $\frac{1}{4} = P(\bar{A} \cap B) + P(\bar{A} \cap \bar{B})$  ٣

$\frac{1}{4} = P(\bar{A} \cap B) + P(\bar{A} \cap \bar{B})$  ١  $\frac{1}{4} = P(\bar{A} \cap B) + P(\bar{A} \cap \bar{B})$  ٢  $\frac{1}{4} = P(\bar{A} \cap B) + P(\bar{A} \cap \bar{B})$  ٣

## مثال ٤

إذا كان  $A$ ،  $B$  حدثين من فضاء عينة وكان  $P(A) = 0.5$ ،  $P(B) = 0.6$ ،  $P(A \cap B) = 0.4$  أوجد:

- ١ احتمال وقوع أحد الحدثين على الأقل. ٢ احتمال وقوع أحد الحدثين على الأكثر.  
 ٣ احتمال وقوع الحدث  $B$  وعدم وقوع الحدث  $A$  ٤ احتمال عدم وقوع الحدث  $A$   
 ٥ احتمال عدم وقوع أي من الحدثين. ٦ احتمال وقوع أحد الحدثين دون الآخر.

## الحل

١ احتمال وقوع أحد الحدثين على الأقل  $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = 0.5 + 0.6 - 0.4 = 0.7$  ٢

$0.7 = 0.5 + 0.6 - 0.4 = 0.7$

٢ احتمال وقوع أحد الحدثين على الأكثر  $P(\bar{A} \cap \bar{B}) = 1 - P(A \cup B) = 1 - 0.7 = 0.3$  ٣

٣ احتمال وقوع الحدث  $B$  وعدم وقوع الحدث  $A$   $P(B \cap \bar{A}) = P(B) - P(A \cap B) = 0.6 - 0.4 = 0.2$  ٤

$0.2 = 0.6 - 0.4 = 0.2$

٤ احتمال عدم وقوع الحدث  $A$   $P(\bar{A}) = 1 - P(A) = 1 - 0.5 = 0.5$  ٥

٥ احتمال عدم وقوع أي من الحدثين  $P(\bar{A} \cap \bar{B}) = 1 - P(A \cup B) = 1 - 0.7 = 0.3$  ٦

٦ احتمال وقوع أحد الحدثين دون الآخر  $P(\bar{A} \cap B) = P(B) - P(A \cap B) = 0.6 - 0.4 = 0.2$  ٧

$0.2 = 0.6 - 0.4 = 0.2$

مثال ٥

ألقي حجر نرد منتظم مرة واحدة. أوجد احتمالات الأحداث الآتية :

- ١ حدث « الحصول على العدد ٣ ».  
 ٢ حدث « الحصول على عدد أكبر من ٤ ».  
 ٣ حدث « الحصول على عدد زوجي ».  
 ٤ حدث « الحصول على عدد أولي ».  
 ٥ حدث « الحصول على عدد زوجي وأولي ».  
 ٦ حدث « الحصول على عدد زوجي أو أولي ».

الحل

$$F = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

$$P_1 = \{3\}$$

$$P_2 = \{6, 5\}$$

$$P_3 = \{6, 4, 2\}$$

$$P_4 = \{5, 3, 2\}$$

$$P_5 = P_4 \cap P_3 = \{2\}$$

$$P_6 = P_4 \cup P_3 = \{6, 5, 4, 3, 2\}$$

$$P_1 = F \Rightarrow \frac{1}{6}$$

$$P_2 = F \Rightarrow \frac{1}{6}$$

$$P_3 = F \Rightarrow \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

$$P_4 = F \Rightarrow \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

$$P_5 = F \Rightarrow \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

$$P_6 = F \Rightarrow \frac{5}{6}$$

$$P_7 = F \Rightarrow \frac{5}{6}$$

$$P_8 = \frac{1}{6} - \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = (P_4 \cap P_3) \cup P_2 = (P_4 \cup P_3) \cup P_2 = P_6 \cup P_2 = F \Rightarrow \frac{5}{6}$$

مثال ٦

ألقيت قطعة نقود منتظمة مرتين متتاليتين. أوجد احتمالات الأحداث الآتية :

- ١ حدث « الحصول على صورة في كل من الرمييتين ».  
 ٢ حدث « الحصول على كتابة واحدة على الأكثر ».  
 ٣ حدث « الحصول على كتابة واحدة على الأقل ».  
 ٤ حدث « الحصول على صورة واحدة فقط ».

الحل

$$F = \{(ص، ص)، (ص، ل)، (ل، ص)، (ل، ل)\}$$

$$P_1 = F \Rightarrow \frac{1}{4}$$

$$P_2 = \{(ص، ص)\} \Rightarrow \frac{1}{4}$$

$$P_3 = F \Rightarrow \frac{3}{4}$$

$$P_4 = \{(ص، ل)، (ل، ص)\} \Rightarrow \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$$

$$P_5 = F \Rightarrow \frac{3}{4}$$

$$P_6 = \{(ل، ل)، (ل، ص)، (ص، ل)\} \Rightarrow \frac{3}{4}$$

$$P_7 = \frac{1}{4} = \frac{1}{4} = \frac{1}{4}$$

$$P_8 = \{(ص، ل)، (ل، ص)\} \Rightarrow \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$$

## مثال ٧

سحبت بطاقة عشوائياً من بين ٣٠ بطاقة مرقمة بالأرقام من ١ إلى ٣٠. أوجد احتمالات الأحداث الآتية :

- ١] البطاقة المسحوبة تحمل عدداً يقبل القسمة على ٥
- ٢] البطاقة المسحوبة تحمل عدداً يقبل القسمة على ٧
- ٣] البطاقة المسحوبة تحمل عدداً يقبل القسمة على ٥ ، ٧
- ٤] البطاقة المسحوبة تحمل عدداً يقبل القسمة على ٥ ، ٧
- ٥] البطاقة المسحوبة تحمل عدداً مربعاً كاملاً.

## الحل

$$\begin{aligned}
 & \text{ف} = \{ ١ , ٢ , ٣ , ٤ , \dots , ٣٠ \} \\
 & \text{١] } \{ ٥ , ١٠ , ١٥ , ٢٠ , ٢٥ , ٣٠ \} \\
 & \text{٢] } \{ ٧ , ١٤ , ٢١ , ٢٨ \} \\
 & \text{٣] } \emptyset = \{ \text{أى أن } ٧ , ٥ \text{ حدثان متنافيان} \} \\
 & \text{٤] } \{ ٥ , ٧ , ١٠ , ١٤ , ١٥ , ٢٠ , ٢١ , ٢٨ , ٣٠ \} \\
 & \text{٥] } \{ ١ , ٤ , ٩ , ١٦ , ٢٥ \} \\
 & \text{١] } \frac{١}{٥} = \frac{٦}{٣٠} = (١٤) \text{ ل} \\
 & \text{٢] } \frac{٢}{٣٠} = \frac{٤}{١٥} = (٢٤) \text{ ل} \\
 & \text{٣] } \frac{٠}{٣٠} = (٠) \text{ ل} \\
 & \text{٤] } \frac{١}{٣} = \frac{٢}{١٥} + \frac{١}{٥} = (٢٤) \text{ ل} + (١٤) \text{ ل} = (٤٨) \text{ ل} \\
 & \text{٥] } \frac{١}{٦} = \frac{٥}{٣٠} = (٥) \text{ ل}
 \end{aligned}$$

## مثال ٨

كيس يحتوى على ٩ كرات متماثلة « ٤ بيضاء ، ٣ حمراء ، ٢ سوداء ». سحبت كرة عشوائياً عن الكيس. احسب احتمالات الأحداث الآتية :

- ١] حدث « الكرة المسحوبة بيضاء ».
- ٢] حدث « الكرة المسحوبة حمراء ».
- ٣] حدث « الكرة المسحوبة سوداء ».
- ٤] حدث « الكرة المسحوبة بيضاء أو سوداء ».
- ٥] حدث « الكرة المسحوبة ليست سوداء ».
- ٦] حدث « الكرة المسحوبة بيضاء أو حمراء أو سوداء ».

## الحل

حيث إن السحب يتم عشوائياً لذلك فإن الكرات التسع فى الكيس تكون لها نفس القيم الاحتمالية وعلى ذلك فإن :

$$\begin{aligned}
 & \text{١] } \frac{٤}{٩} = \frac{\text{عدد الكرات البيضاء}}{\text{عدد الكرات بالكيس}} = (١٤) \text{ ل} \\
 & \text{٢] } \frac{١}{٣} = \frac{٣}{٩} = \frac{\text{عدد الكرات الحمراء}}{\text{عدد الكرات بالكيس}} = (٢٤) \text{ ل}
 \end{aligned}$$



$$\frac{2}{9} = \frac{\text{عدد الكرات السوداء}}{\text{عدد الكرات بالكيس}} = \text{ل (٢)} \quad \text{٣}$$

$$\frac{2}{9} = \frac{7}{9} = \frac{2+4}{9} = \frac{\text{عدد الكرات البيضاء والسوداء}}{\text{عدد الكرات بالكيس}} = \text{ل (٤)} \quad \text{٤}$$

$$\frac{7}{9} = \frac{3+4}{9} = \frac{\text{عدد الكرات غير السوداء}}{\text{عدد الكرات بالكيس}} = \text{ل (٥)} \quad \text{٥}$$

لاحظ أن

$$\frac{7}{9} = \frac{2}{9} - 1 = \text{ل (٢)} - 1 = \text{ل (٥)} \quad \therefore \text{ل (٥)} = \text{ل (٢)} - 1$$

$$1 = \frac{9}{9} = \frac{\text{عدد الكرات البيضاء والحمراء والسوداء}}{\text{عدد الكرات بالكيس}} = \text{ل (٦)} \quad \text{٦}$$

### مثال ٩

يوجه صيادان نيرانهما إلى ثعلب ، فإذا كان احتمال أن يصيب الأول الثعلب هو  $\frac{1}{4}$  واحتمال أن يصيب الثاني الثعلب هو  $\frac{2}{3}$  واحتمال أن يصيب الاثنان معاً الثعلب هو  $\frac{1}{3}$  فأوجد :

١ احتمال إصابة الثعلب. ٢ احتمال عدم إصابة الثعلب.

٣ احتمال أن يصيب الصياد الأول وحده الثعلب.

٤ احتمال إصابة الثعلب من الصياد الثاني فقط.

٥ احتمال إصابة الثعلب من أحدهما فقط.

٦ احتمال إصابة الثعلب من أحدهما على الأكثر.

### الحل

بفرض أن  $A$  هو حدث أن يصيب الأول الثعلب  $\therefore \text{ل (٢)} = \frac{1}{4}$

$B$  هو حدث أن يصيب الثاني الثعلب  $\therefore \text{ل (٣)} = \frac{2}{3}$

فيكون  $A \cap B$  هو حدث أن يصيب الاثنان معاً الثعلب  $\therefore \text{ل (٤)} = \frac{1}{3}$

$$\text{١ احتمال إصابة الثعلب} = \text{ل (٢)} \cup \text{ل (٣)} = \text{ل (٢)} + \text{ل (٣)} - \text{ل (٤)} = \frac{1}{4} + \frac{2}{3} - \frac{1}{3} = \frac{5}{12}$$

$$\text{٢ احتمال عدم إصابة الثعلب} = 1 - \text{ل (٢)} \cup \text{ل (٣)} = 1 - \frac{5}{12} = \frac{7}{12}$$

$$\text{٣ احتمال أن يصيب الصياد الأول وحده الثعلب} = \text{ل (٢)} - \text{ل (٤)} = \frac{1}{4} - \frac{1}{3} = \frac{1}{12}$$

$$\text{٤ احتمال إصابة الثعلب من الصياد الثاني فقط} = \text{ل (٣)} - \text{ل (٤)} = \frac{2}{3} - \frac{1}{3} = \frac{1}{3}$$

$$\text{٥ احتمال إصابة الثعلب من أحدهما فقط} = \text{ل (٢)} - \text{ل (٤)} + \text{ل (٣)} - \text{ل (٤)} = \frac{1}{4} + \frac{1}{3} = \frac{7}{12}$$

$$\text{٦ احتمال إصابة الثعلب من أحدهما على الأكثر} = \text{ل (٢)} \cup \text{ل (٣)} = \frac{5}{12} = \frac{5}{12} - 1 = \frac{7}{12}$$

## مثال ١٥

صُمم حجر نرد بحيث كانت احتمالات ظهور الأعداد الفردية متساوية واحتمالات ظهور الأعداد الزوجية متساوية وكان احتمال ظهور أى عدد زوجى ضعف احتمال ظهور أى عدد فردى فإذا ألقى هذا الحجر مرة واحدة. أوجد احتمال ظهور كل من الأعداد الستة للترد ثم احسب احتمال كل من الحدثين الآتيين :

١ حدث «الحصول على عدد أولى».

٢ حدث «الحصول على عدد  $\leq 3$ ».

## الحل

فضاء العينة ف = {١، ٢، ٣، ٤، ٥، ٦}

$$\therefore 1 = P(1) + P(2) + P(3) + P(4) + P(5) + P(6)$$

وبفرض أن :  $P(1) = P(2) = P(3) = P(4) = P(5) = P(6) = s$

$$\therefore 1 = 6s$$

$$\therefore s = \frac{1}{6}$$

$$\therefore s = \frac{1}{6}$$

$$\therefore P(1) = P(2) = P(3) = P(4) = P(5) = P(6) = \frac{1}{6}$$

$$\therefore P(1) = \frac{1}{6}$$

$$\therefore P(2) = \frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

$$\therefore P(3) = \frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$$

$$\therefore P(4) = \frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{5}{6}$$

## لاحظ أنه

اصطلح على التعبير عن الحدث ل {و} بالصورة ل (و) ففى المثال السابق ل {١} = ل (١) ، ل {٢} = ل (٢) وهكذا .....

## مثال ١١

تقدم ٥٠ شخصاً للاختبار لشغل إحدى الوظائف فوجد أن ٣٥ شخصاً يجيدون الإنجليزية ، ٢٠ شخصاً يجيدون الفرنسية ، ١٥ شخصاً يجيدون اللغتين الإنجليزية والفرنسية معاً فإذا اختير أحد المتقدمين عشوائياً فاحسب احتمالات الأحداث الآتية :

١ حدث «الشخص المختار يجيد إحدى اللغتين على الأقل».

٢ حدث «الشخص المختار لا يجيد أيّاً من اللغتين».


٣ حدث «الشخص المختار يجيد الإنجليزية فقط».

٤ حدث «الشخص المختار يجيد إحدى اللغتين فقط».

٥ حدث «الشخص المختار يجيد لغة واحدة على الأكثر من الإنجليزية والفرنسية».

∴ عدد الأشخاص الذين يجيدون الإنجليزية = ٣٥ شخصاً.  
 ، عدد الأشخاص الذين يجيدون الإنجليزية والفرنسية معاً = ١٥ شخصاً.  
 ∴ عدد الأشخاص الذين يجيدون الإنجليزية فقط = ٥٣ - ٥١ = ٢٠ شخصاً.  
 بالمثل عدد الأشخاص الذين يجيدون الفرنسية فقط = ١٥ - ٢٠ = ٥ أشخاص.  
 ∴ عدد الأشخاص الذين لا يجيدون أيّاً من اللغتين = ٥٠ - (١٥ + ٥ + ٢٠) = ١٠ أشخاص.

ويمكن توضيح هذه الأعداد بالاستعانة بشكل فن المقابل.



حيث س- تمثل مجموعة الأشخاص الذين يجيدون الإنجليزية وعددهم ٣٥ شخصاً ،  
 ص- تمثل مجموعة الأشخاص الذين يجيدون الفرنسية وعددهم ٢٠ شخصاً

فيكون  $S \cap V$  تمثل مجموعة الأشخاص الذين يجيدون اللغتين معاً وعددهم ١٥ شخصاً ، ف تمثل مجموعة الأشخاص المتقدمين للاختبار وعددهم ٥٠ شخصاً منهم ١٠ أشخاص لا يجيدون أيّاً من اللغتين.

$$\boxed{1} \text{ ل } (١٢) = \frac{\text{عدد الأشخاص الذين يجيدون إحدى اللغتين على الأقل}}{\text{عدد المتقدمين}} = \frac{١٥ + ٥ + ٢٠}{٥٠} = \frac{٤٠}{٥٠} = \frac{٤}{٥}$$

لاحظ أن  
 $S \cup V = ١٢$

$$\therefore \text{ ل } (١٢) = (S \cup V) \text{ ل} - (S) \text{ ل} + (V) \text{ ل} - (S \cap V) \text{ ل} = \frac{٣٥}{٥٠} - \frac{٢٠}{٥٠} + \frac{١٥}{٥٠} = \frac{٤}{٥}$$

$$\boxed{2} \text{ ل } (٢١) = \frac{\text{عدد الأشخاص الذين لا يجيدون أيّاً من اللغتين}}{\text{عدد المتقدمين}} = \frac{١٠}{٥٠} = \frac{١}{٥}$$

$$\therefore \text{ ل } (٢١) = ١ - (١٢) \text{ ل} = ١ - \frac{٤}{٥} = \frac{١}{٥}$$

لاحظ أن  
 ٢١ هو الحدث المكمل للحدث ١٢

$$\boxed{3} \text{ ل } (٢١) = \frac{\text{عدد الأشخاص الذين يجيدون الإنجليزية فقط}}{\text{عدد المتقدمين}} = \frac{٢٠}{٥٠} = \frac{٢}{٥}$$

لاحظ أن  
 $S - V = ٢١$

$$\therefore \text{ ل } (٢١) = (S - V) \text{ ل} - (S) \text{ ل} = \frac{٢٠}{٥٠} - \frac{٣٥}{٥٠} = \frac{٢}{٥}$$

$$\boxed{4} \text{ ل } (٤١) = \frac{\text{عدد الأشخاص الذين يجيدون إحدى اللغتين فقط}}{\text{عدد المتقدمين}} = \frac{٥ + ٢٠}{٥٠} = \frac{٢٥}{٥٠} = \frac{١}{٢}$$

$$\boxed{5} \text{ ل } (٥١) = \frac{\text{عدد الأشخاص الذين يجيدون لغة واحدة على الأكثر}}{\text{عدد المتقدمين}} = \frac{٧}{١٠} = \frac{٣٥}{٥٠} = \frac{١٠ + ٥ + ٢٠}{٥٠} = \frac{٧}{١٠}$$

لاحظ أن

أ، هو الحدث المكمل لحدث «الشخص المختار يجيد اللغتين معاً»  
أى مكمل للحدث  $S \cap V$

$$\therefore J(A) = (S \cap V) - 1 = \frac{10}{10} - 1 = \frac{0}{10} = \frac{0}{10}$$

مثال ١١

بلغ عدد زوار أحد المعارض الفنية في أحد الأيام ١٢٠ زائراً موزعين كما في الجدول المقابل :  
فإذا اختير عشوائياً أحد الزوار. فاحسب احتمالات الأحداث الآتية :

مجموع	أجنبي	عربي	
٦٤	١٦	٤٨	ذكر
٥٦	٢٤	٣٢	أنثى
١٢٠	٤٠	٨٠	مجموع

١ حدث «الشخص المختار من الذكور».

٢ حدث «الشخص المختار من الأجانب».

٣ حدث «الشخص المختار من الذكور الأجانب».

٤ حدث «الشخص المختار من الذكور أو من الأجانب».

الحل

$$\frac{1}{3} = \frac{40}{120} = \frac{\text{عدد الأجانب}}{\text{عدد زوار المعرض}} = (A) \text{ ل } (2)$$

$$\frac{8}{10} = \frac{64}{120} = \frac{\text{عدد الذكور}}{\text{عدد زوار المعرض}} = (A) \text{ ل } (1)$$

$$\frac{2}{10} = \frac{16}{120} = \frac{\text{عدد الذكور الأجانب}}{\text{عدد زوار المعرض}} = (A) \text{ ل } (3)$$

لاحظ أن

$$\frac{2}{10} = (A \cap B) \text{ ل } (4) \therefore A \cap B = 2$$

وأن  $A \cup B = 8$ 

$$\frac{11}{10} = \frac{2 - 0 + 8}{10} = \frac{2}{10} - \frac{0}{10} + \frac{8}{10} = (A \cap B) \text{ ل } (4) - (0) \text{ ل } (3) + (8) \text{ ل } (1) = (A \cup B) \text{ ل } (4) \therefore (A) \text{ ل } (4)$$

مثال ١٢

في تجربة إلقاء حجر نرد منتظم مرتين متتاليتين إذا كان الحدث أ هو حدث الحصول على عددين أحدهما  $\leq 5$

، الحدث ب هو حدث الحصول على عددين الفرق المطلق بينهما  $= 2$

فاحسب كلا من :

$$(A \cap B) \text{ ل } (3)$$

$$(A) \text{ ل } (2), (B) \text{ ل } (2)$$

$$(A) \text{ ل } (1), (B) \text{ ل } (1)$$

$$(A - B) \text{ ل } (5)$$

$$(A \cup B) \text{ ل } (4)$$

١٤٠





أولاً أسئلة الاختيار من متعدد

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

① احتمال الحدث المؤكد = .....

- (i)  $\emptyset$  (ب) ف (ج) صفر (د) ١

② إذا كان احتمال وقوع الحدث  $A$  هو  $\frac{3}{5}$  فإن احتمال عدم وقوعه = .....

- (i) ٠,٦ (ب)  $\frac{1}{5}$  (ج) صفر (د) ٤٠٪

③ إذا كان :  $J = \{1\}$  ،  $K = \{2\}$  ،  $L = \{3\}$  ، فإن :  $J \cup K = \dots\dots\dots$

- (i)  $\frac{11}{12}$  (ب)  $\frac{2}{4}$  (ج)  $\frac{2}{3}$  (د)  $\frac{7}{12}$

④ إذا كان :  $J \cap K = \emptyset$  ،  $J = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$  ،  $K = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$  ، فإن :  $J \cup K = \dots\dots\dots$

- (i) ٠,٨ (ب) ٠,٣ (ج) ١ (د) ٠,٩

⑤ إذا كان  $A$  ،  $B$  حدثين متنافيين من فضاء العينة  $S$  وكان :  $J = \{A\}$  ،  $K = \{B\}$  ، فإن :  $J \cup K = \dots\dots\dots$

- (i) ٠,٧٥ (ب) ٠,٧ (ج) ٠,٩٥ (د) ٠,٢

⑥ إذا كان :  $A$  ،  $B$  حدثين من فضاء عينة لتجربة عشوائية ،  $A \supset B$  فإن :  $J \cup K = \dots\dots\dots$

- (i)  $J \cup K$  (ب)  $J \cap K$  (ج)  $J + K$  (د)  $J \cap K$

⑦ إذا كان  $A$  ،  $B$  حدثين من فضاء عينة لتجربة عشوائية ما وكان :  $A \supset B$  ،  $J = \{A\}$  ،  $K = \{B\}$  ، فإن :  $J \cup K = \dots\dots\dots$

- (i)  $\frac{1}{5}$  (ب)  $\frac{2}{5}$  (ج)  $\frac{3}{5}$  (د)  $\frac{4}{5}$

⑧ في تجربة إلقاء حجر نرد منتظم مرتين متتاليتين فإن احتمال الحصول على العدد ٥ في إحدى الرميتين والعدد ٦ في الرمية الأخرى هو .....

- (i)  $\frac{1}{36}$  (ب)  $\frac{1}{6}$  (ج)  $\frac{1}{18}$  (د)  $\frac{1}{9}$

٩ إذا أُختير حرفاً عشوائياً من حروف المجموعة : ف = {أ، ب، ح، د، هـ، و، ز، حـ، م، ع} فإن احتمال أن يكون هذا الحرف هو أحد حروف كلمة مبروك هو .....

- (أ)  $\frac{1}{4}$  (ب)  $\frac{1}{3}$  (ج)  $\frac{1}{2}$  (د)  $\frac{2}{3}$

١٠ فصل به ٤٢ طالباً نجح منهم في آخر العام ٣٥ طالباً فإذا أُختير طالب عشوائياً فإن احتمال أن يكون راسباً هو .....

- (أ)  $\frac{5}{6}$  (ب)  $\frac{1}{6}$  (ج) صفر (د) ١

١١ إذا أُلقيت قطعة نقود منتظمة مرة واحدة فإن احتمال ظهور صورة أو كتابة يساوي .....

- (أ) صفر (ب)  $\frac{1}{4}$  (ج)  $\frac{1}{2}$  (د) ١

١٢ أُلقيت قطعة نقود منتظمة مرتين متتاليتين فإن احتمال ظهور صورة واحدة على الأكثر = .....

- (أ)  $\frac{3}{4}$  (ب)  $\frac{1}{4}$  (ج)  $\frac{2}{3}$  (د)  $\frac{1}{4}$

١٣ صندوق به ٣٠ بطاقة متماثلة مرقمة من ١ إلى ٣٠ ، سحب بطاقة واحدة عشوائياً من هذا الصندوق فإن احتمال أن تكون البطاقة المسحوبة مرقمة بعدد فردي مكعب كامل = .....

- (أ) صفر (ب)  $\frac{1}{10}$  (ج)  $\frac{1}{3}$  (د)  $\frac{1}{10}$

١٤ إذا كان : ل (أ) = ٠,٣ ، ل (ب) = ٠,٥ ، ل (أ ∩ ب) = ٠,١ فإن : ل (أ ∩ ب) = .....

- (أ) ٠,٧ (ب) ٠,٤ (ج) ٠,٣ (د) ٠,١

١٥ إذا كان أ ، ب حدثين متنافيين فإن : ل (أ ∪ ب) = .....

- (أ) صفر (ب) ١ (ج) ٠,٥ (د) ٥٠%

١٦ إذا كان أ ، ب حدثين من فضاء عينة لتجربة عشوائية وكان : ل (أ) =  $\frac{1}{4}$  ، ل (أ ∩ ب) =  $\frac{1}{8}$  فإن : ل (أ ∪ ب) = .....

- (أ)  $\frac{19}{32}$  (ب)  $\frac{1}{4}$  (ج)  $\frac{7}{32}$  (د)  $\frac{13}{32}$

١٧ إذا كان : ل (أ) =  $\frac{1}{4}$  ، ل (ب) =  $\frac{2}{5}$  ، ل (أ ∪ ب) =  $\frac{4}{5}$  فإن : ل (أ ∩ ب) = .....

- (أ)  $\frac{1}{4}$  (ب)  $\frac{3}{20}$  (ج)  $\frac{2}{5}$  (د) ٠,٦

١٨ إذا كان : أ ، ب حدثين من فضاء العينة ف لتجربة عشوائية ما وكان :

ل (أ) =  $\frac{1}{4}$  ، ل (أ ∪ ب) =  $\frac{1}{3}$  وكان أ ∩ ب فإن : ل (ب) = .....

- (أ)  $\frac{1}{6}$  (ب)  $\frac{2}{3}$  (ج)  $\frac{1}{12}$  (د)  $\frac{5}{6}$

١٩ إذا كان : أ ، ب حدثين من فضاء عينة لتجربة عشوائية وكان :

ل (أ ∪ ب) = ٠,٨٥ ، ل (أ) = ٠,٧٥ ، ل (ب) = ٠,٦ فإن : ل (أ ∩ ب) = .....

- (أ) ٠,٣ (ب) ٠,٤ (ج) ٠,١٥ (د) ٠,٧

٢٠) إذا كان  $A$ ،  $B$  حدثين متنافيين من فضاء عينة لتجربة عشوائية وكان  $P(A) = \frac{2}{3}$   
فإن  $P(B) = \dots = (A - B)$

(أ) صفر (ب)  $\frac{1}{3}$  (ج)  $\frac{2}{3}$  (د) ١

٢١) إذا كان  $P(A) = 0.3$ ،  $P(B) = 0.16$ ، فإن  $P(A - B) = \dots$

(أ) ٠,١٤ (ب) ٠,١٦ (ج) ٠,٣ (د) ٠,٧

٢٢)  $A$ ،  $B$  حدثان ينتميان إلى فضاء العينة  $S$  المصاحب لتجربة عشوائية ما بحيث كان  $P(A) = P(B)$

فإنذا علمت أن  $P(A \cap B) = 0.2$ ،  $P(A \cup B) = 0.8$ ، فإن  $P(A \cap B) = \dots$

(أ) ٠,٥ (ب) ٠,٣ (ج) ٠,٨ (د) ٠,٢

٢٣) إذا كان  $A$ ،  $B$  حدثين من فضاء العينة  $S$  وكان  $P(A) : P(B) = 2 : 3$ ،  $P(A \cap B) = 0.1$ ،

$P(A \cup B) = 0.7$ ، فإن  $P(A) = \dots$

(أ) ٠,١٦ (ب) ٠,٤٨ (ج) ٠,٣٢ (د) ٠,٦

٢٤) يحتوي صندوق على تسع بطاقات متماثلة تحمل الأرقام من ١ إلى ٩، اختيرت بطاقة عشوائياً،

فإن احتمال أن تحمل البطاقة المسحوبة رقماً يقسم العدد ٩ أو رقماً فردياً هو .....

(أ)  $\frac{1}{3}$  (ب)  $\frac{2}{9}$  (ج)  $\frac{1}{4}$  (د)  $\frac{5}{9}$

٢٥) سُحبت بطاقة واحدة عشوائياً من ٥٠ بطاقة متماثلة ومرقمة من ١ إلى ٥٠ فإن احتمال أن يكون العدد

على البطاقة المسحوبة مربع كامل هو .....

(أ) ٢٠٪ (ب) ١٤٪ (ج) ١٢٪ (د) ٦٪

٢٦) سُحبت بطاقة عشوائياً من ٥٠ بطاقة متماثلة ومرقمة من ١ إلى ٥٠ فإن احتمال أن يكون العدد على

البطاقة المسحوبة ليس مربعاً كاملاً، وليس مضاعفاً للعدد ٧ هو .....

(أ)  $\frac{7}{50}$  (ب)  $\frac{23}{50}$  (ج)  $\frac{47}{50}$  (د)  $\frac{13}{50}$

٢٧) كيس يحتوي على ٢٥ كرة منها ٤ كرات صفراء، ٧ كرات حمراء، والباقي أسود اللون

، فإذا سُحبت كرة عشوائياً فإن احتمال أن تكون الكرة المسحوبة سوداء أو صفراء = .....

(أ)  $\frac{7}{25}$  (ب)  $\frac{4}{25}$  (ج)  $\frac{18}{25}$  (د)  $\frac{14}{25}$

٢٨) صندوق به ٢٠ بطاقة متماثلة ومرقمة من ١ إلى ٢٠ سُحبت منه بطاقة واحدة عشوائياً فإن احتمال أن

يكون العدد المكتوب على البطاقة المسحوبة أولياً أكبر من ١٠ هو .....

(أ)  $\frac{1}{10}$  (ب)  $\frac{1}{5}$  (ج)  $\frac{3}{10}$  (د)  $\frac{1}{4}$



٢٩) احتمال اختيار عدد من مجموعة الأعداد  $\{-2, -1, 0, 1, 2\}$  بحيث يكون مربعه عدد موجب يساوي .....

(أ)  $\frac{1}{5}$  (ب)  $\frac{2}{5}$  (ج)  $\frac{4}{5}$  (د) ١

٣٠) إذا كان  $A$ ،  $B$  حدثين من فضاء عينة لتجربة عشوائية وكان  $P(A) = \frac{9}{11}$ ،  $P(B) = \frac{3}{11}$ ،

$P(A \cup B) = \frac{2}{11}$ ، فإن  $P(A \cap B) = \dots\dots\dots$

(أ)  $\frac{1}{4}$  (ب)  $\frac{1}{6}$  (ج)  $\frac{1}{8}$  (د)  $\frac{1}{11}$

٣١) إذا كان  $A$ ،  $B$  حدثين من فضاء عينة لتجربة عشوائية فإذا كان :

$P(A) = \frac{2}{5}$ ،  $P(A \cup B) = 0.45$ ،  $P(A - B) = 0.2$ ، فإن  $P(B) = \dots\dots\dots$

(أ) 0.75 (ب) 0.6 (ج) 0.65 (د) 0.55

٣٢) إذا كان  $A$ ،  $B$  حدثين من فضاء النواتج لتجربة عشوائية وكان :  $P(A) = \frac{5}{8}$ ،  $P(A - B) = \frac{1}{8}$ ،

$P(A \cap B) = \frac{3}{4}$ ، فإن  $P(B) = \dots\dots\dots$

(أ)  $\frac{1}{8}$  (ب)  $\frac{1}{4}$  (ج)  $\frac{3}{4}$  (د)  $\frac{3}{8}$

٣٣) إذا كان  $A$ ،  $B$  حدثان من فضاء العينة وكان :  $P(A) = \frac{3}{4}$ ،  $P(A \cap B) = 0.2$ ،

فإن احتمال وقوع  $A$  فقط = .....

(أ) 0.55 (ب) 0.05 (ج) 0.3 (د) 0.75

٣٤) إذا كان  $A$ ،  $B$  حدثين من فضاء النواتج لتجربة عشوائية وكان :  $A \supset B$

$P(A) = \frac{2}{3}$ ،  $P(B) = 0.6$ ، فإن  $P(A - B) = \dots\dots\dots$

(أ) 0.2 (ب) 0.5 (ج) 0.6 (د) 0.8

٣٥) إذا كانت  $F$  فضاء عينة لتجربة عشوائية ،  $F \supset G$ ، وكان :  $P(G) = \frac{3}{5}$ ، فإن  $P(G) = \dots\dots\dots$

(أ)  $\frac{1}{8}$  (ب)  $\frac{3}{8}$  (ج)  $\frac{5}{8}$  (د)  $\frac{2}{5}$

٣٦) إذا كان  $A$ ،  $B$  حدثين من فضاء العينة لتجربة عشوائية ،  $P(A) = \frac{1}{4}$ ،  $P(A \cap B) = \frac{1}{4}$ ،

فإن  $P(B - A) = \dots\dots\dots$

(أ)  $\frac{1}{4}$  (ب)  $\frac{2}{3}$  (ج)  $\frac{5}{6}$  (د)  $\frac{1}{6}$

٣٧) إذا كان  $A$ ،  $B$  حدثين من فضاء العينة ف لتجربة عشوائية وكان :  $A \supset B$ ،  $P(A) = \frac{1}{4}$ ، احتمال وقوع

$B$  فقط يساوي 0.2، فإن احتمال عدم وقوع  $B$  = .....

(أ) 0.1 (ب) 0.3 (ج) 0.7 (د) 0.9

٢٨ خمس بطاقات متماثلة مرقمة من ٢ إلى ٦ ، سحب بطاقة واحدة بعد الأخرى مع الإحلال ، وملاحظة الرقم المسجل عليها لتكوين جميع الأعداد الممكنة ذات الرقمين فإن احتمال أن يكون رقم الأحاد عدداً أولياً أو رقم العشرات عدداً فردياً = .....

(١)  $\frac{2}{5}$  (ب)  $\frac{2}{5}$  (ج)  $\frac{23}{25}$  (د)  $\frac{19}{25}$

٢٩ صندوق به ٨ بطاقات مرقمة من ١ إلى ٨ ، سحب بطاقة واحدة بعد الأخرى مع الإحلال فإن احتمال أن يكون الفرق المطلق بين الرقمين يساوي ٣ هو .....

(١)  $\frac{5}{32}$  (ب)  $\frac{2}{17}$  (ج)  $\frac{21}{64}$  (د)  $\frac{1}{4}$

٤٠ إذا كان ٩ ، ب حدثين من فضاء عينة لتجربة عشوائية عناصرها ذات احتمالات متساوية ، وكان ل (ب) =  $\frac{1}{4}$  ، ل (٩) =  $1 - ل (ب)$  ، فإن : .....

(١)  $ل (ب) = ل (٩)$  (ب)  $ل (ب) < ل (٩)$

(ج)  $ل (ب) > ل (٩)$  (د)  $1 = ل (ب) + ل (٩)$

٤١ صمم حجر نرد بحيث عند إلقاءه تكون احتمالات ظهور الأعداد ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ ، ٥ متساوية ، احتمال ظهور العدد ٦ يساوي ثلاثة أمثال احتمال ظهور العدد ١ فإن احتمال ظهور عدد زوجي = .....

(١)  $\frac{1}{4}$  (ب)  $\frac{3}{8}$  (ج)  $\frac{5}{8}$  (د)  $\frac{3}{4}$

٤٢ ألقى حجر نرد منتظم مرة واحدة على منضدة ، ولوخط العدد الظاهر على وجهه العلوي فإن احتمال ألا يزيد هذا العدد عن ٥ ولا يقل عن ٣ هو .....

(١)  $\frac{1}{4}$  (ب)  $\frac{1}{3}$  (ج)  $\frac{1}{4}$  (د)  $\frac{2}{3}$

٤٣ في تجربة إلقاء حجر نرد مرتين فإن احتمال أن يكون مجموع العددين الظاهرين على الوجه العلوي عدد أولي = .....

(١)  $\frac{7}{18}$  (ب)  $\frac{1}{3}$  (ج)  $\frac{5}{11}$  (د)  $\frac{5}{12}$

٤٤ إذا ألقى حجر نرد منتظم ثلاث مرات متتالية فإن احتمال الحصول على ثلاثة أعداد متشابهة هو .....

(١)  $\frac{1}{36}$  (ب)  $\frac{1}{6}$  (ج)  $\frac{5}{6}$  (د)  $\frac{1}{216}$

٤٥ إذا ألقى حجر نرد منتظم مرة واحدة فإن احتمال ظهور عدد زوجي غير أولي = .....

(١)  $\frac{1}{3}$  (ب)  $\frac{1}{4}$  (ج)  $\frac{1}{6}$  (د)  $\frac{5}{6}$

٤٦ ألقى حجر نرد ثلاث مرات ولوخط العدد الظاهر على الوجه العلوي فإن احتمال أن يكون مجموع الأرقام الظاهرة هو ١٨ يساوي .....

(١)  $\frac{1}{6}$  (ب)  $\frac{1}{36}$  (ج)  $\frac{1}{216}$  (د)  $\frac{1}{108}$

٤٧ ألقى حجر نرد منتظم مرة واحدة فإذا كان الحدث ٩ هو «ظهور عدد فردي» ، والحدث ب هو «ظهور عدد أقل من ٥» فإن احتمال وقوع أحدهما على الأقل هو .....

(١)  $\frac{1}{6}$  (ب)  $\frac{1}{4}$  (ج)  $\frac{5}{6}$  (د)  $\frac{1}{3}$

٤٨) في تجربة إلقاء حجر نرد منتظم مرتين متتاليتين ، فإن احتمال الحصول على عدد زوجي في الرمية الأولى وعدد أولى في الرمية الثانية هو .....

(١)  $\frac{1}{4}$  (ب)  $\frac{1}{6}$  (ج)  $\frac{1}{9}$  (د)  $\frac{1}{8}$

٤٩) س ، ح ، ث ثلاثة أحداث متنافية من فضاء العينة ف لتجربة عشوائية ما بحيث  $P(A \cup B \cup C) = 1$  ، فإن كان  $P(A) = \frac{1}{3}$  ،  $P(B) = \frac{1}{4}$  ،  $P(C) = \frac{1}{6}$  ، فإن  $P(A \cap B) =$  .....

(١)  $\frac{4}{5}$  (ب)  $\frac{2}{5}$  (ج)  $\frac{3}{5}$  (د)  $\frac{1}{3}$

٥٠) إذا كان س ، ح حدثين من فضاء عينة لتجربة عشوائية وكان :  $P(A) = 0.5$  ،  $P(B) = 0.6$  ،  $P(A \cap B) = 0.3$  ، فإن  $P(A \cup B) =$  .....

(١) ٠.٢ (ب) ٠.٣ (ج) ٠.٥ (د) ٠.٩

٥١) إذا كان فضاء العينة لتجربة عشوائية هو  $\{س ، ح ، د ، هـ\}$  وكان  $P(B) = 0.33$  ،  $P(A \cup B) = 0.45$  ،  $P(A \cap B) = 0.44$  ، فإن  $P(A) =$  .....

(١) ٠.٧٧ (ب) ٠.٢٣ (ج) ٠.١١ (د) ٠.٠١

٥٢) إذا كان  $F = \{س ، ح ، د\}$  فضاء عينة لتجربة عشوائية ما ، وكان :  $P(A) = 0.2$  ،  $P(B) = 0.15$  ،  $P(A \cap B) = 0.12$  ، فإن  $P(B) =$  .....

(١)  $\frac{1}{3}$  (ب)  $\frac{1}{4}$  (ج)  $\frac{5}{12}$  (د)  $\frac{15}{47}$

٥٣) إذا كان فضاء النواتج لتجربة عشوائية حيث  $F = \{س ، ح ، د\}$  ، وكان  $P(A) = \frac{8}{9}$  ،  $P(B) = \frac{5}{9}$  ، فإن  $P(A \cap B) =$  .....

(١)  $\frac{2}{11}$  (ب)  $\frac{2}{7}$  (ج)  $\frac{1}{11}$  (د)  $\frac{24}{77}$

٥٤) إذا كان س ، ح حدثين من فضاء عينة لتجربة عشوائية ، وكان  $P(B) = 0.5$  ،  $P(A \cup B) = 0.8$  ،  $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$  ، فإن  $P(A) =$  .....

(١) ٠.٥ (ب) ٠.٧ (ج) ٠.٤ (د) ٠.٦

٥٥) إذا كان س ، ح حدثين من فضاء عينة لتجربة عشوائية فإن احتمال وقوع أحدهما فقط هو .....

(١)  $P(A \cup B)$  (ب)  $P(A \cup B)$   
(ج)  $P(A \cup B) - P(A \cap B)$  (د)  $P(A \cap B)$

٥٦) إذا كان س ، ح حدثين من فضاء العينة لتجربة عشوائية ف فإن احتمال وقوع أحد الحدثين دون الآخر = .....

(١)  $P(A) + P(B)$  (ب)  $P(A) + P(B) - P(A \cap B)$   
(ج)  $P(A) + P(B) + P(A \cap B)$  (د)  $P(A) + P(B) - 2P(A \cap B)$

٥٧) إذا كان  $A$  ،  $B$  حدثين متنافيين فإن .....

(أ)  $P(A) > P(B)$  (ب)  $P(A) \geq P(B)$

(ج)  $P(A) \leq P(B)$  (د) لا شيء مما سبق.

٥٨) إذا كان  $A$  ،  $B$  حدثين من فضاء عينة لتجربة عشوائية ، وكان احتمال وقوع الحدث  $B$  وعدم وقوع الحدث

$P(A) = 0.18$  ، واحتمال وقوع أحد الحدثين  $A$  ،  $B$  بالضبط  $= 0.43$  ، فإن احتمال وقوع  $A$  فقط = .....

(أ)  $0.25$  (ب)  $0.09$  (ج)  $0.61$  (د)  $0.07$

٥٩) أربع رجال  $A$  ،  $B$  ،  $C$  ،  $D$  يقفوا في صف واحد فإن احتمال أن يقف الرجل  $(A)$  على أحد نهايتي الصف

هو .....

(أ)  $\frac{1}{4}$  (ب)  $\frac{1}{3}$  (ج)  $\frac{1}{2}$  (د)  $\frac{1}{8}$

٦٠) إذا كان احتمال نجاح طالب في الرياضيات  $0.8$  ، واحتمال نجاحه في اللغة الفرنسية  $0.7$  واحتمال

نجاحه في المادتين معاً  $0.56$  ،

فإن احتمال نجاحه في الرياضيات وعدم نجاحه في اللغة الفرنسية = .....

(أ)  $0.24$  (ب)  $0.94$  (ج)  $0.44$  (د)  $0.2$

٦١) في احتفال أحد الأندية الرياضية بافتتاح مجمع للصالات ، إذا كان احتمال حضور المحافظ  $0.8$  ،

واحتمال حضور وزير الشباب والرياضة  $0.9$  ، واحتمال حضورهما معاً  $0.72$  ،

فإن احتمال حضور أحدهما على الأقل = .....

(أ)  $0.8$  (ب)  $0.75$  (ج)  $0.98$  (د)  $0.28$

٦٢) مجموعة من الطلاب تتكون من  $48$  ولداً و  $32$  بنتاً منها  $18$  ولداً و  $8$  بنات من القسم العلمي فإذا اختير

أحد الطلاب عشوائياً فإن احتمال أن يكون بنتاً أو من القسم العلمي هو .....

(أ)  $\frac{13}{40}$  (ب)  $\frac{1}{8}$  (ج)  $\frac{3}{8}$  (د)  $\frac{5}{8}$

٦٣) إذا كان  $A$  ،  $B$  حدثين من فضاء العينة (ف) لتجربة عشوائية حيث  $P(B) = \frac{5}{7}$

فإن  $P(A \cap B) + P(A \cap \bar{B}) = \dots\dots\dots$

(أ)  $\frac{2}{7}$  (ب)  $\frac{5}{7}$  (ج)  $1$  (د) صفر

٦٤) إذا كان  $A$  ،  $B$  حدثين من أحداث تجربة عشوائية حيث  $P(A - B) = 0.3$  ،

$P(A - B) = \frac{4}{10}$  ،  $P(A \cap B) = \frac{1}{10}$  فإن  $P(A \cap \bar{B}) = \dots\dots\dots$

(أ)  $\frac{1}{2}$  (ب)  $\frac{8}{10}$  (ج)  $0.6$  (د)  $\frac{7}{10}$

٦٥) إذا كان  $A$  ،  $B$  حدثين متنافيين من فضاء العينة ف وكان  $P(\bar{A}) = \frac{3}{4}$

$P(A \cup B) = \frac{2}{3}$  فإن  $P(B) = \dots\dots\dots$

(أ)  $\frac{1}{4}$  (ب)  $\frac{1}{2}$  (ج)  $\frac{2}{3}$  (د)  $\frac{1}{12}$

٦٦) إذا كان  $A$ ،  $B$  حدثين من فضاء عينة لتجربة عشوائية وكان:  $J(A \cap B) = J(B - A)$

$J(A) = 7$ ،  $J(B) = 6$ ،  $J(A \cup B) = \frac{5}{6}$  فإن:  $J(A) = \dots\dots\dots$

- (أ)  $\frac{1}{3}$  (ب)  $\frac{1}{4}$  (ج)  $\frac{1}{6}$  (د)  $\frac{2}{3}$

٦٧) إذا كان  $J(A) = J(B)$ ،  $J(A) = \frac{1}{4}$ ،  $J(A \cup B) = \frac{3}{8}$  حيث  $A$ ،  $B$  حدثان من فضاء تجربة عشوائية فإن:  $J(A \cup B) = \dots\dots\dots$

- (أ)  $\frac{1}{8}$  (ب)  $\frac{1}{4}$  (ج)  $\frac{3}{8}$  (د)  $\frac{3}{8}$

٦٨) صندوق يحتوي على ١٠ كرات بيضاء، ٥ كرات حمراء، ص كرة سوداء فإذا سُحبت كرة عشوائيًا من الصندوق وكان احتمال أن تكون الكرة بيضاء =  $\frac{1}{4}$ ، واحتمال أن تكون حمراء =  $\frac{2}{5}$  فإن عدد الكرات السوداء =  $\dots\dots\dots$

- (أ) ٢٤ (ب) ٦ (ج) ٣٤ (د) ٤٠

٦٩) إذا كان  $A$ ،  $B$  حدثين من فضاء عينة لتجربة عشوائية، وكان عدد النواتج التي تؤدي إلى وقوع الحدث  $A$  يساوي ١٢، وعدد النواتج التي تؤدي إلى وقوع الحدث  $B$  يساوي ١٦، وعدد النواتج التي تؤدي إلى وقوع الحدثين  $A$ ،  $B$  معًا يساوي ٨، وكان  $J(A \cup B) = \frac{2}{5}$  فإن:  $J(A \cup B) = \dots\dots\dots$

- (أ)  $\frac{2}{5}$  (ب)  $\frac{1}{5}$  (ج)  $\frac{21}{25}$  (د)  $\frac{1}{5}$

٧٠) صمم حجر نرد بحيث يكون وجهان فيه يحملان الرقم ١ ووجهان يحملان الرقم ٢ ووجهان يحملان الرقم ٥ ثم ألقى هذا الحجر مرتين متتاليتين

فإن احتمال أن يكون الفرق المطلق بين العددين في الرميّتين = ٢ هو  $\dots\dots\dots$

- (أ)  $\frac{1}{3}$  (ب)  $\frac{2}{9}$  (ج)  $\frac{4}{9}$  (د)  $\frac{2}{3}$

٧١) في أحد معارض أجهزة الكمبيوتر إذا كان احتمال بيع ٢٠ جهازًا على الأقل يوميًا هو ٠.٧ واحتمال بيع أقل من ٢٣ جهازًا هو ٠.٤ فإن احتمال بيع [٢٠ أو ٢١ أو ٢٢ جهازًا] =  $\dots\dots\dots$

- (أ) ٠.١ (ب) ٠.٢ (ج) ٠.٣ (د) ٠.٤

٧٢) تم حقن عشرة فئران بمادة سامة ولوحظ عدد الفئران التي تموت خلال ١٢ ساعة فإذا كان احتمال أن يموت ستة فئران أو أقل = ٠.٧ واحتمال أن يموت ستة فئران بالضبط = ٠.٣

فإن احتمال أن يموت ستة فئران على الأقل =  $\dots\dots\dots$

- (أ) ٠.٤ (ب) ٠.٥ (ج) ٠.٦ (د) ٠.٨

٧٣) إذا كان  $A$ ،  $B$  حدثين من فضاء العينة لتجربة عشوائية فإن:  $J(A \cap B) \cup J(B \cap A) = \dots\dots\dots$

- (أ)  $J(A \cap B)$  (ب)  $J(A \cup B)$  (ج)  $J(A \cup B) - J(A \cap B)$  (د)  $J(A) + J(B) - J(A \cap B)$

٧٤) إذا كان  $P$ ،  $B$  حدثين من فضاء العينة لتجربة عشوائية فإن  $J(A - B) = \dots$

(أ)  $J(A) - J(B \cap A)$

(ب)  $J(B) - J(A \cap B)$

٧٥) إذا كان  $P$ ،  $B$  حدثين من فضاء العينة لتجربة عشوائية وكان  $J(A \cap B) = \frac{1}{12}$

،  $J(A) = \frac{5}{12}$  ،  $J(B) = \frac{1}{4}$  فإن  $J(A \cap B) = \dots$

(أ)  $\frac{1}{4}$  (ب)  $\frac{2}{3}$  (ج)  $\frac{1}{4}$  (د)  $\frac{1}{6}$

ثانياً الأسئلة المقالية

١) إذا كان  $P$ ،  $B$  حدثين من فضاء نواتج تجربة عشوائية ما ،  $J(A) = 0.3$  ،  $J(B) = 0.8$  ،  $J(A \cap B) = 0.2$  احسب كلا من :

①  $J(A)$       ②  $J(A \cup B)$       ③  $J(B - A)$       ④  $J(A \cup B)$

« 0.8 ، 0.1 ، 0.9 ، 0.7 »

٢) إذا كان  $P$ ،  $B$  حدثين من فضاء عينة لتجربة عشوائية ، وكان  $J(A) = \frac{2}{5}$  ،  $J(A \cup B) = 0.45$  فأوجد  $J(B)$  في كل من الحالات الآتية :

①  $P \supset B$  ، حدثان متنافيان.      ②  $A \supset B$       ③  $J(B - A) = 0.2$

« 0.2 ، 0.75 ، 0.55 »

٣) إذا كان  $P$ ،  $B$ ،  $C$  ثلاثة أحداث متنافية مثنى مثنى وكان  $J(A) = 0.12$  ،  $J(B) = 0.28$  ،  $J(C) = 0.22$  فاحسب قيمة كل من :

①  $J(A \cup B)$       ②  $J(B - C)$       ③  $J(A \cap B)$   
 ④  $J(B \cap C)$       ⑤  $J(A \cup B \cup C)$       ⑥  $J(A \cap B \cap C)$   
 ⑦  $J(A \cup B)$

« 0.44 ، 0.12 ، صفر ، 1 ، 0.72 ، صفر ، 0.6 »

٤) إذا كان  $P$ ،  $B$  حدثين من فضاء العينة لتجربة عشوائية ، وكان  $J(A) = \frac{2}{4}$  ،  $J(A \cap B) = \frac{1}{8}$  ،  $J(B) = \frac{2}{8}$  فأوجد كلا مما يأتي :

①  $J(A)$       ②  $J(B)$       ③  $J(B - A)$

«  $\frac{2}{8}$  ،  $\frac{1}{4}$  ،  $\frac{1}{8}$  »



١١ إذا كان  $A$  ،  $B$  حدثين من فضاء عينة لتجربة عشوائية ، وكان احتمال عدم وقوع الحدث  $A = 0.7$  ، واحتمال عدم وقوع الحدث  $B = 0.6$  ، واحتمال وقوع أحدهما على الأكثر  $= 0.9$  ، فأوجد كلاً مما يأتي :

- ① احتمال وقوع الحدث  $A$  | ② احتمال وقوع الحدثين معاً.  
 ③ احتمال وقوع أى من الحدثين. | ④ احتمال وقوع الحدث  $A$  فقط.  
 ⑤ احتمال وقوع الحدث  $B$  أو عدم وقوع الحدث  $A$
- « ٠.٨ ، ٠.٢ ، ٠.٦ ، ٠.١ ، ٠.٣ »

١٢ إذا كان  $A$  ،  $B$  حدثين من فضاء عينة لتجربة عشوائية ، وكان  $P(A) = \frac{2}{3}$  ، واحتمال حدث وقوع أحدهما على الأكثر يساوي  $0.75$  ، واحتمال حدث وقوع أحدهما على الأقل يساوي  $0.6$  ، فأوجد احتمال كل من الأحداث الآتية :

- ① احتمال وقوعهما معاً. | ② وقوع أحد الحدثين فقط.  
 ③ وقوع  $B$  أو عدم وقوع  $A$
- « ٠.٩١ ، ٠.٣٥ ، ٠.٢٥ »

١٣ ثلاثة خيول  $A$  ،  $B$  ،  $C$  مشتركة فى سباق فإذا كان احتمال فوز  $A$  ضعف احتمال فوز  $B$  واحتمال فوز  $B$  ضعف احتمال فوز  $C$  علماً بأن أحد الخيول فقط هو الذى سيفوز بالسباق. أوجد :

- ①  $P(A)$  | ②  $P(B)$   
 ③  $P(A \text{ أو } B)$  | ④  $P(B \text{ و } C)$
- «  $\frac{4}{7}$  ،  $\frac{1}{7}$  ،  $\frac{2}{7}$  ، صفر »

١٤ يصوب لاعبان  $A$  ،  $B$  فى وقت واحد نحو هدف ما ، فإذا كان احتمال أن يصيب اللاعب  $A$  الهدف هو  $\frac{2}{5}$  ، واحتمال أن يصيب اللاعب  $B$  الهدف هو  $\frac{1}{4}$  ، واحتمال أن يصيب اللاعبان معاً الهدف هو  $\frac{1}{6}$  أوجد احتمالات الأحداث الآتية :

- ① حدث «إصابة الهدف». | ② حدث «إصابة الهدف من  $B$  فقط».  
 ③ حدث «عدم إصابة الهدف». | ④ حدث «إصابة الهدف من أحدهما على الأكثر».  
 ⑤ حدث «إصابة الهدف من أحدهما دون الآخر».
- «  $\frac{1}{6}$  ،  $\frac{2}{3}$  ،  $\frac{9}{30}$  ،  $\frac{9}{30}$  ،  $\frac{9}{30}$  »

١٥ إذا كان احتمال نجاح طالب فى التاريخ هو  $0.4$  ، واحتمال نجاحه فى اللغة العربية هو  $0.45$  ، واحتمال نجاحه فى التاريخ واللغة العربية هو  $0.18$  أوجد احتمال :

- ① نجاحه فى التاريخ فقط. | ② رسوبه فى المادتين معاً.  
 ③ نجاحه فى مادة واحدة منهما على الأكثر. | ④ نجاحه فى إحدى المادتين على الأقل.  
 ⑤ عدم نجاحه فى المادتين معاً.
- « ٠.٢٢ ، ٠.٣٣ ، ٠.٨٢ ، ٠.٦٧ ، ٠.٨٢ »



١٦ إذا كان احتمال نجاح حسن في اختبار الرياضيات هو  $0.72$  ، واحتمال رسوبه في اختبار الفيزياء هو  $0.27$  ، وكان احتمال نجاحه في أحد الاختبارين على الأقل هو  $0.88$  ، فأوجد احتمالات الأحداث الآتية :

- ١) نجاح حسن في كلا الاختبارين.
  - ٢) نجاح حسن في أحد الاختبارين على الأكثر.
  - ٣) نجاح حسن في أحد الاختبارين دون الآخر.
  - ٤) رسوب حسن في كلا الاختبارين.
- « $0.47$  ،  $0.53$  ،  $0.46$  ،  $0.12$ »

١٧ صمم حجر نرد بحيث كانت احتمالات ظهور الأعداد الفردية متساوية واحتمالات ظهور الأعداد الزوجية متساوية ، وكان احتمال ظهور العدد الزوجي يساوي  $\frac{1}{4}$  احتمال ظهور العدد الفردي فإذا ألقى هذا الحجر مرة واحدة. أوجد احتمال ظهور كل عدد من الأعداد الستة ثم احسب احتمال كل من الأحداث الآتية :

- ١) حدث «ظهور عدد أولى غير زوجي».
  - ٢) حدث «ظهور عدد أقل من ٣».
  - ٣) حدث «ظهور عدد زوجي أكبر من أو يساوي ٤».
- « $\frac{1}{6}$  ،  $\frac{1}{3}$  ،  $\frac{1}{4}$ »

١٨ صمم حجر نرد بحيث يكون احتمال ظهور أى عدد على الوجه العلوي = له  $\times$  العدد نفسه حيث له ثابت  $\neq$  صفر فإذا ألقى هذا الحجر مرة واحدة. أوجد احتمالات الأحداث الآتية :

- ١) حدث «ظهور عدد فردي».
  - ٢) حدث «ظهور عدد زوجي».
  - ٣) حدث «ظهور عدد فردي أولى».
  - ٤) حدث «ظهور عدد لا يقبل القسمة على ٣».
- « $\frac{2}{3}$  ،  $\frac{4}{9}$  ،  $\frac{4}{9}$  ،  $\frac{4}{9}$ »

١٩ الربط بالرياضة : صرح مدرب أحد الفرق الرياضية أثناء لقاء صحفي معه بأن احتمال فوز فريقه في مباراة الذهاب  $0.7$  ، واحتمال فوز فريقه في مباراة الإياب  $0.9$  ، وأن احتمال فوزه في المبارتين معاً  $0.5$  . هل يتفق ما صرح به مدرب الفريق مع مفهوم الاحتمال ؟ فسر إجابتك.

٢٠ ٢ ، ب حدثان من ف ، ل دالة احتمال على ف ، فإذا كان : ل (٢) = س ، ل (ب) = ٤ = س

$$ل (ل \cup ب) = ٦ - س - ٤ = ٠$$

فأوجد قيمة س إذا كان :

$$١) ٢ ، ب حدثين متنافيين. ل (٢) \supset ب$$

$$٢) ل (ل \cap ب) = \frac{٤}{٥} س$$

« $\frac{1}{5}$  ،  $0.14$  ،  $\frac{٥}{٤٠}$ »

٢١ إذا كان  $A$ ،  $B$  حدثين من فضاء نواتج  $F$ ،  $L$  دالة احتمال على  $F$  بحيث :

$$L(A \cup B) = 0,58 \text{ ، } L(A \cap B) = 0,12$$

$$\text{فإذا كان } L(A \cap B) = L(A) \times L(B)$$

فأوجد قيمة كل من :  $L(A)$  ،  $L(B)$

« ٠,٣ ، ٠,٤ ، ٠,٤ ، ٠,٣ »

٢٢ في تجربة إلقاء حجر نرد مرة واحدة وملاحظة العدد الظاهر على الوجه العلوي.

أوجد احتمالات الأحداث الآتية :

١ حدث «ظهور الرقم ٥» .

٢ حدث «عدم ظهور الرقم ٣» .

٣ حدث «ظهور عدد أكبر من ٢» .

٤ حدث «ظهور عدد أكبر من ٤ أو أقل من ٣» .

٥ حدث «ظهور عدد أكبر من ٢ وأقل من ٣» .

٦ حدث «ظهور عدد من عوامل ٦» .

٧ نر حدث «ظهور عدد فردي يقبل القسمة على ٣» .

«  $\frac{1}{6}$  ،  $\frac{2}{6}$  ،  $0$  ،  $\frac{2}{6}$  ،  $\frac{2}{6}$  ،  $\frac{5}{6}$  ،  $\frac{1}{6}$  »

٢٣ ألقى حجر نرد منتظم كتب على أوجهه الأعداد ٨ ، ٩ ، ١٠ ، ١١ ، ١٢ ، ١٣ ولوخط العدد على الوجه العلوي.

احسب :

(أ) احتمال كل من الأحداث التالية :

١ حدث «ظهور عدد فردي» .

٢ حدث «ظهور عدد أولى» .

٣ حدث «ظهور عدد زوجي» .

٤ حدث «ظهور عدد أكبر من ١٢» .

٥ حدث «ظهور عدد مكون من رقمين» .

٦ حدث «ظهور عدد مكون من رقم واحد» .

(ب)  $L(A \cup B)$  ،  $L(A \cap B)$  ،  $L(B \cap A)$  ،  $L(A \cap B)$

٢٤ مجموعة بطاقات متماثلة ومرقمة من ١ إلى ٣٠ ، سحبت منها بطاقة واحدة عشوائياً ولوخط العدد المدون

عليها . احسب احتمال أن تكون البطاقة المسحوبة تعمل :

١ عدداً يقبل القسمة على ٣

٢ عدداً يقبل القسمة على ٥

٣ عدداً يقبل القسمة على ٣ ، ٥

٤ عدداً يقبل القسمة على ٣ أو ٥

٥ عدداً زوجياً يقبل القسمة على ٣

٦ عدداً فردياً مكعباً كاملاً

٧ عدداً أولياً أصغر من ١٥

٨ عدداً به رقم ٢ أو رقم ٣

«  $\frac{1}{3}$  ،  $\frac{1}{5}$  ،  $\frac{1}{15}$  ،  $\frac{1}{6}$  ،  $\frac{7}{15}$  ،  $\frac{1}{15}$  ،  $\frac{1}{5}$  ،  $\frac{1}{3}$  »

٢٥ كيس يحتوي على ٥٠ كرة متماثلة ، ٢٥ كرة منها بيضاء ومرقمة بالأرقام من ١ إلى ٢٥ ، ١٥ كرة منها حمراء ومرقمة بالأرقام من ١ إلى ١٥ ، والباقي كرات زرقاء ومرقمة بالأرقام من ١ إلى ١٠ فإذا سحب كرة عشوائياً من الكيس. احسب احتمال أن تكون الكرة المسحوبة :

- |                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| ١) حمراء أو بيضاء.                | ٢) حمراء وتحمل عدداً زوجياً.            |
| ٣) تحمل عدداً أقل من أو يساوي ٨   | ٤) تحمل عدداً أقل من أو يساوي ١٢        |
| ٥) تحمل عدداً أكبر من أو يساوي ١٤ | ٦) عليها عدد $n$ حيث $6 \leq n \leq 20$ |

«...٨ ، ١٤ ، ١٤ ، ٤٨ ، ٦٨ ، ٢٨ ، ٦»

٢٦ حقيبة بها ٢ كرات سوداء ، ٢ كرات حمراء فإذا سحب منها عشوائياً ٢ كرات بدون إرجاع. فأوجد احتمال كل مما يأتي :

- ١) حدث «الحصول على كرتين حمراوين على الأكثر».
- ٢) حدث «الحصول على كرتين بالضبط من نفس اللون».
- ٣) حدث «الحصول على كرتين حمراوين على الأقل».
- ٤) حدث «الحصول على كرتين بالضبط حمراوين متتاليتين».

« $\frac{1}{4}$  ،  $\frac{1}{4}$  ،  $\frac{2}{4}$  ،  $\frac{5}{8}$ »

٢٧ في تجربة إلقاء قطعة نقود منتظمة ثلاث مرات متتالية. أوجد احتمالات الأحداث الآتية :

- ١) حدث «ظهور صورتين على الأقل».
- ٢) حدث «ظهور كتابة واحدة فقط».
- ٣) حدث «ظهور كتابتين بالضبط».
- ٤) حدث «ظهور صورة في الرمية الأولى وكتابة في الرمية الثانية».
- ٥) حدث «ظهور صورتين متتاليتين على الأقل».
- ٦) حدث «ظهور عدد فردي من الصور».
- ٧) حدث «ظهور كتابة على الأقل».

« $\frac{5}{8}$  ،  $\frac{1}{4}$  ،  $\frac{2}{8}$  ،  $\frac{1}{4}$  ،  $\frac{2}{8}$  ،  $\frac{2}{8}$  ،  $\frac{1}{4}$ »

٢٨ في تجربة إلقاء قطعة نقود ثم حجر نرد وملاحظة الظاهر على الوجه العلوي لكل منهما أوجد احتمالات الأحداث الآتية :

- ١) حدث «ظهور كتابة وعدد فردي».
- ٢) حدث «ظهور كتابة أو عدد أصغر من ٣».
- ٣) حدث «ظهور صورة».
- ٤) حدث «ظهور كتابة أو عدد أصغر من ٣».
- ٥) حدث «ظهور كتابة وعدد أصغر من ٣».

« $\frac{1}{4}$  ،  $\frac{2}{4}$  ،  $\frac{1}{4}$  ،  $\frac{1}{4}$  ،  $\frac{1}{4}$ »



١٣٣ حجرا نرد متميزان منتظمان أحدهما على أوجهه الأرقام ١ ، ١ ، ٢ ، ٢ ، ٣ ، ٣ ، ٤ ، ٤ ، ٥ ، ٥ فإذا ألقى الحجران مرة واحدة ،  
والثاني على أوجهه الأرقام ٢ ، ٢ ، ٤ ، ٤ ، ٥ ، ٥ ، فإذا ألقى الحجران مرة واحدة.  
فأوجد احتمال كل من الأحداث الآتية :

١ حدث «ظهور عددين فرديين».

٢ حدث «مجموع العددين الظاهرين أكبر من أو يساوي ٧».

٣ حدث «مجموع العددين زوجي».

« $\frac{4}{9}$  ،  $\frac{5}{9}$  ،  $\frac{2}{9}$ »

١٣٤ من مجموعة الأرقام {٠ ، ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤} كون عدد من رقمين مختلفين.

احسب احتمال كل من الأحداث الآتية :

١ حدث «العدد زوجي أو رقم العشرات فردي».

٢ حدث «أن يكون كل من رقمي الآحاد والعشرات أولياً».

٣ حدث «أن يكون رقم الآحاد أو رقم العشرات أولياً».

« $\frac{2}{4}$  ،  $\frac{1}{8}$  ،  $\frac{2}{4}$ »

١٣٥ إذا كان ف فضاء عينة لتجربة عشوائية جميع نواتجها متساوية الإمكانات ، وكان  $P$  ،  $S$  حدثين من ف ، ل  
( $P \cup S$ ) =  $\frac{5}{6}$  ، ل ( $P$ ) =  $\frac{5}{12}$  ، عدد النواتج التي تؤدي إلى وقوع الحدث  $P$  يساوي ١٢ وعدد النواتج الممكنة  
للتجربة يساوي ٢٤ فأوجد :

١ احتمال وقوع الحدثين  $P$  ،  $S$  معاً . ٢ احتمال وقوع أحد الحدثين دون الآخر.

٣ ل ( $P \cup S$ )

« $\frac{7}{8}$  ،  $\frac{17}{24}$  ،  $\frac{1}{8}$ »

١٣٦ فصل دراسي به ٤٠ طالباً ، نجح منهم ٣٠ طالباً في الفلسفة ، ٢٤ طالباً في التاريخ ، ٢٠ طالباً في الامتحانين  
، فإذا اختير طالب عشوائياً. أوجد احتمال أن يكون الطالب المختار :

١ ناجحاً في الفلسفة. ٢ ناجحاً في التاريخ.

٣ ناجحاً في أحد الامتحانين على الأقل. ٤ راسباً في التاريخ.

٥ راسباً في الفلسفة والتاريخ.

« $\frac{2}{3}$  ،  $\frac{2}{5}$  ،  $\frac{17}{20}$  ،  $\frac{2}{5}$  ،  $\frac{2}{4}$ »

١٣٧ عينة عشوائية تتكون من ٦٠ شخصاً شملهم استطلاع للرأي ، وجد أن ٤٠ شخصاً ، منهم يشجع  
نادي الهلال ، و ٢٨ شخصاً يشجع نادي النجمة ، وأن ٨ أشخاص لا يشجعون أيّاً من النادييين. إذا  
اختير شخص عشوائياً من أفراد العينة. فما احتمال أن يكون الشخص المختار من مشجعي :

١ أحد النادييين على الأقل. ٢ النادييين معاً.

٣ نادي الهلال فقط. ٤ أحد النادييين فقط.

« $\frac{2}{5}$  ،  $\frac{2}{5}$  ،  $\frac{4}{15}$  ،  $\frac{12}{15}$ »

٢٨ فصل يتكون من ٢٤ ولدًا ، ١٦ بنتًا منها ٩ أولاد ، ٤ بنات يلبسون نظارة ، فإذا اختير عشوائيًا شخص من هذا الفصل. فأوجد احتمال أن يكون هذا الشخص :

١ بنتًا. | ٢ ممن يلبسون نظارة.

٣ بنتًا تلبس نظارة. | ٤ ولدًا لا يلبس نظارة.

٥ بنتًا أو ممن يلبسون نظارة.

«  $\frac{2}{8}$  ،  $\frac{3}{8}$  ،  $\frac{1}{10}$  ،  $\frac{13}{40}$  ،  $\frac{2}{5}$  »

٢٩ تقدم لمسابقة في الشعر للصف الثانى الثانوى بإحدى المدارس الثانوية المشتركة ٢٥ من الطلاب موزعين

كما هو موضح بالجدول التالى.

أوجد احتمال أن يكون الفائز بالمركز الأول :

المجموع	علمي	أدبي	
١٥	٧	٨	طالب
١٠	٤	٦	طالبة
٢٥	١١	١٤	المجموع

١ طالبة.

٢ من القسم العلمى.

٣ طالب من القسم الأدبى.

٤ طالبة أو من القسم الأدبى.

«  $\frac{18}{30}$  ،  $\frac{8}{30}$  ،  $\frac{11}{30}$  ،  $\frac{2}{5}$  »

٤٠ كتب طارق ٧٥ خطابًا على الآلة الكاتبة ، فوجد أن ٦٠٪ منها بلا أخطاء ، وكتب زياد ٢٥ خطابًا

أخرى ، فوجد أن ٨٠٪ منها بلا أخطاء ، فإذا اختير خطاب عشوائيًا مما تم كتابته بواسطة طارق وزياد.

فأوجد احتمال أن يكون هذا الخطاب :

١ بلا أخطاء.

٢ زياد هو الذى كتب الخطاب.

٣ زياد لم يخطئ فى كتابته.

٤ طارق قد أخطأ فى كتابته.

« ٠,٣ ، ٠,٢ ، ٠,٢٥ ، ٠,٦٥ »